

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

D. Nước gừng tươi.

D. FeCl₃.

D. Chuyển dịch theo chiều nghịch.

D. tính oxi hóa.

D. NaOH.

D. NO₂.

D. tốc độ phản ứng hoá học xảy ra chậm dần.

D. NH_4^+ .

D. xảy ra khi nước mưa có $\text{pH} < 5,6$.

D. cộng hoá tri không cực.

D. NaCl điện li trong nước thành ion.

Trang 1


A. Nồng độ

B. Nhiệt độ

C. Chất xúc tác

D. Áp suất

Câu 13. Phương trình điện li nào sau đây biểu diễn đúng?



Câu 14. Cho phản ứng thuận nghịch sau: $2\text{HI(g)} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{(g)} + \text{I}_2\text{(g)}$. Ở trạng thái cân bằng, nồng độ (mol.L^{-1}) của $\text{H}_2\text{(g)}$, $\text{I}_2\text{(g)}$ và HI(g) được kí hiệu lần lượt là $[\text{H}_2]$, $[\text{I}_2]$ và $[\text{HI}]$. Biểu thức hằng số cân bằng K_c của phản ứng là

A. $K_c = \frac{[\text{H}_2][\text{I}_2]}{[\text{HI}]}$

B. $K_c = \frac{[\text{HI}]^2}{[\text{H}_2][\text{I}_2]}$

C. $K_c = \frac{[\text{H}_2][\text{I}_2]}{[\text{HI}]^2}$

D. $K_c = \frac{[\text{HI}]}{[\text{H}_2][\text{I}_2]}$

Câu 15. Hoạt động nào sau đây góp phần gây nên hiện tượng phú dưỡng?

A. Nước thải sinh hoạt thải trực tiếp vào nguồn nước chưa qua xử lí.

B. Ao hồ thả quá nhiều tôm, cá.

C. Sự quang hợp của cây xanh.

D. Khử trùng ao hồ sau khi tát cạn bằng vôi sống (CaO).

Câu 16. Ở trạng thái tự nhiên, nitrogen:

A. Chỉ tồn tại ở dạng đơn chất.

B. tồn tại ở dạng đơn chất và hợp chất.

C. Chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.

D. tự do chiếm khoảng 20% thể tích không khí.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. (2 điểm)

Câu 1. Xét tính chất của muối ammonium.


a) Hầu hết các muối ammonium không tan trong nước và không phân li ra ion.

b) Khi đun nóng muối ammonium với dung dịch kiềm thấy xuất hiện khí không màu.

c) Nhiệt phân các muối ammonium đều thu được khí NH_3 .

d) Các muối ammonium khi nhiệt phân đều làm tăng áp suất nên có nguy cơ cháy nổ do đó cần bảo quản muối ammonium cẩn thận và tránh xa nguồn nhiệt.

Câu 2. Cho đồ thị:



a) Đồ thị trên biểu diễn tốc độ của phản ứng một chiều phụ thuộc vào thời gian.

b) Tại trạng thái cân bằng, tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.

c) Khi phản ứng thuận nghịch xảy ra thì tốc độ phản ứng thuận tăng dần còn tốc độ phản ứng nghịch giảm dần.

d) Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thì phản ứng thuận và phản ứng nghịch dừng lại.

PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. (1 điểm)

Câu 1. Cho dãy các chất: CuSO_4 , HCl , HNO_3 , AlCl_3 , NH_4NO_3 , $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, NH_4HCO_3 . Số chất thuộc loại muối ammonium là bao nhiêu?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 2. Tính pH của dung dịch NaOH 0,025M ở 25°C . (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 3. Học sinh X thực hiện thí nghiệm chuẩn độ dung dịch NaOH chưa biết nồng độ bằng dung dịch chuẩn HCl 0,1M, thuốc thử phenolphthalein. Lấy 20,00 mL dung dịch HCl 0,01M cho vào bình tam giác cùng với 1-2 giọt thuốc thử. Kết quả 3 lần chuẩn độ như sau:

Thí nghiệm	1	2	3
Thể tích NaOH (mL)	19,85	19,95	19,96

Xác định nồng độ (mol/L) của dung dịch NaOH (*kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*).

Câu 4. Nhiệt phân các muối ammonium: (1) NH_4Cl , (2) $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$, (3) NH_4NO_2 , (4) NH_4HCO_3 , (5) NH_4NO_3 . Hãy sắp xếp các trường hợp thu được khí NH_3 theo số thứ tự tăng dần (ví dụ 12, 123, ...)

PHẦN IV: Tự luận (học sinh làm ra giấy tự luận)

Câu 1. Ở các vùng quê, người dân thường dùng phèn chua để làm trong nước nhờ ứng dụng của phản ứng thủy phân ion Al^{3+} ? Giải thích? Chất hay ion nào là acid, là base trong phản ứng thủy phân Al^{3+} ?

Câu 2. Cho cân bằng hoá học: $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ $\Delta_r H_{298}^0 = -92 \text{ kJ}$

Cân bằng chuyển dịch theo chiều nào (có giải thích) khi:

a) tăng nhiệt độ.

b) tách ammonia ra khỏi hỗn hợp phản ứng.

Câu 3. Theo TCVN 5945:2005 quy định về giá trị pH của nước khi thải ra môi trường phải nằm trong khoảng từ 6,0 đến 9,0. Một mẫu nước thải của nhà máy sản xuất có pH = 3,0. Để thải ra ngoài môi trường thì cần phải tăng pH theo tiêu chuẩn. Nhà máy này dùng vôi sống (CaO) hoà tan vào nước thải để nâng pH của 2000 m^3 nước thải từ pH = 3,0 lên pH = 7,0 cần dùng hết m kg vôi sống. Tính giá trị của m (*bỏ qua sự thủy phân của các muối nếu có*). Cho khối lượng nguyên tử (amu): O = 16, Ca = 40.

---HẾT---