

ĐỀ THAM KHẢO

Câu I. (4,0 điểm)

1. (2,0 điểm)

Nêu hiện tượng và viết phương trình ion rút gọn (nếu có) cho các thí nghiệm sau:

- a/ Cho từ từ đến dư dung dịch NH_3 vào dung dịch chứa hỗn hợp FeCl_3 và CuSO_4 .
b/ Cho từ từ đến dư dung dịch KHSO_4 vào dung dịch chứa hỗn hợp NaAlO_2 và Na_2CO_3 .
c/ Cho dung dịch $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ vào dung dịch HCl 1M, đun nóng nhẹ.
d/ Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch K_2HPO_3 .

2. (2,0 điểm)

- a/ Tính nồng độ mol của ion H^+ và các anion trong dung dịch axit selenic H_2SeO_3 0,1M. Cho biết $K_{a1} = 3,5 \cdot 10^{-3}$; $K_{a2} = 5 \cdot 10^{-8}$.
b/ Tính lượng NaF có trong 100ml dung dịch HF 0,1M. Biết dung dịch có $\text{pH}=3$, hệ số cân bằng K_a của HF là $3,17 \cdot 10^{-4}$. ($\text{HF} \rightleftharpoons \text{F}^- + \text{H}^+$)

Câu II. (4,0 điểm)

1. (3,0 điểm)

Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Fe và FeCO_3 bằng dung dịch HNO_3 vừa đủ, thu được dung dịch muối duy nhất B và hỗn hợp C gồm 2 khí có số mol bằng nhau và $d_{C/\text{H}_2} = 18,5$. Cô cạn dung dịch và nhiệt phân hoàn toàn muối B thì thu được hỗn hợp khí D. Trộn C và D tạo thành khí E..

Tính thành phần phần trăm khối lượng trong hỗn hợp A và phần trăm thể tích trong E.

2. (1,0 điểm)

Cho hai phân tử PF_3 và PF_5 .

- a/ Hãy cho biết trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm và dạng hình học trong phân tử của chúng.
b/ Cho biết sự phân cực của 2 nguyên tử trên? Giải thích.
c/ Có phân tử NF_5 , AsF_5 không? Tại sao?

Câu III. (4,0 điểm)

1. (1,5 điểm)

Hợp chất hữu cơ X có cấu tạo không vòng, có công thức phân tử $\text{C}_4\text{H}_7\text{Cl}$ và có cấu hình E. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH trong điều kiện đun nóng thu được hỗn hợp sản phẩm bền có cùng công thức $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$. Xác định cấu trúc có thể có của X.

2. (1,0 điểm)

Cho But-2-en vào dung dịch gồm HBr , $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ hòa tan trong nước thu được các chất hữu cơ gì? Trình bày cơ chế phản ứng tạo thành các chất trên.

3. (1,5 điểm)

Phân tích một tecpen A có trong tinh dầu chanh thu được kết quả sau: C chiếm 88,235% về khối lượng, khối lượng phân tử của A là 136 đvC.

A có khả năng làm mất màu dung dịch Brom, tác dụng với Br_2 theo tỉ lệ mol 1:2, không tác dụng với $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$. Ozon phân hoàn toàn A tạo ra 2 sản phẩm hữu cơ: andehitfomic và 3-axetyl-6-on heptanal. Xác định công thức cấu tạo của A.

Câu IV. (4,0 điểm)

1. (1,0 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon R, thu được tỉ lệ số mol H_2O và CO_2 tương ứng bằng 1,125.

a) Xác định công thức phân tử của R.

b) R_1 là đồng phân của R, khi tác dụng với Cl_2 , điều kiện thích hợp, tỉ lệ mol 1:1 thì thu được một dẫn xuất mono clo duy nhất (R_2). Gọi tên R_1 , R_2 và viết phương trình phản ứng xảy ra.

2. (1,0 điểm)

Trình bày phương pháp hóa học đơn giản nhất để phân biệt mỗi cặp chất dưới đây chứa trong các bình riêng biệt mất nhãn và viết các phương trình phản ứng xảy ra:

a) m-bromtoluen và benzyl bromua.

b) phenylaxetilen và stiren.

c) axetilen và propin.

d) $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)-\text{COOH}$ và axit fomic.

3. (2,0 điểm)

Oxi hóa một lượng ancol C bằng oxi, xúc tác, thu được hỗn hợp X. Chia X thành ba phần bằng nhau:

Phần 1 tác dụng với dung dịch AgNO_3 trong amoniac dư thu được 21,6 gam Ag.

Phần 2 tác dụng với dung dịch NaHCO_3 dư thu được 2,24 lít khí.

Phần 3 tác dụng với Na vừa đủ thu được 4,48 lít khí và 25,8 gam chất rắn khan.


a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

b) Xác định công thức cấu tạo của ancol C, biết đun nóng ancol C với H_2SO_4 đặc, ở 170°C được anken, các chất khí đo ở đktc và các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Câu 5. (4,0 điểm)



1. (1,0 điểm)

Xác định công thức cấu tạo các hợp chất hữu cơ A_1 , A_2 , A_3 , A_4 trong các sơ đồ phản ứng sau (không ghi phản ứng):



2. (2,0 điểm)

Hoàn thành các phương trình phản ứng:



3. (1,0 điểm)

Axit cacboxylic Y với mạch cacbon không phân nhánh, có công thức đơn giản nhất là CHO. Cứ 1 mol Y tác dụng hết với NaHCO_3 giải phóng 2 mol CO_2 .




Dùng P_2O_5 để loại nước ra khỏi Y ta thu được chất Z có cấu tạo mạch vòng. Nếu oxi hóa hơi benzen bằng oxi, xúc tác, thu được chất Z, CO_2 và H_2O . Hãy tìm công thức cấu tạo, gọi tên Y và viết các phản ứng xảy ra.


-----Hết-----

**(Cho $N=14$, $H=1$, $O=16$, $C=12$, $S=32$, $Cl=35.5$, $Fe=56$; $Ba=137$, $Na=23$,
 $Mg=24$, $Ca=40$, $Al=27$, $Ag=108$)**







Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Câu	Ý	Nội dung	Điểm
Câu			điểm
1		<p>a/ Trong dung dịch FeCl_3 và CuSO_4 có các ion : Fe^{3+}, Cu^{2+} Dung dịch NH_3 có cân bằng: $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$ Khi cho dung dịch NH_3 vào dung dịch FeCl_3 và CuSO_4 - Có kết tủa nâu, kết tủa xanh do pư: $\text{Fe}^{3+} + 3\text{OH}^- \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{OH})_3$ nâu đỏ $\text{Cu}^{2+} + 2\text{OH}^- \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{OH})_2$ xanh Sau kết tủa xanh $\text{Cu}(\text{OH})_2$ tự hoà tan trong dd NH_3 dư do phản ứng : $\text{Cu}(\text{OH})_2 + 4\text{NH}_3 \rightleftharpoons [\text{Cu}(\text{NH}_4)_4](\text{OH})_2$ dung dịch màu xanh đậm b/ Trong dung dịch chứa NaAlO_2 và Na_2CO_3 có các cân bằng</p> $\text{AlO}_2^- + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Al}(\text{OH})_3 + \text{OH}^- \quad (1)$ $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{OH}^- \quad (2)$ $\text{HCO}_3^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 + \text{OH}^- \quad (3)$ <p>Trong dung dịch KHSO_4 có cân bằng $\text{HSO}_4^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{SO}_4^{2-} + \text{H}_3\text{O}^+$ Khi cho đến dư dd H_2SO_4 và dd chứa NaAlO_2 và Na_2CO_3 làm dịch chuyển các cân bằng (1) và (3) sang phải có các hiện tượng : - Có khí thoát ra (khí CO_2) - Có kết tủa keo ($\text{Al}(\text{OH})_3$) Nếu dư KHSO_4 thì $\text{Al}(\text{OH})_3$ sẽ bị hoà tan c/ Trong dung dịch chứa $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ và HCl: Fe^{2+} bị oxi hóa bởi NO_3^-/H^+ nên sau khi phản ứng dung dịch có màu vàng và có khí không màu hóa nâu trong không khí bay ra. $3\text{Fe}^{2+} + \text{NO}_3^- + 4\text{H}^+ \rightarrow 3\text{Fe}^{3+} + \text{NO} + 3\text{H}_2\text{O}$ d/ K_2HPO_3 là muối trung hòa nên khi cho NaOH vào dung dịch K_2HPO_3 không có hiện tượng xảy ra</p>	2,0
2		<p>a/ $\text{H}_2\text{SeO}_3 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HSeO}_3^- \quad (1) \quad K_{a1}$ $\text{HSeO}_3^- \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{SeO}_3^{2-} \quad (2) \quad K_{a2}$ Ta thấy $K_{a2} \ll K_{a1}$ nên $[\text{H}^+]$ phân li ra chủ yếu ở (1) $K_{a1} = \frac{[\text{H}^+].[\text{HSeO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{SeO}_3]} = \frac{[\text{H}^+]^2}{0,1 - [\text{H}^+]} = 3,5.10^{-3}$ $\Rightarrow [\text{H}^+] = [\text{HSeO}_3^-] = 0,017$ $K_{a2} = \frac{[\text{H}^+].[\text{SeO}_3^{2-}]}{[\text{HSeO}_3^-]} = 5.10^{-8}$ $\Rightarrow [\text{SeO}_3^{2-}] = \frac{5.10^{-8} \cdot 0,017}{0,017} = 5.10^{-8}$ b/ $[\text{HF}] = 0,1\text{M} \quad [\text{H}^+] = 10^{-3} \quad [\text{NaF}] = x$ $\text{HF} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{F}^-$</p>	2,0

Câu	Ý	Nội dung	Điểm
		$2\text{NO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}_2$ $a \text{ mol} \quad a/2 \quad a$ Hỗn hợp E gồm : $n\text{NO}_2 = 5a + a = 6a \text{ (mol)}$, $n\text{CO}_2 = a \text{ (mol)}$ Số mol O_2 còn lại : $\frac{5a}{4} - \frac{a}{2} = \frac{3a}{4} \text{ (mol)}$ Thành phần phần trăm thể tích trong E : $\%V_{\text{NO}_2} = \frac{6a}{7,75a} \cdot 100 = 77,4\%$ $\%V_{\text{CO}_2} = \frac{a}{7,75a} \cdot 100 = 12,9\% \rightarrow \%V_{\text{O}_2} = 9,75$	
	2	a/ PF_3 : P lai hóa sp^3 , PF_3 dạng chóp tam giác  PF_5 : P lai hóa sp^3d , PF_5 dạng lưỡng chóp tam giác.  b/ PF_3 có $\mu > 0$, PF_5 có $\mu = 0$. c/ Không có phân tử NF_5 , có phân tử AsF_5 vì N không có phân lớp d còn As có phân lớp d	1,0
Câu III			
	1	-Ứng với cấu hình E thì $\text{C}_4\text{H}_7\text{Cl}$ có 3 cấu trúc:  (1) (2) (3) X + dung dịch NaOH , t° thu được sản phẩm bền. Vậy cấu trúc của X là : cấu trúc (3)	1,5
	2	$\text{CH}_3\text{CH} = \text{CHCH}_3 + \text{H}^+ \rightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}^+\text{CH}_3$ $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHBrCH}_3$	1,0

Câu	Ý	Nội dung	Điểm
		$CH_3CH_2\overset{+}{C}HCH_3 \xrightarrow{H_2O} CH_3CH_2CH(CH_3)\overset{+}{O}H_2 \xrightarrow{-H^+} CH_3CH_2CH(OH)CH_3$ $CH_3CH_2CH(CH_3)\overset{+}{O}C_2H_5 \xrightarrow{-H^+} CH_3CH_2CH(CH_3)OC_2H_5$ <p style="text-align: center;">H</p>	
	3	<p>Xác định công thức cấu tạo của A. Xác định số đồng phân lập thể (nếu có)</p> <p>Đặt A: C_xH_y</p> <p>$x : y = (88,235:12) : 11,765 = 10 : 16 \Rightarrow$ CT thực nghiệm $(C_{10}H_{16})_n$</p> <p>$M_A = 136 \Rightarrow$ CTPT A : $C_{10}H_{16}$ (số lk π + số vòng = 3)</p> <p>A tác dụng Br_2 theo tỉ lệ mol 1:2 $\Rightarrow$ A có 2 liên kết π và 1 vòng</p> <p>A không tác dụng với $AgNO_3/NH_3 \Rightarrow$ A không có nối ba đầu mạch</p> <p>Ozon phân hoàn toàn A tạo ra 2 sản phẩm hữu cơ : andehitfomic và 3-axetyl-6-on heptanal</p> <p>$\Rightarrow$ CTCT A:</p> 	1,5
Câu IV			
	1	<p>a) Do $nH_2O : nCO_2 > 1 \Rightarrow R$ là C_nH_{2n+2} ($n \geq 1$)</p> <p>Phản ứng: $C_nH_{2n+2} + (3n+1)/2 O_2 \rightarrow nCO_2 + (n+1) H_2O$ (1)</p> <p>Từ $(n+1) : n = 1,125 \Rightarrow n=8 \Rightarrow R: C_8H_{18}$</p> <p>b) Do R_1 tác dụng với Cl_2 tạo 1 dẫn xuất monoclo duy nhất R_2</p> <p>$\Rightarrow R_1: (CH_3)_3C - C(CH_3)_3 : 2,2,3,3$-tetrametylbutan</p> <p>$R_2: ClCH_2(CH_3)_2C - C(CH_3)_3 : 1$-clo-2,2,3,3-tetrametylbutan</p> <p>$(CH_3)_3C - C(CH_3)_3 + Cl_2 \xrightarrow{as} ClCH_2(CH_3)_2C - C(CH_3)_3 + HCl$</p>	1,0
	2	<p>a) Dùng $AgNO_3$, đun nóng, benzyl bromua cho kết tủa vàng:</p> <p>$C_6H_5CH_2Br + AgNO_3 + H_2O \rightarrow C_6H_5CH_2OH + AgBr + HNO_3$</p> <p>b) Dùng dung dịch $AgNO_3/NH_3$, phenylaxetilen cho kết tủa vàng</p>	1,0

Câu	Ý	Nội dung	Điểm
		<p>xám:</p> $\text{C}_6\text{H}_5\text{C}\equiv\text{CH} + \text{AgNO}_3 + \text{NH}_3 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{C}\equiv\text{CAg} + \text{NH}_4\text{NO}_3$ <p>c) Cho tác dụng với H_2O, xt. Lấy sản phẩm thực hiện phản ứng tráng gương Tạo kết tủa Ag là andehit, không phản ứng là xeton $\Rightarrow \text{CH}\equiv\text{CH}$ và $\text{CH}_3 - \text{C}\equiv\text{CH}$</p> $\text{H}_2\text{O} + \text{C}_2\text{H}_2 \xrightarrow{\text{HgSO}_4, \text{t}^\circ} \text{CH}_3\text{CHO} \qquad \text{CH}_3 - \text{C}\equiv\text{CH} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{HgSO}_4, \text{t}^\circ} \text{CH}_3\text{COCH}_3$ $\text{CH}_3\text{CHO} + 2[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{OH} \xrightarrow{\text{t}^\circ} \text{CH}_3\text{COONH}_4 + 2\text{Ag}\downarrow + 3\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$ <p>d) Cho tác dụng với Br_2/CCl_4 Mất màu là $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{COOH}$, không phản ứng là HCOOH $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{COOH} + \text{Br}_2 \rightarrow \text{CH}_2\text{Br} - \text{CBr}(\text{CH}_3) - \text{COOH}$</p>	
	3	<p>Do oxi hóa C được SP tráng gương, tách nước tạo olefin $\Rightarrow \text{C}$ là ancol no, đơn chức mạch hở, bậc một. Vậy C: RCH_2OH (R: $\text{C}_n\text{H}_{2n+1} -$, $n \geq 1$).</p> $2 \text{RCH}_2\text{OH} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{xt}, \text{t}^\circ} 2\text{RCHO} + 2 \text{H}_2\text{O} \quad (1)$ $\text{RCH}_2\text{OH} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{xt}, \text{t}^\circ} \text{RCOOH} + \text{H}_2\text{O} \quad (2)$ <p>Hỗn hợp X gồm RCHO, RCOOH, H_2O và RCH_2OH dư.</p> <p>* Phần 1: $\text{RCHO} + 2[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{OH} \xrightarrow{\text{t}^\circ} \text{RCOONH}_4 + 2\text{Ag}\downarrow + 3\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \quad (2)$</p> <p>* Phần 2: $\text{RCOOH} + \text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{RCOONa} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow \quad (4)$</p> <p>* Phần 2: $2 \text{RCOOH} + 2 \text{Na} \rightarrow 2 \text{RCOONa} + \text{H}_2 \uparrow \quad (5)$</p> $2 \text{RCH}_2\text{OH} + 2 \text{Na} \rightarrow 2 \text{RCH}_2\text{ONa} + \text{H}_2 \uparrow \quad (6)$ $2 \text{H}_2\text{O} + 2 \text{Na} \rightarrow 2 \text{NaOH} + \text{H}_2 \uparrow \quad (7)$ <p>Gọi số mol RCH_2OH, RCHO, RCOOH trong 1/3 hỗn hợp X lần lượt là x, y, z mol.</p> <p>Theo (1 $\rightarrow$ 7) và bài ra ta có hệ:</p> $\begin{cases} 2y = 0,2 \\ z = 0,1 \\ 0,5z + 0,5x + 0,5(y+z)z = 0,2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,1 \\ y = 0,1 \\ z = 0,1 \end{cases}$ <p>Chất rắn khan thu được sau phản ứng ở phần III gồm : 0,1 (mol) RCOONa ; 0,1 (mol) RCH_2ONa và 0,2 (mol) NaOH. Số gam chất rắn khan : $(\text{R} + 67) \cdot 0,1 + (\text{R} + 53) \cdot 0,1 + 40 \cdot 0,2 = 25,8$ (gam) $\Rightarrow \text{M}_\text{R} = 29 \Rightarrow \text{R}$ là $\text{C}_2\text{H}_5 -$ Vậy ancol C: $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$.</p>	2,0
Câu V			
	1	<p>A_1: $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ A_2: $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH}_2$ A_3: $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{CH}(\text{CH}_3)_2$</p>	1,0


Câu	Ý	Nội dung	Điểm
		(Cumen) $A_4: CH_3-CH(OH)-CH_3$	
2	a)	$3 \text{ (C}_6\text{H}_5\text{)}-CH_2-\underset{\text{CH}_3}{\underset{ }{CH}}-CH_3 + 8 KMnO_4 \xrightarrow{t^0} 3 C_6H_5COOK + 3 CH_3COCH_3 + 5KOH + 8 MnO_2 + 2 H_2O$	2,0
	b)	$2C_3H_5(OH)_3 + Cu(OH)_2 \rightarrow [C_3H_5(OH)_2O]_2Cu + 2H_2O$	
	c)		
	d)		
3		<p>Vì 1 mol Y tác dụng được với $NaHCO_3 \rightarrow 2 \text{ mol } CO_2 \Rightarrow Y$ là một axit 2 nấc $\Rightarrow$ CTPT của Y phải là $C_4H_4O_4$ hay $C_2H_2(COOH)_2$. Ứng với mạch không phân nhánh có 2 đồng phân cis-trans là:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>axit <i>trans</i>-butendioic (axit fumaric)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>axit <i>cis</i>-butendioic (axit maleic)</p> </div> </div> <p>(Y) Chỉ có đồng phân cis mới có khả năng tách nước tạo anhidrit (Z):</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  </div>	1,0

Câu I. (4,0 điểm)

1. 2,0 điểm


a/ Trong dung dịch FeCl_3 và CuSO_4 có các ion : Fe^{3+} , Cu^{2+}

Dung dịch NH_3 có cân bằng:




Khi cho dung dịch NH_3 vào dung dịch FeCl_3 và CuSO_4

- Có kết tủa nâu, kết tủa xanh do pư:






Sau kết tủa xanh $\text{Cu}(\text{OH})_2$ tự hoà tan trong dd NH_3 dư do phản ứng :




xanh đậm

b/ Trong dung dịch chứa NaAlO_2 và Na_2CO_3 có các cân bằng



Trong dung dịch KHSO_4 có cân bằng




Khi cho đến dư dd H_2SO_4 và dd chứa NaAlO_2 và Na_2CO_3 làm dịch chuyển các cân bằng (1) và (3) sang phải có các hiện tượng :

- Có khí thoát ra (khí CO_2)

- Có kết tủa keo ($\text{Al}(\text{OH})_3$)

Nếu dư H_2SO_4 thì $\text{Al}(\text{OH})_3$ sẽ bị hoà tan

c/ Trong dung dịch chứa $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ và HCl : Fe^{2+} bị oxi hóa bởi NO_3^-/H^+ nên sau khi phản ứng dung dịch có màu vàng và có khí không màu hóa nâu trong không khí bay ra.




d/ K_2HPO_4 là muối trung hòa nên khi cho

Câu II. (5,0 điểm)


1. 3,0 điểm

Khi cho dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$ vào thấy kết tủa nên NH_4HCO_3 dư, HCl hết



$$0,03 \text{ mol} \quad ,03 \text{ mol} \quad 0,03 \text{ mol}$$

$$V = V_{\text{CO}_2} = 0,03 \cdot 22,4 = 0,672 \text{ lít}$$



$x \quad \quad \quad x \quad \quad x$
Gọi số mol của NH_4HCO_3 ban đầu là x mol
 $m_{\text{BaCO}_3} + m_{\text{NH}_3} - m_{\text{NH}_4\text{HCO}_3} = m$ dd giảm

$$197x + 17x - 79x = 6,75$$

$$\rightarrow x = 0,05 \text{ mol}$$

$$m_{(\text{NH}_4\text{HCO}_3)} = 0,05 \cdot 79 = 3,95 \text{ gam} = m$$

$$m_{\text{CaCO}_3} = 0,02 \cdot 100 = 2 \text{ gam} = a$$

2. 2,0 điểm

$$n_{\text{HCOOH}} = 0,2 \text{ mol} \rightarrow [\text{HCOOH}] = 0,4 \text{ M}$$

	HCOOH	HCOO ⁻ + H ⁺
Bđ	0,4M	
Điện li	0,4a	0,4a
0,4a		
CB	0,4(1-a)	0,4a
0,4a		

a/ gọi a là độ điện li của HCOOH

$$\text{pH} = 2 \rightarrow [\text{H}^+] = 0,01 \text{ M}$$

$$\rightarrow 0,4a = 0,01 \rightarrow a = 0,025 = 2,5\%$$

$$b/ K_a(\text{HCOOH}) = \frac{[\text{HCOO}^-] \cdot [\text{H}^+]}{[\text{HCOOH}]} = \frac{(0,4 \cdot a)^2}{(0,4(1-a))} = 10^{-3,59}$$

	HCOOH	HCOO ⁻ + H ⁺
Bđ	0,4M	
Điện li	0,4b	0,4b
0,4b + x		
CB	0,4(1-b)	0,4b
0,4b + x		

$$\text{Độ điện li giảm } 20\% \rightarrow b = 80\%a = 0,02$$


$$K_a = 0,4b \cdot (0,4b + x) / (0,4(1-b)) = 10^{-3,59}$$

$$\text{Thay } b = 0,02 \rightarrow x = 0,0046 \text{ M}$$

<p>NaOH vào dung dịch K_2HPO_3 không có hiện tượng xảy ra</p> <p>2. 2,0 điểm</p> <p>$8Al + 30H^+ + 3NO_3^- \rightarrow 8Al^{3+} + 3NH_4^+ + 9H_2O$ (1)</p> <p>$4Mg + 10H^+ + NO_3^- \rightarrow 4Mg^{2+} + NH_4^+ + 3H_2O$ (2)</p> <p>- Thêm dd kiềm NaOH:</p> <p>$NH_4^+ + OH^- \rightarrow H_2O + NH_3$</p> <p>(3)</p> <p>$Al^{3+} + 3OH^- \rightarrow Al(OH)_3$ (4)</p> <p>$Mg^{2+} + 2OH^- \rightarrow Mg(OH)_2$ (5)</p> <p>$Al(OH)_3$ tan 1 phần</p> <p>$Al(OH)_3 + OH^- \rightarrow AlO_2^- + 2H_2O$ (6)</p> <p>- Nung kết tủa C:</p> <p>$2Al(OH)_3 \rightarrow Al_2O_3 + 3H_2O$ (8)</p> <p>$Mg(OH)_2 \rightarrow MgO + H_2O$ (9)</p> <p>Dung dịch D gồm 2 muối: $NaNO_3$, $NaAlO_2$</p>	<p>Gọi V là thể tích của HCl cần thêm vào</p> <p>$\rightarrow pH = 1 \rightarrow [H^+] = 0,1M$</p> <p>$\rightarrow V.0,1 = (V+100).0,0046$</p> <p>$V = 4,82 \text{ ml}$</p> <p>$d/ nNaOH = 0,01 \text{ mol}; nHCOOH = 0,02 \text{ mol}$</p> <p>$HCOOH + NaOH \rightarrow HCOONa + H_2O$</p> <p>$0,01 \text{ mol} \quad 0,01 \text{ mol} \quad 0,01 \text{ mol}$</p> <p>$HCOONa \rightarrow HCOO^- + Na^+$</p> <p>$0,01 \text{ mol} \quad 0,01 \text{ mol} \quad 0,01 \text{ mol}$</p> <p>$[HCOOH] = 0,01/0,05 = 0,2M$</p> <p>$[HCOO^-] = 0,2M$</p> <p>$HCOOH \quad HCOO^- + H^+$</p> <p>Bđ $0,2M$</p> <p>Điện li $y \quad 0,2+y \quad y$</p> <p>CB $0,2-y \quad 0,2+y \quad y$</p> <p>$Ka = (0,2+y)y/(0,2-y) = 10^{-3,59}$</p> <p>$\rightarrow y = 2,56.10^{-4}M \rightarrow pH = 3,59 < 6$</p> <p>Quỳ tím chuyển màu đỏ</p>
<p>Câu III (4,0 điểm)</p> <p>1. a/ $n(OH^-) = 0,009 \text{ mol}; nH^+ = 0,004 \text{ mol}$</p> <p>$\rightarrow OH^- \text{ dư}, nOH^- = 0,005 \text{ mol} \rightarrow [OH^-] = 0,01 M \rightarrow pH = 12$</p> <p>b/ $nOH^- = 0,36 \text{ mol}; nBaCO_3 = 0,03 \text{ mol}$</p> <p>TH1: $OH^- \text{ dư}$</p> <p>$nCO_2 = nBaCO_3 = 0,03 \text{ mol} \rightarrow V_{CO_2} = 0,672 \text{ lít}$</p> <p>TH2: tạo ra hai muối</p> <p>$CO_2 + OH^- \rightarrow HCO_3^-$</p> <p>$0,3\text{mol} \quad 0,3 \text{ mol}$</p> <p>$CO_2 + 2OH^- \rightarrow CO_3^{2-} + H_2O$</p> <p>$0,03\text{mol} \quad 0,06 \text{ mol} \quad 0,03 \text{ mol}$</p> <p>$V_{CO_2} = 0,33.22,4 = 7,392 \text{ lít}$</p> <p>2. (2,0 điểm)</p> <p>Pư: $FeS + 10H^+ + 9NO_3^- \rightarrow Fe^{3+} + SO_4^{2-} + 9NO_2\uparrow + 5H_2O$</p> <p>a</p> <p>9a</p> <p>$FeCO_3 + 4H^+ + NO_3^- \rightarrow Fe^{3+} + CO_2\uparrow + NO_2\uparrow + 2H_2O$</p> <p>b b b</p> <p>a/ Gọi a,b là số mol mỗi muối trong hỗn hợp</p> <p>$d_{X,Y/H_2} = \frac{44b + (9a+b).46}{(9a+b).2} = 22,805 \Rightarrow b = 2,877a$</p> <p>Chọn $a=1, b=2,877 \text{ (mol)} \rightarrow$ Tìm m $\rightarrow$</p> <p>Tính % $\rightarrow \%FeS = 20,87\%; \%FeCO_3 =$</p>	<p>Câu IV. (4,0 điểm)</p> <p>1. Phân biệt các chất : (1,0 điểm)</p> <p>a/ Dùng $AgNO_3$, đun nóng, benzyl bromua cho kết tủa vàng:</p> <p>$C_6H_5CH_2Br + AgNO_3 + H_2O \rightarrow C_6H_5CH_2OH + AgBr + HNO_3$</p> <p>b/ Dùng dung dịch $AgNO_3/NH_3$, phenylaxetilen cho kết tủa vàng xám :</p> <p>$C_6H_5C\equiv CH + AgNO_3 + NH_3 \rightarrow C_6H_5C\equiv CAg + NH_4NO_3$</p> <p>2. a/(2,0 điểm) Nếu ankin có dạng $RC\equiv CH$:</p> <p>$RC\equiv CH + AgNO_3 + NH_3 \rightarrow RC\equiv CAg + NH_4NO_3$</p> <p>$\Rightarrow n(\text{ankin}) = n(AgNO_3) = 6,8/170 = 0,04 \text{ mol}$</p> <p>Và $n(Br_2) > 2n(\text{ankin}) = 0,08 \text{ mol}$.</p> <p>Điều này trái với giả thiết: $nBr_2 = 0,06 \text{ mol}$</p> <p>Vậy ankin phải là C_2H_2 và như vậy ankan là C_2H_6, anken là C_2H_4.</p> <p>Từ phản ứng :</p> <p>$C_2H_2 + 2AgNO_3 + 2NH_3 \rightarrow C_2Ag_2 + 2NH_4NO_3$</p> <p>$\Rightarrow n(C_2H_2) = 1/2n(AgNO_3) = 0,02 \text{ mol}$</p> <p>Từ các phản ứng :</p> <p>$C_2H_2 + 2Br_2 \rightarrow C_2H_2Br_4$</p> <p>$C_2H_4 + Br_2 \rightarrow C_2H_4Br_2$</p> <p>$\Rightarrow n(C_2H_4) = 0,02 \text{ mol}$</p> <p>$\Rightarrow n(C_2H_6) = 0,02 \text{ mol}$</p>

79,13%

b/ Phản ứng dimer hóa NO_2 :



$$n_{\text{đầu}} : 11,877a$$

$$n_{\text{pur}} : 2x \quad x$$

$$n_{\text{cb}} : 11,877a - 2x \quad x \quad ,$$

$$n_{\text{CO}_2} = b$$

$$d_{X,Y,Z/H_2} = \frac{(11,877a - 2x) \cdot 46 + 44b + 92x}{(11,877a - 2x + b + x) \cdot 2} = 30,61$$

$$\text{Thay } b = 2,877a \dots \rightarrow \frac{x}{a} = 3,762 \Rightarrow x = 3,762a$$

Số mol NO_2 bị dimer hóa là $2x \rightarrow$



$$= \frac{3,762a \cdot 2}{11,877a} = 63,35\%$$

% NO_2 bị dimer hóa



-Phản ứng dimer hóa diễn ra khi làm lạnh và khi đó màu của hỗn hợp nhạt dần.

- Cân bằng dịch về phải khi hạ nhiệt độ $\Rightarrow$ Phản ứng dimer hóa là tỏa nhiệt.

b/ (1,0 điểm) Thổi hỗn hợp qua bình chứa dung dịch $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$ dư. Lọc tách kết tủa, hòa tan kết tủa trong dung dịch HCl dư thu được khí C_2H_2 .



Khí ra khỏi bình chứa dung dịch $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$, thổi tiếp qua dung dịch nước brom dư. Chiết lấy sản phẩm và đun nóng với bột Zn (trong CH_3COOH) thu được C_2H_4 :



Khí ra khỏi bình chứa dung dịch brom là khí C_2H_6


Câu V. (3,0 điểm)

Ankan A: $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ và Hidrocarbon B: C_nH_y


$$n\text{CaCO}_3 = n\text{CO}_2 = 0,06 \text{ mol}$$

$$n = n_{\text{CO}_2}/n(\text{H.C}) = 0,06/0,01 = 6$$

A: C_6H_{14}





$$0,005 \text{ mol} \quad 0,035 \text{ mol}$$




$$0,005 \text{ mol} \quad 0,02 \text{ mol}$$

$y = 8 \rightarrow$ **B: C_6H_8**


b/ CTCT A: $(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$: 2,3-dimetylbutan



c/ B: C_6H_8



cis - hex - 1,3,5- trien



trans - hex - 1,3,5- trien

ĐỀ ĐỀ NGHỊ

(Đề này gồm có 03 trang)

Họ tên thí sinh:

Số báo danh:

CÂU 1:5 (điểm)

Câu 1.(2 điểm)

a) (1 điểm)

Phản ứng giữa HCl và $K_2Cr_2O_7$ xảy ra theo chiều nào khi nồng độ các chất đầu ở trạng thái chuẩn? nếu tăng nồng độ ion H^+ lên 2 lần, phản ứng sẽ diễn ra chiều nào?

Biết : $E^0_{Cr_2O_7^{2-}/2Cr^{3+}} = 1,33V$; $E^0_{Cl_2/2Cl^-} = 1,36V$

b) (1 điểm)

Cho biết nhiệt tạo thành tiêu chuẩn, entropi tiêu chuẩn của từng chất dưới đây:

	$CH_3OH(l)$	+	$3/2 O_2$	$\rightarrow$	$CO_2(K)$	+	$2H_2O(K)$
$\Delta H^0_{298}(KJ/mol)$	-238,66				-393,51		-241,82
$S^0_{298}(J/Kmol)$	126,8				205,03		213,63
	188,72						

Tính biến thiên thế đẳng áp của phản ứng ở điều kiện tiêu chuẩn?

Câu 2. (2 điểm)

a) (1 điểm)

Tính pH của dung dịch thu được khi trộn lẫn **50,0 ml** dung dịch NH_4Cl **0,200 M** với **75,0 ml** dung dịch $NaOH$ **0,100 M**.

Biết $K_b(NH_3) = 1,8.10^{-5}$.

b) (1 điểm)

Cho các dung dịch sau có cùng nồng độ mol/lit:



Sắp xếp giá trị pH của các dung dịch trên theo thứ tự tăng dần. Giải thích ngắn gọn.

Câu 3. (1 điểm)

Trộn 1 lit dung dịch $Pb(CH_3COO)_2$ 0,05M với 1 lit dung dịch KCl 0,5M. Kết tủa $PbCl_2$ có xuất hiện kết tủa không?

Biết $T_{PbCl_2} = 1,6 * 10^{-5}$

CÂU II: 5 (điểm)**Câu 1. (2 điểm)**

Hòa tan hoàn toàn 12,6 gam hỗn hợp kim loại Mg và Al có tỉ lệ mol lần lượt là 3:2, cần 5,9 lít dung dịch HNO_3 0,2500M thu được dung dịch A và thoát ra 2,24 lít hỗn hợp khí X gồm N_2O , N_2 có tỉ khối hơi X so với $\text{H}_2 = 18$. Nếu cho 1,29 lít NaOH 1M vào dung dịch A thu được **m** gam kết tủa. Cho các thể tích khí đo ở đktc.

a) Tìm m gam kết tủa.

b) Để thu được kết tủa lớn nhất thì thể tích dung dịch NaOH 1M thêm vào dung dịch A là bao nhiêu?

Câu 2.(2điểm)

Hấp thụ hoàn toàn **1,568 lít** CO_2 (đktc) vào **500 ml** dung dịch NaOH **0,16 M**, thu được dung dịch X. Thêm **250 ml** dung dịch Y gồm BaCl_2 **0,16 M** và $\text{Ba}(\text{OH})_2$ **a M** vào dung dịch X, thu được **3,94 gam** kết tủa và dung dịch Z. Tính giá trị của a.

Câu 3. (1 điểm)

Chỉ dùng quỳ tím, hãy nhận biết 5 lọ dung dịch mất nhãn sau (biết chúng có cùng nồng độ mol):
 NaHSO_4 , Na_2CO_3 , Na_2SO_3 , Na_2S , BaCl_2 .

CÂU III: 5 điểm**Câu 1. (2điểm)**

Cho Hidrocacbon (X) có CTCT C_6H_{10} . X tác dụng với H_2 theo tỉ lệ 1:1 khi có xúc tác. Ozon phân X tạo thành $\text{O}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_4-\text{CH}=\text{O}$.

a). Xác định công thức cấu tạo của X và viết phản ứng hóa học xảy ra.

b) Xác định sản phẩm tạo thành khi oxi hóa X bằng dung dịch KMnO_4 trong môi trường axit H_2SO_4 .

Câu 2.(2điểm)

Oxi hóa hoàn toàn một Hidro cacbon X mạch hở, thể khí thu được **17,6 gam** CO_2 và **5,4 gam** H_2O .

a) Tìm CTPT X. Viết các đồng phân có thể có của X.

b) Tìm CTCT đúng của X biết X tác dụng với HCl dư thu dẫn xuất điclo Y có cấu tạo đối xứng.

c) Viết các đồng phân quang học của Y (sử dụng công thức Fisher) và xác định cấu hình mỗi đồng phân (S/R) đó.

Câu 3. (1điểm)

Giải thích tại sao khi tách nước từ 2,2 dimetyl propan -1-ol bởi H_2SO_4 đậm đặc ở 170°C thu được 2 sản phẩm là: 2-metyl but -1-en và 2 metyl but-2-en.

CÂU IV: 5 (điểm)**Câu 1.(2 điểm)**

Đốt cháy hoàn toàn 28 gam hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ A, B mạch hở kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào 425 ml dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 2M thu được 98,5 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 24,1 gam. Cho dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$ dư vào dung dịch thu được lại xuất hiện

thêm 103,95 gam kết tủa nữa. X đem hóa hơi có tỉ khối hơi đối với Heli bằng 20. Xác định CTPT của hai hợp chất hữu cơ A, B.

Câu 2. (2 điểm)

Một hỗn hợp X gồm 2 ancol no A, B có cùng số nguyên tử cacbon, có khối lượng $m_X = 18,2$ gam và tỉ khối hơi $d_{X/H_2} = 36,4$. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X và dẫn sản phẩm cháy đi qua dung dịch $Ca(OH)_2$ dư thu được 75 gam kết tủa.

- Xác định công thức phân tử của A, B.
- Xác định CTCT đúng của A, B. Biết hai ancol này đều bị oxi hóa tạo sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc và không phản ứng với $Cu(OH)_2$ trong OH^- .
- Hãy viết phản ứng hóa học xảy ra.

Câu 3. (1 điểm)

Hãy viết phản ứng hóa học xảy ra (nếu có):

- $C_6H_5CH_2C(CH_3)_2 + KMnO_4 \xrightarrow{t^0}$
- $p\text{-crezol (p-CH}_3\text{-C}_6\text{H}_4\text{-OH)} + Br_2 \xrightarrow[1:1]{xtFe}$
- $C_6H_5Cl + NaOH \xrightarrow{pcao, t^0 cao}$
- $CH \equiv C-CH_3 + H_2O \xrightarrow{xt, t^0}$

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

—————HẾT—————

Sở GD & ĐT Quảng Nam **KÌ THI OLYMPIC 24/3 QUẢNG NAM NĂM 2017**
Trường THPT Thái Phiên **MÔN HÓA HỌC LỚP 11**
Đề thi đề nghị

Cho NTK Na=23; Cl=35,5; Br=80; I=127; Ag=108; Fe=56; H=1; O=16; S=32

Câu 1.

- Tính pH của dung dịch thu được khi trộn lẫn 50 ml dung dịch NH_4Cl 0,2M với 75 ml dung dịch $NaOH$ 0,1 M. Cho $K_b(NH_3) = 1,8 \cdot 10^{-5}$.
- Nêu hiện tượng và viết các phương trình hóa học xảy ra trong các thí nghiệm sau:
 - Nhỏ dung dịch Na_2CO_3 vào dung dịch $FeCl_3$.
 - Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch $NaAlO_2$.
- Có 400 ml dung dịch X chứa: Ba^{2+} , HCO_3^- , x mol K^+ và y mol NO_3^- . Cho 100 ml X tác dụng với dung dịch KOH dư, phản ứng xong thu được 9,85 g kết tủa. Cho 100 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch $Ba(OH)_2$ dư, kết thúc

các phản ứng thu được 14,755 gam kết tủa. Nếu đun sôi đến cạn 200ml dung dịch X còn lại thì thu được 26,35 gam chất rắn khan. Tính x và y.

Câu II.

- Viết phương trình minh họa cho các trường hợp sau:
a/ Cho dung dịch NH_3 tới dư vào dung dịch CuCl_2 .
b/ Cho dung dịch HCl vào dung dịch $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$.
- Chỉ dùng thêm dung dịch HCl , hãy phân biệt các dung dịch đựng trong các bình mất nhãn: $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$, NaOH , AgNO_3 , NH_4NO_3 , NaNO_3 .
- Cho 1,82 gam hỗn hợp X gồm Cu và Ag (tỉ lệ mol tương ứng 4:1) vào 30 ml dung dịch gồm H_2SO_4 0,5M và HNO_3 2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được a mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N^{+5}). Trộn a mol NO trên với 0,1 mol O_2 thu được hỗn hợp khí Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với nước thu được 150 ml dung dịch có $\text{pH} = t$. Tìm giá trị của t.

Câu III.

- Cho biết sản phẩm chính – phụ của phản ứng giữa propilen với HBr . Giải thích theo cơ chế phản ứng.
- Khi cho isopentan tác dụng với clo có chiếu sáng thì thu được hỗn hợp các dẫn xuất monoclo. Biết khả năng phản ứng tương đối của các nguyên tử H thuộc cacbon bậc I, II và III tương ứng là 1: 3,3: 4,4. Tính thành phần phần trăm các dẫn xuất nói trên.

Câu IV.

- Từ metan, các chất vô cơ và điều kiện khác xem như có đủ, viết các phương trình điều chế cao su buna và PVA.
- Cho m gam hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức X_1 , X_2 (X_2 nhiều hơn X_1 1 nguyên tử C) phản ứng với CuO đun nóng, thu được 2,25 gam H_2O ; hỗn hợp Y gồm 2 andehit tương ứng và 2 ancol dư. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 5,6 lít CO_2 (đktc) và 5,85 gam H_2O .
a. Xác định công thức của 2 ancol.
b. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO_3 trong NH_3 đun nóng, thu được 48,6 gam Ag . Tính hiệu suất oxi hóa mỗi ancol.

Câu V.

- Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau
 $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6\text{O} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4\text{O} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_7\text{O}_2\text{N} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2\text{Na} \rightarrow \text{CH}_4$.
- Chất hữu cơ X có công thức phân tử C_9H_8 . Biết X tác dụng được với dung dịch AgNO_3 trong NH_3 tạo kết tủa vàng. Còn khi đun nóng X với dung dịch thuốc tím thì thu được kali terephtalat. Biện luận và xác định công thức cấu tạo của X, viết các phương trình hóa học minh họa.

---HẾT---

Câu I.

1. Tính pH của dung dịch thu được khi trộn lẫn 50 ml dung dịch NH_4Cl 0,2M với 75 ml dung dịch NaOH 0,1 M. Cho $K_b(\text{NH}_3) = 1,8 \cdot 10^{-5}$. (6/31)

$$^{\circ}\text{NH}_4\text{Cl} = 0,08\text{M}; ^{\circ}\text{NaOH} = 0,06\text{M}$$



$$0,06 \quad \leftarrow \quad 0,06 \quad \rightarrow \quad 0,06$$

$$\rightarrow ^{\circ}\text{NH}_4\text{Cl}_{\text{còn}} = 0,08 - 0,06 = 0,02\text{M}$$



$$\text{C} \quad 0,06 \quad \quad \quad 0,02$$

$$[\quad] \quad 0,06-x \quad \quad \quad 0,02+x \quad \quad x$$

$$K_b = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]} = \frac{x(0,02+x)}{0,06-x} = 1,8 \cdot 10^{-5}$$

$$\rightarrow x = 5,38 \cdot 10^{-5}\text{M}$$

$$\rightarrow [\text{OH}^-] = 5,38 \cdot 10^{-5}\text{M} \rightarrow \text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 + \log(5,38 \cdot 10^{-5}) = 9,73.$$


2. Nêu hiện tượng và viết các phương trình hóa học xảy ra trong các thí nghiệm sau:

a/ Nhỏ dung dịch Na_2CO_3 vào dung dịch FeCl_3 .



b/ Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO_2 .

Giải:

a/ HT: Xuất hiện kết tủa đỏ nâu và có khí không màu thoát ra




b/ HT: Có kết tủa trắng keo xuất hiện, lượng kết tủa tan dần đến cực đại sau đó tan dần tạo dung dịch trong suốt.



3. Có 400 ml dung dịch X chứa: Ba^{2+} , HCO_3^- , x mol K^+ và y mol NO_3^- . Cho 100 ml X tác dụng với dung dịch KOH dư, phản ứng xong thu được 9,85 g kết tủa. Cho 100 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ dư, kết thúc các phản ứng thu được 14,755 gam kết tủa. Nếu đun sôi đến cạn 200ml dung dịch X còn lại thì thu được 26,35 gam chất rắn khan. Tính x và y.

Giải

- 100ml X tác dụng với $\text{Ba}(\text{OH})_2$ dư:



$$0,075 \quad \quad \quad \leftarrow \quad \quad \quad 0,075$$

$$\rightarrow n_{\text{HCO}_3^-} \text{ trong X} = 4 \cdot 0,075 = 0,3 \text{ mol}$$

- 100ml X tác dụng với KOH dư:



$$0,05 \quad \leftarrow \quad 0,05 \quad \quad \quad \leftarrow \quad \quad \quad 0,05$$

$$\rightarrow n_{\text{Ba}^{2+}} \text{ trong X} = 4 \cdot 0,05 = 0,2 \text{ mol}$$

Theo định luật bảo toàn điện tích:

$$2n_{\text{Ba}^{2+}} + n_{\text{K}^+} = n_{\text{HCO}_3^-} + n_{\text{NO}_3^-} \rightarrow 2 \cdot 0,2 + x = 0,3 + y \rightarrow y - x = 0,1 \quad (1)$$

- Đun sôi đến cạn 400 ml dung dịch X



$$0,3 \rightarrow 0,15$$

$$\Rightarrow m_{\text{rắn}} = 137. 0,2 + 39x + 60. 0,15 + 62y = 2. 26,35$$

$$\Rightarrow 39x + 62y = 16,3 \quad (2)$$

Từ (1) và (2) ta được: $x = 0,1$; $y = 0,2$.



Câu II.

1. Viết phương trình minh họa cho các trường hợp sau:

a/ Cho dung dịch NH_3 tới dư vào dung dịch CuCl_2 .

b/ Cho dung dịch HCl vào dung dịch $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$.

Giải




2. Chỉ dùng thêm dung dịch HCl , hãy phân biệt các dung dịch đựng trong các bình mất nhãn: $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$, NaOH , AgNO_3 , NH_4NO_3 , NaNO_3 .

Giải


- Trích mẫu thử cho mỗi lần thí nghiệm

- Nhỏ HCl lần lượt vào các mẫu thử

+ Mẫu nào có kết tủa trắng là AgNO_3




+ Mẫu nào có khí thoát ra hóa nâu trong không khí là $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$




Ko màu nâu

+ Ba mẫu còn lại không có hiện tượng gì

- Dùng dd $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ làm thuốc thử, nhận ra dd NaOH vì có kết tủa trắng xanh hóa nâu trong không khí



- Dùng dd NaOH làm thuốc thử, nhận ra dd NH_4NO_3 vì có khí thoát ra có mùi khai




- Chất còn lại là NaNO_3

3. Cho 1,82 gam hỗn hợp X gồm Cu và Ag (tỉ lệ mol tương ứng 4:1) vào 30 ml dung dịch gồm H_2SO_4 0,5M và HNO_3 2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được a mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N^{+5}). Trộn a mol NO trên với 0,1 mol O_2 thu được hỗn hợp khí Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với nước thu được 150 ml dung dịch có pH = t. Tìm giá trị của t. (5/165)


Giải

$$^n\text{Ag} = 0,005 \text{ mol}; ^n\text{Cu} = 0,02 \text{ mol}; ^n\text{H}^+ = 0,09 \text{ mol}; ^n\text{NO}_3^- = 0,06 \text{ mol}.$$



$$0,02 \rightarrow 0,04/3 \rightarrow 0,16/3 \rightarrow 0,04/3$$



**Câu III.**

1. Cho biết sản phẩm chính - phụ của phản ứng giữa propilen với HBr. Giải thích theo cơ chế phản ứng.


Giải

2. Khi cho isopentan tác dụng với clo có chiếu sáng thì thu được hỗn hợp các dẫn xuất monoclo. Biết khả năng phản ứng tương đối của các nguyên tử H thuộc cacbon bậc I, II và III tương ứng là 1: 3,3: 4,4. Tính thành phần phần trăm các dẫn xuất nói trên.

Giải

Câu IV.

1. Từ metan, các chất vô cơ và điều kiện khác xem như có đủ, viết các phương trình điều chế cao su buna và PVA.



2. Cho m gam hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức X_1 , X_2 (X_2 nhiều hơn X_1 1 nguyên tử C) phản ứng với CuO đun nóng, thu được 2,25 gam H_2O ; hỗn hợp Y gồm 2 andehit tương ứng và 2 ancol dư. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 5,6 lít CO_2 (đktc) và 5,85 gam H_2O .

a. Xác định công thức của 2 ancol.

b. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO_3 trong NH_3 đun nóng, thu được 48,6 gam Ag. Tính hiệu suất oxi hóa mỗi ancol.

Giải

$$a/ \text{ } ^n\text{H}_2\text{O} = 0,125 = \text{ } ^n\text{andehit} = \text{ } ^n\text{ancol pur} \Rightarrow \text{ } ^n\text{ancol ban đầu} > 0,125$$

$$\text{ } ^n\text{CO}_2(\text{Y}) = \text{ } ^n\text{CO}_2(\text{X}) = 0,25$$

$$\Rightarrow \text{X có số C trung bình} < \frac{0,25}{0,125} = 2$$

$\Rightarrow$ X có chứa CH_3OH (X_1) $\rightarrow$ X_2 là $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ (vì hơn 1 cacbon và đều là ancol đơn chức)

$$b/ \text{ Khi đốt Y ta có } \text{ } ^n\text{H}_2\text{O}(\text{Y}) = 5,85/18 = 0,325 \text{ mol}$$

$$\text{Ta thấy: } \text{ } ^n\text{H}_2\text{O}(\text{X}) = \text{ } ^n\text{H}_2\text{O}(\text{Y}) + \text{ } ^n\text{H}_2\text{O}_{\text{sinh ra khi pur với CuO}} = 0,45$$



Gọi a, b lần lượt là số mol ban đầu của CH_3OH và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

$$\text{Ta có hệ pt: } a + b = \text{ } ^n\text{H}_2\text{O} - \text{ } ^n\text{CO}_2 = 0,45 - 0,25 = 0,2$$

$$a + b = \text{ } ^n\text{CO}_2 = 0,25$$

$$\Rightarrow a = 0,15 \text{ và } b = 0,05$$

Gọi x, y lần lượt là số mol phản ứng của CH_3OH và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$



$$\text{Ta có hệ pt: } \text{ } ^n\text{H}_2\text{O} = \text{ } ^n\text{andehit} = x + y = 0,125$$

$$\text{ } ^n\text{Ag} = 4x + 2y = 48,6/108 = 0,45$$

$$\Rightarrow x = 0,1 \text{ và } y = 0,025$$







Vậy hiệu suất oxi hóa mỗi ancol là

$$H_{\text{CH}_3\text{OH}} = \frac{0,1}{0,2} \times 100\% = 50\%$$

$$H_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}} = \frac{0,025}{0,05} \times 100\% = 50\%$$

Câu V.

1. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau



2. Chất hữu cơ X có công thức phân tử C_9H_8 . Biết X tác dụng được với dung dịch AgNO_3 trong NH_3 tạo kết tủa vàng. Còn khi đun nóng X với dung dịch thuốc tím thì thu được kali terephtalat. Biện luận và xác định công thức cấu tạo của X, viết các phương trình hóa học minh họa.

Giải

Vì khi đun nóng X với dung dịch thuốc tím thì thu được kali terephthalat → X có vòng

benzene và có 2 nhánh ở vị trí para của nhau đồng thời có nhánh chứa liên kết ba.

→ CTCT X là $p\text{-CH}_3\text{-C}_6\text{H}_4\text{-C}\equiv\text{CH}$

kể thời gian phát đề)

Câu 1: (4 điểm)

1.1 (1,5 điểm)

Hoàn thành các phản ứng sau:

- a. $A + B \rightarrow D + H_2O$ b. $A + E \rightarrow F + CO_2 + H_2O$
c. $A + G \rightarrow H \downarrow + B + H_2O$ d. $A + I \rightarrow D + J + H_2O$
e. $A \rightarrow D + CO_2 + H_2O$ f. $A + K \rightarrow L + M + CO_2 + H_2O$

Biết A là hợp chất của Na.

1.2. (2,5 điểm)

Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết 5 dung dịch muối sau chỉ dùng một thuốc thử: dd NaCl; dd AlCl₃; dd FeCl₃; dd CuCl₂; dd ZnCl₂.

Câu 2: (5,0 điểm)

2.1(1,5 điểm)

Từ phản ứng thuận nghịch sau : $PCl_5 (k) \rightleftharpoons PCl_3 (k) + Cl_2 (k)$.

Hỗn hợp sau khi đạt đến trạng thái cân bằng có $d_{hh/KK} = 5$ ở 190°C và 1 atm.

a/ Tính hệ số phân li α của PCl₅.

b/ Tính hằng số cân bằng K_p.

c/ Tính hệ số phân li α ở áp suất P = 0,5 atm.

2.2. (1,5 điểm)

Từ quặng photphoric và các điều kiện có đủ, viết phương trình phản ứng điều chế: P, suppephotphat đơn và suppe photphat kép. Tính độ dinh dưỡng của suppe photphat kép.

2.3. (2,0 điểm)

Hỗn hợp X gồm cacbon, silic và photpho đỏ. Cho X vào dung dịch NaOH đặc dư đến khi phản ứng xong, thu được 1,232 lít khí (đktc) và phần không tan Y. Cho Y tan hết vào 20 ml dung dịch HNO₃ 63% (D = 1,48 g/ml) được 7,280 lít (đktc) hỗn hợp A gồm hai khí có tỉ khối với N₂ là 1,633 và dung dịch B.

a/Viết các phương trình hóa học và tính phần trăm khối lượng các chất trong X.

b/Thêm nước cất vào B để có 100 ml dung dịch B'. Tính pH của dung dịch B' biết H₃PO₄ có K₁ = 7,6.10⁻³; K₂ = 6,2.10⁻⁸; K₃ = 4,2.10⁻¹³.

c/Hấp thụ toàn bộ khí A vào 200 ml dung dịch KOH 2M, sau đó cô cạn dung dịch và nung chất rắn đến khối lượng không đổi. Tính khối lượng chất rắn thu được

Câu 3: (4 điểm)

3.1 (1,0 điểm)

Có 6 dung dịch cùng nồng độ mol : Na₂CO₃ ; Na₂SO₄ ; NaHCO₃ ; Na₃PO₄ ; FeCl₃ và AgNO₃ .

Giả sử dung dịch C $\text{Ba}(\text{OH})_2$ có cùng nồng độ mol như các dung dịch trên. Trộn Vml dung dịch C và Vml dung dịch một trong các muối trên thì trường hợp nào thu được kết tủa lớn nhất ?

3.2 (3,0 điểm)

Hòa tan 115,3 (g) hỗn hợp X gồm MgCO_3 và RCO_3 bằng 500ml dung dịch H_2SO_4 loãng, thu được dung dịch A, chất rắn B và 4,48(l) CO_2 (đktc). Cô cạn dung dịch A thì thu được 12(g) muối khan. Mặt khác, đem nung chất rắn B đến khối lượng không đổi thì thu được 11,2 (l) CO_2 (đktc) và chất rắn B_1 .

- Tính nồng độ C_M của dung dịch H_2SO_4 đã dùng.
- Tính khối lượng của B và B_1 .
- Tính khối lượng nguyên tử của R biết trong hỗn hợp đầu số mol của RCO_3 gấp 2,5 lần số mol của MgCO_3 .

Câu 4: (4 điểm)

4.1. (1,0 điểm)

X là chất hữu cơ, đốt cháy X chỉ thu được CO_2 và H_2O biết $M_X < 60$. Mặt khác khi cho X tác dụng với $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$ (dư) thì tỷ lệ mol phản ứng là $n_X : n_{\text{AgNO}_3} = 1:2$. Viết các công thức cấu tạo có thể có của X.

4.2. (3,0 điểm)

Một chất hữu cơ A no mạch hở, phân tử chứa một chức ancol và chứa chức $-\text{COOH}$, có công thức nguyên: $(\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_5)_n$

- Xác định công thức phân tử và viết công thức các đồng phân có thể có của A
- Xác định cấu tạo đúng của A, biết A tách nước cho hai sản phẩm đồng phân B, C. Viết công thức cấu tạo của B, C.
- So sánh nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của B, C. Giải thích?
- So sánh tính axit giữa B và C. Giải thích?

Câu 5: (3,0 điểm)


- Đốt hoàn toàn Hidro cacbon A cho $V_{\text{CO}_2} : V_{\text{H}_2\text{O}} = 1,75$ khi hoà tan 0,45 g A trong 50 g C_6H_6 thì nhiệt độ sôi (dd) = $80,355^\circ\text{C}$ ($t_{\text{sôi}} \text{C}_6\text{H}_6 = 80,1^\circ\text{C}$). Xác định CTPT của A biết hằng số nghiệm sôi là 2,61.
- Cho 20,7 g A phản ứng hoàn toàn với $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$ dư được 68,85 g kết tủa. Mặt khác A phản ứng với HCl cho B chứa 59,66 % Clo trong phân tử. Cho B phản ứng với Br_2/as , t° (tỷ lệ mol 1:1) chỉ thu được 2 dẫn xuất Halogen. Viết CT cấu tạo của A, B. Viết các phản ứng.
- Đồng phân D của A không làm mất màu Br_2/CCl_4 nhưng phản ứng được với Br_2/as và Br_2/Fe , t° . Xác định CTCT của D và viết phương trình phản ứng.

ĐÁP ÁN


Câu 1: (4 điểm)

1.1 (1,5 điểm) $0,25 * 6 \text{ pt} = 1,5$

- $$\begin{array}{ccccccc} \text{NaHCO}_3 & + & \text{NaOH} & \rightarrow & \text{Na}_2\text{CO}_3 & + & \text{H}_2\text{O} \\ \text{A} & & \text{B} & & \text{D} & & \end{array}$$
- $$\begin{array}{ccccccc} \text{NaHCO}_3 & + & \text{HCl} & \rightarrow & \text{NaCl} & + & \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \\ & & \text{E} & & \text{F} & & \end{array}$$



A G H B



A I D J



A D








A K L M

Học sinh không cần xác định A, B, D.....

1.2(2,5điểm) 0,5 / 1 chất*5 = 2,5

	NaCl	AlCl ₃	FeCl ₃	CuCl ₂	ZnCl ₂
Dd NH ₃	-	Kết tủa trắng	Kết tủa nâu đỏ	Kết tủa xanh	Kết tủa trắng
Dd NH ₃ dư	1	Không tan	2	3	Tan (4)

Các phương trình:




Dùng thuốc thử khác không cho điểm

Câu 2: (5 điểm)

2.1 (1,5 điểm)

a) Tính hệ số phân li α của PCl_5 :



Gọi : số mol PCl_5 ban đầu : n

Số mol PCl_5 bị phân tích : $n\alpha$

Số mol PCl_3 = số mol Cl_2 : $n\alpha$

$$d_{\text{PCl}_5/\text{KK}} = \frac{M_{\text{PCl}_5}}{29} = \frac{m_{\text{PCl}_5}}{29n} = d_0 \quad (1)$$

Sau phản ứng :

$$d_{\text{hh}/\text{KK}} = \frac{m_{\text{hh}}}{29n(1+\alpha)} = d \quad (2)$$

$$\text{Ta có (1) : (2) : } \frac{d_0}{d} = 1 + \alpha \Rightarrow \alpha = \frac{d_0}{d} - 1 = \frac{7,2 - 5}{5} = 0,44$$

0,5đ

b) Tính hằng số cân bằng K_p :

Gọi P là áp suất hệ thống : P = 1 atm

$$\frac{P_{\text{PCl}_5}}{n(1-\alpha)} = \frac{P_{\text{PCl}_3}}{n\alpha} = \frac{P_{\text{Cl}_2}}{n\alpha} = \frac{P}{n(1+\alpha)} = \frac{1}{n(1+\alpha)}$$

$$K_p = \frac{P_{\text{PCl}_3} \cdot P_{\text{Cl}_2}}{P_{\text{PCl}_5}} = \frac{\alpha^2}{1-\alpha^2} = 0,24$$

0,5đ






c) Tính hệ số phân li α ở áp suất P = 0,5 atm :

$$\alpha' = \sqrt{\frac{K_p}{K_p + P}} = \sqrt{\frac{0,24}{0,24 + 0,5}} = 0,57$$

0,5đ



2.2. (1,5 điểm)

Các phản ứng điều chế:



$$\text{Độ dinh dưỡng là: } = \frac{142}{234} * 100 = 60,68\% \quad (0,5 \text{ điểm})$$

2.3. (2,0 điểm)



$$\text{Số mol Si} = 0,055/2 = 0,0275 \text{ mol};$$

$$\text{Số mol CO}_2 = 0,045 \text{ mol}$$

$$\text{Số mol NO}_2 = 0,045 \text{ mol}$$

$$\rightarrow n\text{C} = n\text{CO}_2 = 0,045 \text{ mol};$$

$$n_p = 0,02 \text{ mol.}$$

$$m_{hh} = 1,93 \text{ gam.}$$

$$\%m\text{Si} = 39,9\%; \quad \%m\text{C} = 27,98\%; \quad \%m\text{P} = 32,12\%.$$

(1,0điểm)

b. Do $K_1 \gg K_2$ và K_3 nên chỉ tính pH theo K_1 và HNO_3 dư $\rightarrow \text{pH} = 0,77$. (0,5 điểm)








$$\text{Số gam chất rắn khan} = 0,045 \times 138 + 0,28 \times 85 + 0,03 \times 56$$

điểm)

(0,5


$$= 31,69 \text{ gam}$$

Câu 3: (4 điểm)



Qua các phương trình trên ta thấy dung dịch Na_2SO_4 sẽ tạo nên lượng kết tủa lớn nhất là $\text{BaSO}_4\downarrow$. (0,5 điểm)

3.2 (3,0 điểm)





Khi nung chất rắn B thu được $\text{CO}_2 \Rightarrow$ Trong B còn dư muối $\text{CO}_3^{2-} \Rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$ đã hết ở (1) & (2).

$$(1) \& (2) \Rightarrow n_{\text{H}_2\text{SO}_4} = n_{\text{CO}_2} = \frac{4,48}{22,4} = 0,2 \text{ (mol)}$$

$$\Rightarrow [\text{H}_2\text{SO}_4] = \frac{0,2}{0,5} = 0,4 \text{ (M)}$$

Chỉ có muối cacbonat của kim loại kiềm (trừ Li_2CO_3 ít tan) và muối amoni tan $\Rightarrow$ dung dịch A không có muối cacbonat mà chỉ có muối sunfat $\Rightarrow$ Toàn bộ muối cacbonat dư đều ở trong rắn B.



b) (0,75 điểm) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho (1) & (2)

$$\underbrace{115,3}_{m_x} + \underbrace{98 \cdot 0,2}_{m_{\text{H}_2\text{SO}_4}} = \underbrace{12}_{m_{\text{muối sunfat}}} + \underbrace{0,2 \cdot 44}_{m_{\text{CO}_2}} + \underbrace{18 \cdot 0,2}_{m_{\text{H}_2\text{O}}} + m_B.$$

$$\Rightarrow m_B = 110,5 \text{ (g)}$$

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho (3) & (4)

$$\Rightarrow m_{B_1} = 110,5 \text{ (g)} - 0,5 \cdot 44 = 88,5 \text{ g}$$

c) (0,75 điểm) Theo (1);(2);(3) và (4)

$\Rightarrow$ Tổng số mol 2 muối cacbonat, Tổng số mol CO_2 tạo thành trong 4 phản ứng này.

$$\text{Đề cho : } \begin{cases} a + b = 0,2 + 0,5 = 0,7 \text{ mol} & (5) \\ b = 2,5 a & (6) \end{cases}$$

$$\Rightarrow m_x = 84 \cdot 0,2 + (R \cdot 60) 0,5 = 115,3$$

$$\Rightarrow R = 137 \text{ đvc}$$

Vậy R là Bari (Ba)

Câu 4: (4 điểm)

4.1 (1,0 điểm) Đốt cháy X chỉ thu được CO_2 và $\text{H}_2\text{O} \Rightarrow$ X chứa C,H hoặc C,H,O

Mặt khác X tác dụng với $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$, tỷ lệ mol là 1:2 $\Rightarrow$ X có 1 nhóm -CHO hoặc có 2 liên kết ba đầu mạch. Do $M_x < 60$. X có thể là: $\text{HC}\equiv\text{CH}$; $\text{HC}\equiv\text{C}-\text{C}\equiv\text{CH}$; CH_3CHO ; $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$; $\text{CH}_2=\text{CHCHO}$; HCOOH .

4.2 (3,0 điểm)


a) (1,0 điểm)

Công thức phân tử $(C_4H_6O_5)_n$ hay $C_{4n}H_{6n}O_{5n}$ có $\Delta = n+1$ là hợp chất no nên có $(n+1)$ chức axit và có $2(n+1)$ nguyên tử oxi trong chức $-COOH \rightarrow$ số chức ancol của phân tử: $5n - 2(n+1) = 3n-2$.

Theo đề: $3n - 2 = 1 \rightarrow n = 1$.

Vậy A có 1 chức ancol, 2 chức axit. $\Rightarrow$ CTPT: $C_4H_6O_5$



Các đồng phân của A:





b) (1,0 điểm)

A tách nước tạo 2 sản phẩm đồng phân B, C $\Rightarrow$ B, C là 2 dạng hình học.

Vậy A :



2 dạng hình học của sản phẩm:





c)(0,5 điểm)

Nhiệt độ nóng chảy:

Cis(B) < trans(C) do dạng Cis có $V_{\text{lớn}} \rightarrow D_{\text{bé}} \rightarrow$ nhiệt độ nóng chảy thấp. (0,5đ)


Nhiệt độ sôi:

Cis(B) < trans(C) do dạng Cis có liên kết H nội phân tử còn dạng trans có liên kết H liên phân tử. (0,5đ)



d)(0,5 điểm)


Tính axit:



Câu 5: (3,0 điểm)

a) (1,0 điểm)


$$M_A = k \cdot \frac{1000}{p} \cdot \frac{m}{\Delta t} = 2,61 \cdot \frac{0,45 \cdot 1000}{50(80,355 - 80,1)} = 92(\text{đvc})$$



$$\left\{ \begin{array}{l} V_{CO_2} : V_{H_2O} = x : \frac{y}{2} = 1,75 \\ M_A = 12x + y = 92 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x=7 \\ y=8 \end{array} \right. \Rightarrow \text{CTPT: } C_7H_8$$

b) (1,5 điểm)


A tạo kết tủa với $AgNO_3/NH_3 \rightarrow A$ có nhóm $(-C \equiv CH)$



$$n \downarrow = n_A = x = 20,7 : 92 = 0,225 (\text{mol})$$



$$m \downarrow = (92 + 107n)0,225 = 68,85 (\text{g}) \Rightarrow n = 2.$$

Vậy A có 2 liên kết $(\equiv)$ đầu mạch (có 4 công thức cấu tạo)




$\Rightarrow$ CTPT B là : $C_7H_{12}Cl_4$

• Các phương trình phản ứng từ A $\rightarrow$ B (theo qui tắc MCNC)




Khi Br_2 hoá B (xúc tác ánh sáng, nhiệt độ) cho 2 dẫn xuất Halogen nên B có công thức phù hợp là B_4 và A có công thức là A_4 .



c) (0,5 điểm)

Đồng phân D (của A) có 4 liên kết π , không làm nhạt màu Br_2/CCl_4 . Vậy D có vòng thơm:



SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT CAO BÁ QUÁT

ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC: 2016 - 2017
MÔN HOÁ HỌC LỚP 11
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát
đề)

Câu 1: (2 điểm)

1.1. Tính pH của dung dịch CH_3COOH 0,010M và NH_4Cl 0,100M.

Biết: $K_{CH_3COOH} = 10^{-4,76}$, $K_{NH_3} = 10^{-4,76}$
(1 điểm)

1.2. Tích số tan của CaC_2O_4 ở $20^\circ C$ bằng $2 \cdot 10^{-9}$. Hãy so sánh độ tan của nó trong nước và trong dung dịch $(NH_4)_2C_2O_4$ 0,1M. (1 điểm)

Câu 2: (3 điểm)

2.1. Hòa tan hoàn toàn 30,0 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn trong dung dịch HNO_3 , sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí gồm 0,1 mol N_2O và 0,1 mol NO. Cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng thu được 127 gam muối. Tính số mol HNO_3 tối thiểu cần để tham gia các phản ứng trên. (1 điểm)

2.2. Hoà tan m gam NH_4HCO_3 vào 120 ml dung dịch HCl 0,25 M thấy thoát ra V lit khí (đktc). Phản ứng xong, đổ lượng dư dung dịch $Ca(OH)_2$ vào dung dịch tạo thành, được a gam kết tủa. Mặt khác khi đun nóng nhẹ m gam NH_4HCO_3 với lượng dư dung dịch $Ba(OH)_2$ thì sau khi phản ứng kết thúc thu được 1 dung dịch có khối lượng nhỏ hơn khối lượng của dung dịch $Ba(OH)_2$ đã dùng là 6,75 gam. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lượng nước bị bay hơi trong quá trình thí nghiệm là không đáng kể. Hãy xác định m, a, V. (1 điểm)

2.3. Thủy phân hoàn toàn 2,475 gam halogenua của photpho người ta thu được hỗn hợp 2 axit (axit của photpho với số oxi hóa tương ứng và axit không chứa oxi của halogen). Để trung hòa hoàn toàn hỗn hợp này cần dùng 45 ml dung dịch NaOH 2M. Xác định công thức của halogenua đó. (1 điểm)

Câu 3: (3 điểm)

3.1. Đốt cháy hoàn toàn hidrocarbon R, thu được tỉ lệ số mol H_2O và CO_2 tương ứng bằng 1,125.

a) Xác định công thức phân tử của R. (0.75 điểm)

b) R_1 là đồng phân của R, khi tác dụng với Cl_2 , điều kiện thích hợp, tỉ lệ mol 1:1 thì thu được một dẫn xuất mono clo duy nhất (R_2). Gọi tên R_1 , R_2 và viết phương trình phản ứng xảy ra. (0.25 điểm)

3.2. Oxi hóa một lượng ancol C bằng oxi, xúc tác, thu được hỗn hợp X. Chia X thành ba phần bằng nhau:

Phần 1 tác dụng với dung dịch $AgNO_3$ trong amoniac dư thu được 21,6 gam Ag.


Phần 2 tác dụng với dung dịch $NaHCO_3$ dư thu được 2,24 lít khí.

Phần 3 tác dụng với Na vừa đủ thu được 4,48 lít khí và 25,8 gam chất rắn khan.

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra. (0.75 điểm)


b) Xác định công thức cấu tạo của ancol C, biết đun nóng ancol C với H_2SO_4 đặc, ở $170^\circ C$ được anken, các chất khí đo ở đktc và các phản ứng xảy ra hoàn toàn. (0.25 điểm)

3.3. Tìm các chất thích hợp ứng với các ký hiệu A_1 , A_2 , A_3 , A_4 , A_5 trong sơ đồ sau và hoàn thành các phương trình phản ứng dưới dạng công thức cấu tạo? (1 điểm)



Câu 4. (2 điểm)

4.1. Trình bày cơ chế tóm tắt của các phản ứng sau đây ? (1 điểm)



4.2. Hoàn thành các phản ứng sau dưới dạng công thức lập thể và cho biết khả năng quang hoạt của mỗi sản phẩm. (1 điểm)


- a) (S)(Z)-3-penten-2-ol + $\text{KMnO}_4 \rightarrow \text{C}_5\text{H}_{12}\text{O}_3$
- b) racemic (E)-4-methyl-2-hexen + $\text{Br}_2 \rightarrow \text{C}_7\text{H}_{14}\text{Br}_2$
- c) (S)- $\text{HOCH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{KMnO}_4 \rightarrow \text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}_4$
- d) (R)-2-ethyl-3-methyl-1-penten + $\text{H}_2/\text{Ni} \rightarrow \text{C}_8\text{H}_{18}$

----- HẾT -----


Ghi chú: - Học sinh không được sử dụng bất kì tài liệu nào (kể cả Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)

- Giám thị coi thi không cần giải thích gì thêm.


Câu 1:



0,100M 0,100




0.2
5



0.2
5

Vì $K_{CH_3COOH} \cdot C_{CH_3COOH} \gg K_{NH_4^+} C_{NH_4^+} > K_{H_2O}$ tính $[H^+]$ theo (2):



$$\frac{x^2}{0,010 - x} = 10^{-4,76} \Rightarrow x = 10^{-3,38} = 4,17 \cdot 10^{-4} M$$

$$[H^+] = 4,17 \cdot 10^{-4} \Rightarrow pH = 3,38.$$


0.5

Từ cân bằng (3): $[NH_3] = 10^{-9,24} \cdot \frac{0,1}{10^{-3,38}} = 10^{-6,86} \ll 10^{-3,38}$,

Vậy: sự phân li NH_4^+ là không đáng kể so với CH_3COOH

1.2.


Gọi độ tan của CaC_2O_4 ở $20^\circ C$ trong nước nguyên chất là S:



0.2
5



Độ tan của CaC_2O_4 trong dung dịch $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$ 0,1M



Gọi độ tan của CaC_2O_4 trong dung dịch $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$ 0,1M là S_1 :

$$[\text{Ca}^{2+}] = S_1 ; [\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = S_1 + 0,1$$

Giả sử $S_1 \ll 0,1$ thì $[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = 0,1\text{M}$

$$K_s(\text{CaC}_2\text{O}_4) = [\text{Ca}^{2+}] \cdot [\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = S_1 \cdot 0,1 = 2 \cdot 10^{-9}$$

$$\Rightarrow S_1 = 2 \cdot 10^{-8} \text{ M} \ll S$$

0.5

Vậy: Độ tan của CaC_2O_4 trong $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$ 0,1M nhỏ hơn độ tan của nó trong nước rất nhiều.

0.2

5

Câu 2:

2.1.

Đặt số mol Mg, Al, Zn lần lượt là x, y, z mol



$$x \quad 2x$$



$$y \quad 3y$$



$$z \quad 2z$$

Tổng số mol electron chất khử nhường là: $2x + 3y + 2z$

Các muối tạo ra là $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$: x mol, $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$: y mol, $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$: z mol → số mol gốc NO_3^- trong muối = $2x + 3y + 2z$

Giả sử sản phẩm khử HNO_3 chỉ có N_2O và NO thì tổng số mol electron chất oxi hóa nhận là : $0,1 \cdot 8 + 0,1 \cdot 3 = 1,1 \text{ mol}$

Phương trình bảo toàn electron: $2x + 3y + 2z = 1,1$

→ số mol gốc NO_3^- trong muối = $2x + 3y + 2z = 1,1$

Vậy khối lượng muối khan thu được là: $m_{\text{muối}} = m_{\text{KL}} + m_{\text{NO}_3^-} = 30$ 0.2

$+ 62 \cdot 1,1 = 98,2 \text{ gam} < 127$ (theo bài cho)

5

Chứng tỏ ngoài N_2O và NO , sản phẩm khử HNO_3 còn có NH_4NO_3

Gọi số mol NH_4NO_3 tạo ra là a mol → số mol electron mà chất oxi hóa nhận là: $0,1 \cdot 8 + 0,1 \cdot 3 + 8a = 1,1 + 8a$

Phương trình bảo toàn electron: $2x + 3y + 2z = 1,1 + 8a$

→ số mol gốc NO_3^- trong muối $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 + \text{Al}(\text{NO}_3)_3 + \text{Zn}(\text{NO}_3)_2$

$= 2x + 3y + 2z = 1,1 + 8a$

Khối lượng muối tạo thành = khối lượng $Mg(NO_3)_2 + Al(NO_3)_3 + Zn(NO_3)_2 + NH_4NO_3$

$$= 30 + 62. (1,1 + 8a) + 80.a = 127 \rightarrow a =$$

0,05 mol (0,5 điểm)

0.5

Bảo toàn nguyên tố nitơ, ta có :

Số mol HNO_3 cần phản ứng = số mol NO_3^- trong muối 3 kim loại + số mol N trong N_2O , NO , NH_4NO_3

$$= 1,1 + 8. 0,05 + 0,1.2 + 0,1 + 0,05. 2 = 1,9$$

mol

(0,5 điểm)

0.2

5

2.2.

Khi cho dung dịch $Ca(OH)_2$ vào thấy kết tủa nên NH_4HCO_3 dư, HCl hết



$$0,03 \text{ mol} \quad ,03 \text{ mol} \quad 0,03 \text{ mol}$$


$$V = V_{CO_2} = 0,03. 22,4 = 0,672 \text{ lít}$$

0.2

5



$$x-0,03 \quad x-0,03$$



x

x

x

Gọi số mol của NH_4HCO_3 ban đầu là x mol

$$m_{BaCO_3} + m_{NH_3} - m_{NH_4HCO_3} = m_{\text{dd giảm}}$$

$$197x + 17x - 79x = 6,75$$

$$\rightarrow x = 0,05 \text{ mol}$$

0.2

$$m_{(NH_4HCO_3)} = 0,05.79 = 3,95 \text{ gam} = m$$

5

$$m_{CaCO_3} = 0,02. 100 = 2 \text{ gam} = a$$

0.2

5


0.2

5


2.3.

Halogenua của photpho có thể có công thức PX_3 hoặc PX_5 .

- Trường hợp PX_3 :



$H_3PO_3 + 2NaOH \rightarrow Na_2HPO_3 + 2H_2O$ (axit H_3PO_3 là axit hai lần axit)



số mol NaOH = 2. 0,045 = 0,09 mol

Để trung hòa hoàn toàn sản phẩm thủy phân 1 mol PX_3 cần 5 mol NaOH;




số mol PX_3 = 1/5 số mol NaOH = 0,09/5 = 0,018 mol

0.5

Khối lượng mol phân tử PX_3 = 2,475/0,018 = 137,5

Khối lượng mol của X = (137,5 - 31): 3 = 35,5 $\Rightarrow$ X là Cl . **Công thức PCl_3**

- Trường hợp PX_5 :



số mol NaOH = 2. 0,045 = 0,09 mol

0.5

Để trung hòa hoàn toàn sản phẩm thủy phân 1 mol PX_5 cần 8 mol NaOH;

số mol PX_5 = 1/8 số mol NaOH = 0,09/8 = 0,01125 mol

Khối lượng mol phân tử PX_5 = 2,475/0,01125 = 220

Khối lượng mol của X = (220 - 31): 5 = 37,8 $\Rightarrow$ không ứng với halogen nào.

Câu 3:

3.1.

a) Do nH_2O : $nCO_2 > 1 \Rightarrow R$ là C_nH_{2n+2} ($n \geq 1$)

Phản ứng: $C_nH_{2n+2} + (3n+1)/2O_2 \rightarrow nCO_2 + (n+1)H_2O$ (1)

Từ $(n+1)$: $n=1,125 \Rightarrow n=8 \Rightarrow R$: C_8H_{18}

0.7

5

b) Do R_1 tác dụng với Cl_2 tạo 1 dẫn xuất monoclo duy nhất R_2

$\Rightarrow R_1$: $(CH_3)_3C - C(CH_3)_3$: 2,2,3,3-tetrametylbutan

R_2 : $ClCH_2(CH_3)_2C - C(CH_3)_3$: 1-clo-2,2,3,3-tetrametylbutan





0.2



5

3.2.

Do oxi hóa C được SP tráng gương, tách nước tạo olefin $\Rightarrow$ C là ancol no, đơn chức mạch hở, bậc một. Vậy C: RCH_2OH (R : C_nH_{2n+1} - , $n \geq 1$).



Hỗn hợp X gồm RCHO, RCOOH, H₂O và RCH₂OH dư.



Gọi số mol RCH₂OH, RCHO, RCOOH trong 1/3 hỗn hợp X lần lượt là x, y, z mol.

Theo (1 → 7) và bài ra ta có hệ:

$$\begin{cases} 2y = 0,2 \\ z = 0,1 \\ 0,5z + 0,5x + 0,5(y+z)z = 0,2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,1 \\ y = 0,1 \\ z = 0,1 \end{cases}$$




Chất rắn khan thu được sau phản ứng ở phần III gồm :

0,1 (mol) RCOONa ; 0,1 (mol) RCH₂ONa và 0,2 (mol) NaOH.






Số gam chất rắn khan : $(R + 67) \cdot 0,1 + (R + 53) \cdot 0,1 + 40 \cdot 0,2 = 25,8$ (gam)

$\Rightarrow M_R = 29 \Rightarrow R$ là C₂H₅ - Vậy ancol C: CH₃-CH₂-CH₂-OH.

3.3.




Phương trình phản ứng:



Câu 4.


4.1.

a)



0.5

b)




0.5


4.2.

1/4

a) Đây là quá trình *syn*-hidroxy hóa


pt

b) Đây là quá trình *anti*-brom hóa




C₂c s₁ n p h m @i t o h n h i p r a x e m i c k h n g q u a n g h o t

c) Hidroxyl hóa



d) Hidro hóa




SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT NAM
GIANG

**ĐỀ THI OLYMPIC HÓA HỌC LỚP 11
NĂM HỌC 2016 -2017**

(Thời gian làm bài 150 phút)

Câu 1: (5 điểm)

1.1 Hoàn thành các phản ứng sau:





1.2. Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết 5 dung dịch muối sau chỉ dùng một thuốc thử: dd NaCl; dd $AlCl_3$; dd $FeCl_3$; dd $CuCl_2$; dd $ZnCl_2$.

1.3. Từ quặng photphoric và các điều kiện có đủ, viết phương trình phản ứng điều chế: P, suppephotphat đơn và suppe photphat kép. Tính độ dinh dưỡng của suppe photphat kép.

Câu 2: (5 điểm)

2.1. Công thức phân tử chung của 3 chất hữu cơ (X), (Y), (T) đều có dạng $(CH)_n$.

Biết rằng:



Xác định công thức cấu tạo của 3 chất (X), (Y), (T) và viết các phương trình phản ứng.

2.2. Có phản ứng sau: $X + H_2$ (dư) $\rightarrow$ 3-metylbutan-1-ol. Xác định các công thức có thể có của X và viết các phản ứng xảy ra.

2.3. X là chất hữu cơ, đốt cháy X chỉ thu được CO_2 và H_2O biết $M_X < 60$. Mặt khác khi cho X tác dụng với $AgNO_3/NH_3$ (dư) thì tỷ lệ mol phản ứng là $n_X : n_{AgNO_3} = 1:2$. Viết các công thức cấu tạo có thể có của X.

Câu 3: (5 điểm)

3.1. Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam sunfua của kim loại M (công thức MS) trong oxi dư. Chất rắn sau phản ứng đem hòa tan trong một lượng vừa đủ dung dịch HNO_3 37,8% thấy nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch thu được là 41,72%. Khi làm lạnh dung dịch này thì thoát ra 8,08 gam muối rắn. Lọc tách muối rắn thấy nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch là 34,7%. Xác định công thức của muối rắn

3.2. Hòa tan x gam hỗn hợp bột gồm 2 kim loại Mg và Al vào y gam dung dịch HNO_3 24%. Sau phản ứng thu được dung dịch A và 0,896 lít hỗn hợp X gồm 3 khí không màu có khối lượng 1,32 gam. Thêm một lượng O_2 vừa đủ vào X, phản ứng xong thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn Y từ từ qua dung dịch NaOH dư

thấy còn lại khí Z (có tỉ khối hơi của Z so với H_2 bằng 18). Nếu cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch A đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất thấy cân nặng 6,42 gam (không có khí thoát ra). Tính x và y biết rằng HNO_3 đã lấy dư 15% so với lượng cần thiết, các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn và các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.

Câu 4: (5 điểm)

4.1. Oxi hóa 0,08 mol một ancol đơn chức, thu được hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic, một andehyt, ancol dư và nước. Ngưng tụ toàn bộ X rồi chia làm hai phần bằng nhau. Phần một cho tác dụng hết với Na dư thu được 0,504 lít khí H_2 (đktc). Phần hai cho phản ứng tráng Ag hoàn toàn thu được 9,72 gam Ag. Phần trăm khối lượng ancol bị oxi hóa là


4.2. A là axit hữu cơ mạch không phân nhánh, B là ancol đơn chức bậc 1 có nhánh. Khi trung hòa hoàn toàn A cần số mol NaOH gấp 2 lần số mol A. Khi đốt cháy B được CO_2 và H_2O với tỉ lệ số mol 4:5. Khi cho 0,1 mol A tác dụng với 0,25 mol B với hiệu suất 73,5% thu được 14,847 gam chất hữu cơ E.

- 1) Viết công thức cấu tạo của A, B, E.
- 2) Tính khối lượng axit A và ancol B đã tham gia phản ứng

(Thời gian làm bài 150 phút)

Câu 1: (4 điểm)

1.1 Hoàn thành các phản ứng sau:



Biết A là hợp chất của Na.

1.2. Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết 5 dung dịch muối sau chỉ dùng một thuốc thử: dd NaCl; dd AlCl₃; dd FeCl₃; dd CuCl₂; dd ZnCl₂.

1.3. Từ quặng photphoric và các điều kiện có đủ, viết phương trình phản ứng điều chế: P, suppephotphat đơn và suppe photphat kép. Tính độ dinh dưỡng của suppe photphat kép.



Câu 1	HƯỚNG DẪN CHẤM						Điểm																		
1.1 1.5đ	+a+						0,2 5đ																		
	$\begin{array}{ccccccc} & & \text{NaHCO}_3 & + & \text{NaOH} & \rightarrow & \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} \\ & \text{A} & & & \text{B} & & \text{D} \end{array}$						0,2 5đ																		
	b.	$\begin{array}{ccccccc} \text{NaHCO}_3 & + & \text{HCl} & \rightarrow & \text{NaCl} & + & \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \\ & & \text{E} & & \text{F} & & \end{array}$					0,2 5đ																		
	c.	$\begin{array}{ccccccc} \text{NaHCO}_3 & + & \text{Ba(OH)}_2 & \rightarrow & \text{BaCO}_3 & + & \text{NaOH} + \text{H}_2\text{O} \\ & & \text{G} & & \text{H} & & \end{array}$					0,2 5đ																		
	d.	$\begin{array}{ccccccc} 2\text{NaHCO}_3 & + & 2\text{KOH} & \rightarrow & \text{Na}_2\text{CO}_3 & + & \text{K}_2\text{CO}_3 + 2\text{H}_2\text{O} \\ & & \text{I} & & \text{J} & & \end{array}$					0,2 5đ																		
	e.	$2\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$					0,2 5đ																		
	f.	$2\text{NaHCO}_3 + 2\text{KHSO}_4 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{K}_2\text{SO}_4 + 2\text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$					0,2 5đ																		
	$\begin{array}{ccc} & \text{K} & \text{L} & \text{M} \\ \text{Học sinh không cần xác định A, B, D.....} \end{array}$																								
1.2 2đ	<table><tr><td></td><td>NaCl</td><td>AlCl₃</td><td>FeCl₃</td><td>CuCl₂</td><td>ZnCl₂</td></tr><tr><td>Dd NH₃</td><td>-</td><td>Kết tủa trắng</td><td>Kết tủa nâu đỏ</td><td>Kết tủa xanh</td><td>Kết tủa trắng</td></tr><tr><td>Dd NH₃ dư</td><td>1</td><td>Không tan</td><td>2</td><td>3</td><td>Tan (4)</td></tr></table>							NaCl	AlCl ₃	FeCl ₃	CuCl ₂	ZnCl ₂	Dd NH ₃	-	Kết tủa trắng	Kết tủa nâu đỏ	Kết tủa xanh	Kết tủa trắng	Dd NH ₃ dư	1	Không tan	2	3	Tan (4)	1,0 đ
		NaCl	AlCl ₃	FeCl ₃	CuCl ₂	ZnCl ₂																			
	Dd NH ₃	-	Kết tủa trắng	Kết tủa nâu đỏ	Kết tủa xanh	Kết tủa trắng																			
	Dd NH ₃ dư	1	Không tan	2	3	Tan (4)																			
	Các phương trình:																								
$\text{AlCl}_3 + 3\text{NH}_3 + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Al(OH)}_3 + 3\text{NH}_4\text{Cl}$																									
	$\text{FeCl}_3 + 3\text{NH}_3 + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Fe(OH)}_3 + 3\text{NH}_4\text{Cl}$						0,2 5đ																		
	$\text{CuCl}_2 + 2\text{NH}_3 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Cu(OH)}_2 + 2\text{NH}_4\text{Cl}$																								

	$\text{ZnCl}_2 + 2\text{NH}_3 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Zn(OH)}_2 + 2\text{NH}_4\text{Cl}$ $\text{Zn(OH)}_2 + 4\text{NH}_3 \rightarrow \text{Zn(NH}_3)_4(\text{OH})_2$ Dùng thuốc thử khác không cho điểm	0,2 5đ 0,2 5đ 0,2 5đ
1.3 1.5đ	Các phản ứng điều chế: $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + \text{SiO}_2 + 2\text{C} \xrightarrow{t^\circ} 3\text{CaSiO}_3 + 2\text{CO} + 2\text{P}$ $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Ca(H}_2\text{PO}_4)_2 + 2\text{CaSO}_4$ $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{H}_3\text{PO}_4 + 3\text{CaSO}_4$ $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + 4\text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow 3\text{Ca(H}_2\text{PO}_4)_2$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div>Supephotphatkep</div> <div> $\text{Ca(H}_2\text{PO}_4)_2$ 234 </div> <div> P_2O_5 142 </div> </div> Độ dinh dưỡng là: $\frac{142}{234} \cdot 100 = 60,68\%$	0,2 5đ 0,2 5đ 0,2 5đ 0,2 5đ 0,2 5đ 0,2 5đ

Câu 2: (5 điểm)

2.1. Công thức phân tử chung của 3 chất hữu cơ (X), (Y), (T) đều có dạng $(\text{CH})_n$.

Biết rằng:



Xác định công thức cấu tạo của 3 chất (X), (Y), (T) và viết các phương trình phản ứng

2.2. Có phản ứng sau: $X + \text{H}_2 (\text{dư}) \rightarrow 3\text{-metylbutan-1-ol}$. Xác định các công thức có thể có của X và viết các phản ứng xảy ra.

2.3. X là chất hữu cơ, đốt cháy X chỉ thu được CO_2 và H_2O biết $M_X < 60$. Mặt khác khi cho X tác dụng với $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$ (dư) thì tỷ lệ mol phản ứng là $n_X : n_{\text{AgNO}_3} = 1:2$. Viết các công thức cấu tạo có thể có của X.

Câu 2	HƯỚNG DẪN CHẤM	Điểm
2.1 2đ	<p>X: $\text{HC}\equiv\text{CH}$; Y: $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\text{C}\equiv\text{CH}$; T: C_6H_6</p> $2\text{CH}\equiv\text{CH} \xrightarrow{\text{xt}, t^\circ} \text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}\equiv\text{CH}$ $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}\equiv\text{CH} + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{Pd/PbCO}_3, t^\circ} \text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$ $n\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2 \xrightarrow{\text{xt}, t^\circ, p} \text{—CH}_2-\text{CH}=\text{CH—CH}_2\text{—}_n$	0,25 đ 0,25 đ

	$3\text{HC}\equiv\text{CH} \xrightarrow{\text{xt}, t^0} \text{C}_6\text{H}_6$ $\text{C}_6\text{H}_6 + \text{Br}_2 \xrightarrow{\text{Fe}, t^0} \text{C}_6\text{H}_5\text{Br} + \text{HBr}$ $\text{C}_6\text{H}_5\text{Br} + 2\text{NaOH}_{\text{đặc}} \xrightarrow{300^\circ\text{C}; 200\text{ atm}} \text{C}_6\text{H}_5\text{ONa} + \text{NaBr} + \text{H}_2\text{O}$ $\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa} + \text{HCl} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{OH} + \text{NaCl}$ $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH} + 3\text{HNO}_3 \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4, t^0} \text{C}_6\text{H}_2\text{OH}(\text{NO}_2)_3 + 3\text{H}_2\text{O}$	0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ
2.2 1.25	<p>TH₁: X là ancol</p> $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH} + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{Ni}, t^0} \text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ $\text{CH}_3\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CHCH}_2\text{OH} + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{Ni}, t^0} \text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ <p>TH₁: X là andehyt</p> $\text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CHO} + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{Ni}, t^0} \text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2\text{CHO} + 2\text{H}_2 \xrightarrow{\text{Ni}, t^0} \text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ $\text{CH}_3\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CHCHO} + 2\text{H}_2 \xrightarrow{\text{Ni}, t^0} \text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ
2.3. 1.75 đ	<p>Đốt cháy X chỉ thu được CO₂ và H₂O ⇒ X chứa C, H hoặc C, H, O</p> <p>Mặt khác X tác dụng với AgNO₃/NH₃, tỷ lệ mol là 1:2 ⇒ X có 1 nhóm -CHO hoặc có 2 liên kết ba đầu mạch. Do M_x < 60. X có thể là: HC≡CH; HC≡C-C≡CH; CH₃CHO; CH₃CH₂CHO; CH₂=CHCHO; HCOOH.</p>	0,25 đ 0,25 đ 1.25 đ

Câu 3: (5 điểm)

3.1. Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam sunfua của kim loại M (công thức MS) trong oxi dư. Chất rắn sau phản ứng đem hòa tan trong một lượng vừa đủ dung dịch HNO₃ 37,8% thấy nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch thu được là 41,72%. Khi làm lạnh dung dịch này thì thoát ra 8,08 gam muối rắn. Lọc tách muối rắn thấy nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch là 34,7%. Xác định công thức của muối rắn.

3.2. Hòa tan x gam hỗn hợp bột gồm 2 kim loại Mg và Al vào y gam dung dịch HNO₃ 24%. Sau phản ứng thu được dung dịch A và 0,896 lít hỗn hợp X gồm

3 khí không màu có khối lượng 1,32 gam. Thêm một lượng O_2 vừa đủ vào X, phản ứng xong thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn Y từ từ qua dung dịch NaOH dư thấy còn lại khí Z (có tỉ khối hơi của Z so với H_2 bằng 18). Nếu cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch A đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất thấy cân nặng 6,42 gam (không có khí thoát ra). Tính x và y biết rằng HNO_3 đã lấy dư 15% so với lượng cần thiết, các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn và các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.

Câu	HƯỚNG DẪN CHẤM	Điểm
3.1 2.5 đ	<p> $MS \text{ a mol} \Rightarrow Ma + 32a = 4,4 \quad (I)$ $2MS + (0,5n+2) O_2 \rightarrow M_2O_n + 2SO_2 \quad (1)$ $\begin{matrix} a & & a/2 & & (mol) \end{matrix}$ $M_2O_n + 2nHNO_3 \rightarrow 2M(NO_3)_n + nH_2O \quad (2)$ $\begin{matrix} a/2 & & na & & a & & (mol) \end{matrix}$ $m_{dd HNO_3} = \frac{500na}{3} ; C\% (\text{muối}) = \frac{Ma+62na}{Ma+8na+\frac{500na}{3}} \cdot 100 = 41,72 \quad (II)$ $\text{Từ (II)} \Rightarrow M = \frac{56}{3}n \quad \text{Vậy } \mathbf{M \text{ là Fe; } a=0,05}.$ Từ các dữ kiện trên ta có khối lượng dung dịch thu được trước khi làm lạnh là: $m = Ma + 8na + 166,67na = 29 \text{ (gam)}$ Sau khi làm lạnh, khối lượng dung dịch là: $29 - 8,08 = 20,92 \text{ (gam)}$ Số mol của $Fe(NO_3)_3$ trong dung dịch sau khi làm lạnh là $Mol Fe(NO_3)_3 = \frac{20,92 \cdot 34,7}{100 \cdot 242} = 0,03 \Rightarrow \text{mol } Fe(NO_3)_3 \text{ trong muối rắn} = 0,02.$ $242 + 18m = 404 \Rightarrow m = 9 \quad \text{Vậy CT của muối } \mathbf{Fe(NO_3)_3 \cdot 9H_2O}$ </p>	<p>0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,5đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ</p>
3.2 2.5 đ	<p> $\overline{M}_x = \frac{1,32}{0,04} = 33$ mà X tác dụng được với $O_2 \rightarrow$ trong X phải chứa NO. $\overline{M}_z = 18 \cdot 2 = 36 \rightarrow$ trong Z có 2 khí là N_2 và N_2O. Vậy trong X có 3 khí là N_2 (a mol), NO (b mol), N_2O (c mol). $\begin{cases} a + b + c = 0,04 \\ 28a + 30b + 44c = 1,32 \\ a = c \quad \left(\text{vì } \overline{M}_z = \frac{M_{N_2} + M_{N_2O}}{2} \right) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = 0,01 \\ b = 0,02 \\ c = 0,01 \end{cases}$ Ta có hệ phương trình </p>	<p>0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,5đ</p>

Các quá trình oxi hoá và quá trình khử				
$\text{Mg} \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 2\text{e}$		$12\text{H}^+ + 2\text{NO}_3^- + 10\text{e} \rightarrow \text{N}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$		
x	2x	0,12	0,1	
0,01 mol				
$\text{Al} \rightarrow \text{Al}^{3+} + 3\text{e}$		$10\text{H}^+ + 2\text{NO}_3^- + 8\text{e} \rightarrow \text{N}_2\text{O} + 5\text{H}_2\text{O}$		
y	3y	0,1	0,08	0,5đ
0,01 mol				
		$4\text{H}^+ + \text{NO}_3^- + 3\text{e} \rightarrow \text{NO} + 2\text{H}_2\text{O}$		
		0,08	0,06	
0,02 mol				0,25 đ
Ta có $\begin{cases} 2x + 3y = 0,24 \\ 58x + 78y = 6,42 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 0,03 \\ y = 0,06 \end{cases}$				0,25 đ
$\rightarrow x = m_{\text{hh}} = m_{\text{Mg}} + m_{\text{Al}} = 2,34 \text{ (g)}$				
Mol $\text{HNO}_3 = \text{mol H}^+ = 0,12 + 0,1 + 0,08 = 0,3 \text{ (mol)}$				
$y = \frac{m_{\text{ddHNO}_3, \text{can}}}{100.24} = \frac{0,3.115.63.100}{100.24} = 90,5625 \text{ (g)}$				0,25 đ

Câu 4: (5 điểm)

- 4.1.** Oxi hóa 0,08 mol một ancol đơn chức, thu được hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic, một andehyt, ancol dư và nước. Ngưng tụ toàn bộ X rồi chia làm hai phần bằng nhau. Phần một cho tác dụng hết với Na dư thu được 0,504 lít khí H_2 (đktc). Phần hai cho phản ứng tráng Ag hoàn toàn thu được 9,72 gam Ag. Phần trăm khối lượng ancol bị oxi hóa là.
- 4.2.** A là axit hữu cơ mạch không phân nhánh, B là ancol đơn chức bậc 1 có nhánh. Khi trung hòa hoàn toàn A cần số mol NaOH gấp 2 lần số mol A. Khi đốt cháy B được CO_2 và H_2O với tỉ lệ số mol 4:5. Khi cho 0,1 mol A tác dụng với 0,25 mol B với hiệu suất 73,5% thu được 14,847 gam chất hữu cơ E.
- Viết công thức cấu tạo của A, B, E.
 - Tính khối lượng axit A và ancol B đã tham gia phản ứng


Câu	HƯỚNG DẪN CHẤM	Điểm
4.1	Đặt công thức của ancol đơn chức là RCH_2OH	0,2
2đ	Hỗn hợp X gồm RCHO a mol RCOOH b mol RCH_2OH dư c mol H_2O (a+b) mol	5đ
	Giả thuyết ta có $a + b + c = 0,08$ (1)	0,2
	Cho tác dụng với Na ta có: $b + c + a + b = 0,09$ (2)	5đ
	(1) và (2) $\Rightarrow$ b=0,01 (mol)	0,2
	Cho phản ứng tráng bạc: $2a = 0,18 \Rightarrow a = 0,09$ (vô lý)	5đ
	Vậy $\text{R}=1$ X gồm HCHO a; HCOOH b;	0,2

	<p>Khi tráng Ag sẽ cho $4a + 2b = 0,18 \Rightarrow a = 0,04 \text{ (mol)}$ $\frac{0,01+0,04}{0,08} \cdot 100 = 62,5\%$</p> <p>% ancol bị oxy hóa là:</p>	<p>5đ 0,2 5đ 0,2 5đ 0,2 5đ 0,2 5đ</p>
<p>4.2 3đ</p>	<p>1) Ancol đơn chức B đốt cháy có $\frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{4}{5} \Rightarrow n < n$, vậy B là ancol đơn chức no mạch hở: $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}\text{O}$</p> $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}\text{O} + \frac{3n}{2} \text{O}_2 \longrightarrow n \text{CO}_2 + (n+1) \text{H}_2\text{O}$ <p>Ta có tỉ lệ $\frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{n}{n+1} = \frac{4}{5} \Rightarrow n = 4$: $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$ hay $\text{C}_4\text{H}_9\text{-OH}$ B có cấu tạo mạch cacbon phân nhánh: $\text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{OH}$ Đặt công thức phân tử A: $\text{R}(\text{COOH})_m$</p> <p>Theo gt: $\frac{n_{\text{NaOH}}}{n_{\text{A}}} = 2 \Rightarrow m = 2$, công thức phân tử A có dạng: $\text{R}(\text{COOH})_2$ Xét 2 trường hợp este hóa giữa A và B: TH1: A bị este hóa cả 2 chức: $\text{R}(\text{COOH})_2 + 2\text{C}_4\text{H}_9\text{-OH} \rightarrow \text{R}(\text{COO-C}_4\text{H}_9)_2 + 2\text{H}_2\text{O}$</p> <p>Khối lượng mol phân tử este: $M = \frac{14,847}{0,1 \times 0,735} = 202$ Từ công thức este: $M = R + 202 = 202 \Rightarrow R = 0$ Công thức của A: $(\text{COOH})_2$ hay HOOC-COOH Công thức cấu tạo của este E:</p> $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{COO-CH}_2\text{-CH-CH}_3 \\ \\ \text{COO-CH}_2\text{-CH-CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$ <p>TH2: A bị este hóa một chức: $\text{R}(\text{COOH})_2 + \text{C}_4\text{H}_9\text{-OH} \rightarrow \text{R}(\text{COOH})(\text{COO-C}_4\text{H}_9) + \text{H}_2\text{O}$ $M = R + 146 = 202 \Rightarrow R = 56 \text{ (-C}_4\text{H}_8\text{-)}$ Công thức phân tử của A: $\text{C}_4\text{H}_8(\text{COOH})_2$: $\text{HOOC-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-COOH}$: Công thức cấu tạo của este E:</p>	<p>0,2 5đ 0,2 5đ 0,2 5đ 0,2 5đ 0,2 5đ</p>

	$ \begin{array}{c} \text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COO}-\text{CH}_2-\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COOH}}{\text{CH}}}-\text{CH}_3 \end{array} $	0,2 5đ
	<p>2) Khối lượng A, B đã phản ứng:</p> <p>a) A tạo este 2 chức:</p> $m_A = \frac{14,847 \times 90}{202} = 6,615 \text{ gam}$ $m_B = \frac{14,847 \times 74 \times 2}{202} = 10,878 \text{ gam}$ <p>b) A tạo este 1 chức:</p> $m_{A'} = \frac{14,847 \times 146}{202} = 10,731 \text{ gam}$ $m_{B'} = \frac{14,847 \times 74}{202} = 5,439 \text{ gam}$	0,2 5đ
		0,2 5đ
		0,2 5đ
		0,2 5đ

Câu 1: (5 điểm)

1.1 Hoàn thành các phản ứng sau :



Biết A là hợp chất của Na.



1.2. Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết 5 dung dịch muối sau chỉ dùng một thuốc thử: dd NaCl; dd AlCl₃; dd FeCl₃; dd CuCl₂; dd ZnCl₂.

1.3. Từ quặng photphorit và các điều kiện có đủ, viết phương trình phản ứng điều chế: P, suppephotphat đơn và suppe photphat kép. Tính độ dinh dưỡng của suppe photphat kép.

Câu 2: (5 điểm)

2.1. Công thức phân tử chung của 3 chất hữu cơ (X), (Y), (T) đều có dạng (CH)_n.

Biết rằng :



Xác định công thức cấu tạo của 3 chất (X),(Y),(T) và viết các phương trình phản ứng .

2.2. Có phản ứng sau : $X + H_2 \text{ (dư)} \rightarrow 3\text{-metylbutan-1-ol}$. Xác định các công thức có thể có của X và viết các phản ứng xảy ra.

2.3. X là chất hữu cơ, đốt cháy X chỉ thu được CO₂ và H₂O biết M_X < 60. Mặt khác khi cho X tác dụng với AgNO₃/NH₃ (dư) thì tỷ lệ mol phản ứng là n_X: n_{AgNO₃} = 1:2. Viết các công thức cấu tạo có thể có của X.

Câu 3: (5 điểm)

3.1. Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam sunfua của kim loại M (công thức MS) trong oxi dư. Chất rắn sau phản ứng đem hòa tan trong một lượng vừa đủ dung dịch HNO₃ 37,8% thấy nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch thu được là 41,72%. Khi làm lạnh dung dịch này thì thoát ra 8,08 gam muối rắn. Lọc tách muối rắn thấy nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch là 34,7%. Xác định công thức của muối rắn

3.2. Hòa tan x gam hỗn hợp bột gồm 2 kim loại Mg và Al vào y gam dung dịch HNO₃ 24%. Sau phản ứng thu được dung dịch A và 0,896 lít hỗn hợp X gồm 3 khí không màu có khối lượng 1,32 gam. Thêm một lượng O₂ vừa đủ vào X, phản ứng xong thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn Y từ từ qua dung dịch NaOH dư thấy còn lại khí Z (có tỉ khối hơi của Z so với H₂ bằng 18). Nếu cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch A đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất thấy cân nặng 6,42 gam (không có khí thoát ra). Tính x và y biết rằng HNO₃ đã lấy dư 15% so với lượng cần thiết, các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn và các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.

Câu 4: (5 điểm)

4.1. Oxi hóa 0,08 mol một ancol đơn chức, thu được hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic, một andehyt, ancol dư và nước. Ngưng tụ toàn bộ X rồi chia làm hai phần bằng nhau. Phần một cho tác dụng hết với Na dư thu được 0,504 lít khí H_2 (đktc). Phần hai cho phản ứng tráng Ag hoàn toàn thu được 9,72 gam Ag. Phần trăm khối lượng ancol bị oxi hóa là

4.2. A là axit hữu cơ mạch không phân nhánh, B là ancol đơn chức bậc 1 có nhánh. Khi trung hòa hoàn toàn A cần số mol NaOH gấp 2 lần số mol A. Khi đốt cháy B được CO_2 và H_2O với tỉ lệ số mol 4:5. Khi cho 0,1 mol A tác dụng với 0,25 mol B với hiệu suất 73,5% thu được 14,847 gam chất hữu cơ E.


1) Viết công thức cấu tạo của A, B, E.

2) Tính khối lượng axit A và ancol B đã tham gia phản ứng

HẾT

Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố: $H = 1$; $C = 12$; $N = 14$; $O = 16$; $Mg = 23$;

$Al = 27$; $S = 32$; $Cl = 35,5$; $K = 39$; $Ca = 40$; $Fe = 56$; $Cu = 64$; $Ag = 108$; $Ba = 137$.


ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM**Câu 1: (4 điểm)****1.1** Hoàn thành các phản ứng sau :

Biết A là hợp chất của Na.

1.2. Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết 5 dung dịch muối sau chỉ dùng một thuốc thử: dd NaCl; dd AlCl₃; dd FeCl₃; dd CuCl₂; dd ZnCl₂.**1.3.** Từ quặng photphoric và các điều kiện có đủ, viết phương trình phản ứng điều chế: P, suppephotphat đơn và suppe photphat kép. Tính độ dinh dưỡng của suppe photphat kép.

Câu 1	HƯỚNG DẪN CHẤM	Điểm
1.1 1.5 đ	<p>a. $NaHCO_3 + NaOH \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O$ A B D</p> <p>b. $NaHCO_3 + HCl \rightarrow NaCl + CO_2 + H_2O$ E F</p> <p>c. $NaHCO_3 + Ba(OH)_2 \rightarrow BaCO_3 + NaOH + H_2O$ G H</p> <p>d. $2NaHCO_3 + 2KOH \rightarrow Na_2CO_3 + K_2CO_3 + 2H_2O$ I J</p> <p>e. $2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O$</p> <p>f. $2NaHCO_3 + 2KHSO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + K_2SO_4 + 2CO_2 + 2H_2O$ K L M</p> <p>Học sinh không cần xác định A,B,D.....</p>	<p>0,2 5đ</p> <p>0,2 5đ</p> <p>0,2 5đ</p> <p>0,2 5đ</p> <p>0,2 5đ</p> <p>0,2 5đ</p> <p>0,2 5đ</p>
1.2 2đ	<p>NaCl AlCl₃ FeCl₃ CuCl₂ ZnCl₂</p> <p> Dd NH₃ - Kết tủa</p> <p>trắng Kết tủa nâu đỏ Kết tủa xanh Kết tủa</p> <p>trắng</p> <p>Dd NH₃ dư 1 Không tan 2 3 Tan</p> <p>(4)</p> <p>Các phương trình :</p> <p>$AlCl_3 + 3NH_3 + 3H_2O \rightarrow Al(OH)_3 + 3NH_4Cl$</p> <p>$FeCl_3 + 3NH_3 + 3H_2O \rightarrow Fe(OH)_3 + 3NH_4Cl$</p> <p>$CuCl_2 + 2NH_3 + 2H_2O \rightarrow Cu(OH)_2 + 2NH_4Cl$</p> <p>$ZnCl_2 + 2NH_3 + 2H_2O \rightarrow Zn(OH)_2 + 2NH_4Cl$</p> <p>$Zn(OH)_2 + 4NH_3 \rightarrow Zn(NH_3)_4(OH)_2$</p>	<p>1,0 đ</p> <p>0,2 5đ</p> <p>0,2 5đ</p>

2.1. Công thức phân tử chung của 3 chất hữu cơ (X), (Y), (T) đều có dạng $(\text{CH})_n$.

$$(X) \longrightarrow (Y) \longrightarrow (Y_1) \longrightarrow \text{cao su buna}$$


Xác định công thức cấu tạo của 3 chất (X), (Y), (T) và viết các phương trình phản ứng

2.2. Có phản ứng sau : $X + H_2 \text{ (dư)} \rightarrow 3\text{-metylbutan-1-ol}$. Xác định các công thức có thể có của X và viết các phản ứng xảy ra.

2.3. X là chất hữu cơ, đốt cháy X chỉ thu được CO_2 và H_2O biết $M_X < 60$. Mặt khác khi cho X tác dụng với $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$ (dư) thì tỷ lệ mol phản ứng là $n_X : n_{\text{AgNO}_3} = 1:2$. Viết các công thức cấu tạo có thể có của X.

Câu 2	HƯỚNG DẪN CHẤM	Điểm
2.1 2đ	<p>X: $\text{HC}\equiv\text{CH}$; Y: $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\text{C}\equiv\text{CH}$; T: C_6H_6</p> <p>$2\text{CH}\equiv\text{CH} \xrightarrow{\text{xt}, \text{t}^\circ} \text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}\equiv\text{CH}$</p> <p>$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}\equiv\text{CH} + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{Pd/PbCO}_3, \text{t}^\circ} \text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$</p> <p>$n\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2 \xrightarrow{\text{xt}, \text{t}^\circ, \text{p}} \text{—CH}_2-\text{CH}=\text{CH—CH}_2\text{—}_n$</p> <p>$3\text{HC}\equiv\text{CH} \xrightarrow{\text{xt}, \text{t}^\circ} \text{C}_6\text{H}_6$</p> <p>$\text{C}_6\text{H}_6 + \text{Br}_2 \xrightarrow{\text{Fe}, \text{t}^\circ} \text{C}_6\text{H}_5\text{Br} + \text{HBr}$</p>	<p>0,25 đ</p> <p>0,25 đ</p> <p>0,25 đ</p>

	$\text{C}_6\text{H}_5\text{Br} + 2\text{NaOH} \xrightarrow{300^\circ\text{C}; 200\text{atm}} \text{C}_6\text{H}_5\text{ONa} + \text{NaBr} + \text{H}_2\text{O}$ $\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa} + \text{HCl} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{OH} + \text{NaCl}$ $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH} + 3\text{HNO}_3 \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4, t^\circ} \text{C}_6\text{H}_2\text{OH}(\text{NO}_2)_3 + 3\text{H}_2\text{O}$	<p>0,25 đ</p> <p>0,25 đ</p> <p>0,25 đ</p> <p>0,25 đ</p> <p>0,25 đ</p>
<p>2.2</p> <p>1.2</p> <p>5</p>	<p>TH₁: X là ancol</p> $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH} + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{Ni}, t^\circ} \text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ $\text{CH}_3\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CHCH}_2\text{OH} + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{Ni}, t^\circ} \text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ <p>TH₁: X là andehyt</p> $\text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CHO} + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{Ni}, t^\circ} \text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2\text{CHO} + 2\text{H}_2 \xrightarrow{\text{Ni}, t^\circ} \text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ $\text{CH}_3\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CHCHO} + 2\text{H}_2 \xrightarrow{\text{Ni}, t^\circ} \text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	<p>0,25 đ</p> <p>0,25 đ</p> <p>0,25 đ</p> <p>0,25 đ</p> <p>0,25 đ</p> <p>0,25 đ</p>
<p>2.3.</p> <p>1.7</p> <p>5đ</p>	<p>Đốt cháy X chỉ thu được CO₂ và H₂O ⇒ X chứa C, H hoặc C, H, O</p> <p>Mặt khác X tác dụng với AgNO₃/NH₃, tỷ lệ mol là 1:2 ⇒ X có 1 nhóm -CHO hoặc có 2 liên kết ba đầu mạch. Do M_x < 60. X có thể là: HC≡CH; HC≡C-C≡CH; CH₃CHO; CH₃CH₂CHO; CH₂=CHCHO; HCOOH.</p>	<p>0,25 đ</p> <p>0,25 đ</p> <p>1.25 đ</p>

Câu 3: (5 điểm)

3.1. Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam sunfua của kim loại M (công thức MS) trong oxi dư. Chất rắn sau phản ứng đem hòa tan trong một lượng vừa đủ dung dịch HNO₃ 37,8% thấy nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch thu được là 41,72%. Khi làm lạnh dung dịch này thì thoát ra 8,08 gam muối rắn. Lọc tách muối rắn thấy nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch là 34,7%. Xác định công thức của muối rắn

3.2. Hòa tan x gam hỗn hợp bột gồm 2 kim loại Mg và Al vào y gam dung dịch HNO₃ 24%. Sau phản ứng thu được dung dịch A và 0,896 lít hỗn hợp X gồm

3 khí không màu có khối lượng 1,32 gam. Thêm một lượng O_2 vừa đủ vào X, phản ứng xong thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn Y từ từ qua dung dịch NaOH dư thấy còn lại khí Z (có tỉ khối hơi của Z so với H_2 bằng 18). Nếu cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch A đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất thấy cân nặng 6,42 gam (không có khí thoát ra). Tính x và y biết rằng HNO_3 đã lấy dư 15% so với lượng cần thiết, các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn và các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.

Câu	HƯỚNG DẪN CHẤM	Điểm
3.1 2.5 đ	$MS \text{ a mol} \Rightarrow Ma + 32a = 4,4 \quad (I)$ $2MS + (0,5n+2) O_2 \rightarrow M_2O_n + 2SO_2 \quad (1)$ $\begin{matrix} a & & a/2 & & (mol) \end{matrix}$ $M_2O_n + 2nHNO_3 \rightarrow 2M(NO_3)_n + nH_2O \quad (2)$ $\begin{matrix} a/2 & & na & & a & & (mol) \end{matrix}$ $m_{dd HNO_3} = \frac{500na}{3}; C\% (\text{muôi}) = \frac{Ma+62na}{Ma+8na+\frac{500na}{3}} \cdot 100 = 41,72 \quad (II)$ <p>Từ (II) $\Rightarrow M = \frac{56}{3}n$. Vậy M là Fe; a=0,05.</p> <p>Từ các dữ kiện trên ta có khối lượng dung dịch thu được trước khi làm lạnh là: $m = Ma + 8na + 166,67na = 29 \text{ (gam)}$</p> <p>Sau khi làm lạnh, khối lượng dung dịch là: $29 - 8,08 = 20,92 \text{ (gam)}$</p> <p>Số mol của $Fe(NO_3)_3$ trong dung dịch sau khi làm lạnh là</p> $\frac{20,92 \cdot 34,7}{100 \cdot 242} = 0,03 \Rightarrow \text{mol } Fe(NO_3)_3 \text{ trong muối rắn} = 0,02.$ $242 + 18m = 404 \Rightarrow m = 9 \text{ Vậy CT của muối } Fe(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$	0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,5đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ
3.2 2.5 đ	$\overline{M}_X = \frac{1,32}{0,04} = 33$ <p>mà X tác dụng được với $O_2 \rightarrow$ trong X phải chứa NO.</p> <p>Mặt khác $\overline{M}_Z = 18 \cdot 2 = 36 \rightarrow$ trong Z có 2 khí là N_2 và N_2O.</p> <p>Vậy trong X có 3 khí là N_2 (a mol), NO (b mol), N_2O (c mol).</p> $\begin{cases} a + b + c = 0,04 \\ 28a + 30b + 44c = 1,32 \\ a = c \quad \left(\text{vì } \overline{M}_Z = \frac{M_{N_2} + M_{N_2O}}{2} \right) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = 0,01 \\ b = 0,02 \\ c = 0,01 \end{cases}$ <p>Ta có hệ phương trình</p> <p>Các quá trình oxi hoá và quá trình khử</p> $Mg \rightarrow Mg^{2+} + 2e \quad \quad \quad 12H^+ + 2NO_3^- + 10e \rightarrow N_2 +$	0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,5đ

6H ₂ O	x	2x	0,12	0,1	
0,01 mol					
Al → Al ³⁺ + 3e			10H ⁺ + 2NO ₃ ⁻ + 8e → N ₂ O +		
5H ₂ O	y	3y	0,1	0,08	
0,01 mol			4H ⁺ + NO ₃ ⁻ + 3e → NO +		0,5đ
2H ₂ O			0,08	0,06	
0,02 mol					
Ta có	$\begin{cases} 2x + 3y = 0,24 \\ 58x + 78y = 6,42 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 0,03 \\ y = 0,06 \end{cases}$				0,25 đ
→ x = m _{hh} = m _{Mg} + m _{Al} = 2,34 (g)					0,25 đ
Mol HNO ₃ = mol H ⁺ = 0,12 + 0,1 + 0,08 = 0,3 (mol)					
y =	$m_{\text{ddHNO}_3\text{can}} = \frac{0,3 \cdot 115 \cdot 63 \cdot 100}{100 \cdot 24} = 90,5625 \text{ (g)}$				0,25 đ

Câu 4: (5 điểm)

4.1. Oxi hóa 0,08 mol một ancol đơn chức, thu được hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic, một andehyt, ancol dư và nước. Ngưng tụ toàn bộ X rồi chia làm hai phần bằng nhau. Phần một cho tác dụng hết với Na dư thu được 0,504 lít khí H₂ (đktc). Phần hai cho phản ứng tráng Ag hoàn toàn thu được 9,72 gam Ag. Phần trăm khối lượng ancol bị oxi hóa là.

4.2. A là axit hữu cơ mạch không phân nhánh, B là ancol đơn chức bậc 1 có nhánh. Khi trung hòa hoàn toàn A cần số mol NaOH gấp 2 lần số mol A. Khi đốt cháy B được CO₂ và H₂O với tỉ lệ số mol 4:5. Khi cho 0,1 mol A tác dụng với 0,25 mol B với hiệu suất 73,5% thu được 14,847 gam chất hữu cơ E.

1) Viết công thức cấu tạo của A, B, E.

2) Tính khối lượng axit A và ancol B đã tham gia phản ứng

Câu	HƯỚNG DẪN CHẤM	Điểm
4.1	Đặt công thức của ancol đơn chức là RCH ₂ OH	0,2
2đ	Hỗn hợp X gồm RCHO a mol	5đ
	RCOOH b mol	
	RCH ₂ OH dư c mol	
	H ₂ O (a+b) mol	
	Giả thuyết ta có a + b + c = 0,08 (1)	0,2
	Cho tác dụng với Na ta có : b + c + a + b = 0,09 (2)	5đ
	(1) và (2) ⇒ b=0,01 (mol)	0,2
	Cho phản ứng tráng bạc: 2a = 0,18 ⇒ a = 0,09 (vô lý)	5đ
	Vậy R=1 X gồm HCHO a; HCOOH b;	0,2
	Khi tráng Ag sẽ cho 4a + 2b = 0,18 ⇒ a=0,04 (mol)	5đ

	$\% \text{ ancol bị oxy hóa là: } \frac{0,01+0,04}{0,08} \cdot 100 = 62,5\%$	<p>0,2 5đ</p> <p>0,2 5đ</p> <p>0,2 5đ</p>
<p>4.2</p> <p>3đ</p>	<p>1) Ancol đơn chức B đốt cháy có $\frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{4}{5} \Rightarrow n < n$, vậy B là ancol đơn chức no mạch hở: $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}\text{O}$</p> $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}\text{O} + \frac{3n}{2} \text{O}_2 \longrightarrow n \text{CO}_2 + (n+1) \text{H}_2\text{O}$ <p>Ta có tỉ lệ $\frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{n}{n+1} = \frac{4}{5} \Rightarrow n = 4$: $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$ hay $\text{C}_4\text{H}_9\text{-OH}$ B có cấu tạo mạch cacbon phân nhánh: $\text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{OH}$ Đặt công thức phân tử A: $\text{R}(\text{COOH})_m$</p> <p>Theo gt: $\frac{n_{\text{NaOH}}}{n_A} = 2 \Rightarrow m = 2$, công thức phân tử A có dạng: $\text{R}(\text{COOH})_2$ Xét 2 trường hợp este hóa giữa A và B: TH1: A bị este hóa cả 2 chức: $\text{R}(\text{COOH})_2 + 2\text{C}_4\text{H}_9\text{-OH} \rightarrow \text{R}(\text{COO-C}_4\text{H}_9)_2 + 2\text{H}_2\text{O}$</p> <p>Khối lượng mol phân tử este: $M = \frac{14,847}{0,1 \times 0,735} = 202$ Từ công thức este: $M = R + 202 = 202 \Rightarrow R = 0$ Công thức của A: $(\text{COOH})_2$ hay HOOC-COOH Công thức cấu tạo của este E:</p> $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{COO-CH}_2\text{-CH-CH}_3 \\ \\ \text{COO-CH}_2\text{-CH-CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$ <p>TH2: A bị este hóa một chức: $\text{R}(\text{COOH})_2 + \text{C}_4\text{H}_9\text{-OH} \rightarrow \text{R}(\text{COOH})(\text{COO-C}_4\text{H}_9) + \text{H}_2\text{O}$ $M = R + 146 = 202 \Rightarrow R = 56 (-\text{C}_4\text{H}_8-)$ Công thức phân tử của A: $\text{C}_4\text{H}_8(\text{COOH})_2$: $\text{HOOC-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-COOH}$: Công thức cấu tạo của este E:</p> $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-COO-CH}_2\text{-CH-CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-COOH} \end{array}$	<p>0,2 5đ</p> <p>0,2 5đ</p> <p>0,2 5đ</p>

	<p>2) Khối lượng A, B đã phản ứng :</p> <p>a) A tạo este 2 chức:</p> $m_A = \frac{14,847 \times 90}{202} = 6,615 \text{ gam}$ $m_B = \frac{14,847 \times 74 \times 2}{202} = 10,878 \text{ gam}$ <p>b) A tạo este 1 chức :</p> $m_{A'} = \frac{14,847 \times 146}{202} = 10,731 \text{ gam}$ $m_{B'} = \frac{14,847 \times 74}{202} = 5,439 \text{ gam}$	<p>0,2 5đ</p>
		0,2 5đ
		0,2 5đ
		0,2 5đ

(ĐỀ THAM KHẢO)

Câu 1: (4,0 điểm)

- Cho dung dịch CH_3COOH 0,1M ($K_a = 1,75 \cdot 10^{-5}$)
 - Tính pH, độ điện li α và nồng độ các ion trong dung dịch?
 - Tính pH của dung dịch hỗn hợp CH_3COOH 0,1M và CH_3COONa 0,1M?
- Cho các dung dịch riêng biệt mất nhãn sau: Na_2SO_4 , AlCl_3 , FeSO_4 , NaHSO_4 , FeCl_3 . Chỉ dùng dung dịch K_2S để nhận biết các dung dịch trên ngay ở lần thử đầu tiên? Viết các phương trình hoá học minh hoạ?
- Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
 - $\text{Ca} + \text{dd Na}_2\text{CO}_3$
 - $\text{Na} + \text{dd AlCl}_3$
 - $\text{dd Ba(HCO}_3)_2 + \text{dd NaHSO}_4$
 - $\text{dd NaAlO}_2 + \text{dd NH}_4\text{Cl}$

Câu 2: (4,0 điểm)

- Phèn là muối sunfat kép của một cation hóa trị một (như K^+ hay NH_4^+) và một cation hóa trị ba (như Al^{3+} , Fe^{3+} hay Cr^{3+}). Phèn sắt-amoni có công thức $(\text{NH}_4)_a\text{Fe}(\text{SO}_4)_b \cdot n\text{H}_2\text{O}$. Hòa tan 1,00 gam mẫu phèn sắt-amoni vào 100 cm^3 H_2O , rồi chia dung dịch thu được thành hai phần bằng nhau. Thêm dung dịch NaOH dư vào phần một và đun sôi dung dịch. Lượng NH_3 thoát ra phản ứng vừa đủ với 10,37 cm^3 dung dịch HCl 0,100 M. Dùng kẽm kim loại khử hết Fe^{3+} ở phần hai thành Fe^{2+} . Để oxi hóa ion Fe^{2+} thành ion Fe^{3+} trở lại, cần 20,74 cm^3 dung dịch KMnO_4 0,0100 M trong môi trường axit.
 - Viết các phương trình phản ứng dạng ion thu gọn và xác định các giá trị a, b, n?
 - Tại sao các phèn khi tan trong nước đều tạo môi trường axit?
- Viết phương trình phản ứng xảy ra khi lần lượt cho các đơn chất As và Bi tác dụng với dung dịch HNO_3 (giả thiết sản phẩm khử chỉ là khí NO)?
- So sánh (có giải thích) tính tan trong nước, tính bazơ và tính khử của hai hợp chất với hiđro là amoniac (NH_3) và photphin (PH_3)?

Câu 3: (4,0 điểm)

- Một hiđrocacbon X có chứa 88,235% cacbon về khối lượng. Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của X, biết X là hiđrocacbon no có ba vòng, mỗi vòng đều có 6 nguyên tử cacbon?
- Cho hiđrocacbon Y tác dụng với dung dịch brom dư được dẫn xuất tetrabrom chứa 75,8% brom (theo khối lượng). Khi cộng brom (1:1) thu được cặp đồng phân cis-trans.
 - Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và gọi tên của Y?
 - Viết phương trình phản ứng của Y với:
 - Dung dịch KMnO_4 (trong môi trường H_2SO_4)
 - Dung dịch $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$
 - H_2O (xúc tác $\text{Hg}^{2+}/\text{H}^+$, 80°C)
 - HBr theo tỉ lệ 1:2

Câu 4: (4,0 điểm)

1. Chia 7,1 gam hỗn hợp A gồm hai anđehit đơn chức thành hai phần bằng nhau:

- Phần 1: đốt cháy hoàn toàn thu được 7,7 gam CO_2 và 2,25 gam H_2O .
- Phần 2: cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO_3 trong NH_3 thu được

21,6 gam bạc.

- a) Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên hai anđehit trên?
- b) Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt mỗi anđehit trên?

2. Cho 5 kg glucozơ (chứa 20% tạp chất) lên men. Hãy tính thể tích của ancol etylic 40° thu được, biết rằng khối lượng ancol bị hao hụt 10% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml?

Câu 5: (4,0 điểm)

1. Thổi 672 ml (đktc) hỗn hợp khí X gồm một ankan, một anken và một ankin (đều có số nguyên tử cacbon trong phân tử bằng nhau) qua dung dịch $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$ dư, thì thấy có 3,4 AgNO_3 đã tham gia phản ứng. Cũng lượng hỗn hợp khí X trên làm mất màu tối đa 200 ml dung dịch Br_2 0,15 M.

- a) Xác định thành phần định tính và định lượng các chất trong X?
- b) Đề nghị phương pháp tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp X?

2. Oxi hóa m gam hợp chất hữu cơ A bằng CuO rồi cho sản phẩm sinh ra gồm CO_2 và hơi H_2O lần lượt đi qua bình 1 đựng $\text{Mg}(\text{ClO}_4)_2$ và bình 2 đựng 2 lít $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 0,0225 M thì thu được 2 gam kết tủa. Khối lượng bình 1 tăng 1,08 gam và khối lượng CuO giảm 3,2 gam, $M_A < 100$. Oxi hóa mảnh liệt A, thu được hai hợp chất hữu cơ là CH_3COOH và CH_3COCOOH .

- a) Xác định công thức cấu tạo và gọi tên A?
- b) Viết các dạng đồng phân hình học tương ứng của A?
- c) Khi cho A tác dụng với Br_2 theo tỉ lệ mol 1:1, thì tạo được những sản phẩm nào? Giải thích?

---Hết---


ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM OLYMPIC HÓA 11

CÂU	NỘI DUNG	ĐIỂM
Câu 1: (4,0 điểm)	1a. $\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$ Bắt đầu 0,1 Điện li x x x Còn dư: 0,1 - x $K_{\text{CH}_3\text{COOH}} = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{x^2}{0,1-x} = 1,75 \cdot 10^{-5}$ vì x rất bé so với 0,1 $\rightarrow x = \sqrt{1,75 \cdot 10^{-6}} = 1,32 \cdot 10^{-3}$ $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = [\text{H}^+] = x = 1,32 \cdot 10^{-3} \text{ M}$; pH = 2,879 $\alpha = \frac{x}{0,1} \cdot 100 = \frac{0,132}{0,1} = 1,32\%$	0,5
	1b. $\text{CH}_3\text{COONa} \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{Na}^+$ 0,1 0,1 0,1	0,25
	$\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$ Bắt đầu 0,1 0,1 Điện li x x x Cân bằng : 0,1 - x 0,1+x x	0,5
	$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{(0,1+x) \cdot x}{0,1-x} = 1,75 \cdot 10^{-5}$ Suy ra $x = 1,75 \cdot 10^{-5} \Rightarrow \text{pH} = 4,757$.	0,25
	2. Khi cho dung dịch K_2S lần lượt vào mẫu thử của các dung dịch trên thì:	
	- Mẫu thử không có hiện tượng, chứa dung dịch Na_2SO_4	0.25
	- Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng keo và có hiện tượng sủi bọt khí, chứa AlCl_3 : $2\text{AlCl}_3 + 3 \text{K}_2\text{S} + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow 6\text{KCl} + 2\text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{H}_2\text{S}$	0.25
	- Mẫu thử có hiện tượng sủi bọt khí, chứa dung dịch NaHSO_4 $2 \text{NaHSO}_4 + \text{K}_2\text{S} \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{S} + \text{Na}_2\text{SO}_4$	0.25
	- Mẫu thử xuất hiện kết tủa đen, chứa FeSO_4 : $\text{K}_2\text{S} + \text{FeSO}_4 \rightarrow \text{FeS} + \text{K}_2\text{SO}_4$	0.25
	- Mẫu thử xuất hiện kết tủa đen và vàng, chứa FeCl_3 $2\text{FeCl}_3 + 3\text{K}_2\text{S} \rightarrow 6\text{KCl} + \text{S} + 2\text{FeS}$	
	3. Hoàn thành phương trình phản ứng: a) $\text{Ca} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{H}_2$ $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{CaCO}_3 + 2 \text{NaOH}$ b) $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2$ $3\text{NaOH} + \text{AlCl}_3 \rightarrow \text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{NaCl}$	

	<p>Nếu NaOH còn: $\text{NaOH} + \text{Al(OH)}_3 \rightarrow \text{NaAlO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ (hoặc $\text{Na[Al(OH)}_4\text{]})$)</p> <p>c) $\text{Ba(HCO}_3\text{)}_2 + \text{NaHSO}_4 \rightarrow \text{BaSO}_4 + \text{NaHCO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ hoặc: $\text{Ba(HCO}_3\text{)}_2 + 2\text{NaHSO}_4 \rightarrow \text{BaSO}_4 + \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{CO}_2$</p> <p>d) $\text{NaAlO}_2 + \text{NH}_4\text{Cl} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaCl} + \text{Al(OH)}_3 + \text{NH}_3$ (hoặc $\text{Na[Al(OH)}_4\text{]} + \text{NH}_4\text{Cl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{Al(OH)}_3 + \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$)</p>	<p>0.25x 4 =1.0</p>
<p>Câu 2: (4,0 điểm)</p>	<p>1. (a) Đặt số mol của phèn sắt - amoni $(\text{NH}_4)_a\text{Fe(SO}_4)_b \cdot n\text{H}_2\text{O}$ trong mỗi phần là x mol. Phương trình phản ứng phần một :</p> $\begin{array}{ccc} ax & & \\ 0 & ax & \\ \text{Fe}^{3+} + 3\text{OH}^- & \rightarrow & \text{Fe(OH)}_3 \\ \text{NH}_3 + \text{H}^+ & \rightarrow & \text{NH}_4^+ \\ ax & ax & \end{array}$ <p>Phương trình phản ứng phần hai :</p> $\begin{array}{ccccccc} & x & & & & & \\ & 0 & & x & & & \\ 5\text{Fe}^{2+} + \text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ & \rightarrow & 5\text{Fe}^{3+} + \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O} \\ x & & x/5 & & & & \end{array}$ <p>Ta có : $ax = 0,01037 \text{ L} \times 0,100 \text{ mol.L}^{-1} = 1,037 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$ $x = 5 \times 0,02074 \text{ L} \times 0,010 \text{ mol.L}^{-1} = 1,037 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$ $\Rightarrow a = 1$ Công thức của phèn được viết lại là $\text{NH}_4^+\text{Fe}^{3+}(\text{SO}_4^{2-})_b \cdot n\text{H}_2\text{O}$ $\Rightarrow b = 2$</p> <p>Từ $M = 18 + 56 + 96.2 + 18n = \frac{0,5 \text{ gam}}{1,037 \cdot 10^{-3} \text{ mol}}$ $\Rightarrow n = 12$ Công thức của phèn sắt - amoni là $\text{NH}_4\text{Fe(SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$</p> <p>(b) Phèn tan trong nước tạo môi trường axit vì các ion NH_4^+, Al^{3+}, Fe^{3+} và Cr^{3+} đều là những ion axit (các ion K^+, Na^+, Li^+ có tính trung tính, còn SO_4^{2-} có tính bazơ rất yếu).</p> $\begin{array}{l} \text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+ \\ \text{M}^{3+} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons [\text{M(OH)}]^{2+} + \text{H}^+ \end{array}$ <p>2. Phương trình phản ứng :</p> $3\text{As} + 5\text{HNO}_3 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 3\text{H}_3\text{AsO}_4 + 5\text{NO}$	<p>0.25x 5 =1.2 5</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>





	$\text{Bi} + 4\text{HNO}_3 \rightarrow \text{Bi}(\text{NO}_3)_3 + \text{NO} + 2\text{H}_2\text{O}$	0.25
	<p>3. <u>Tính tan</u> :</p> <p>NH_3 tan tốt hơn PH_3 trong nước, do phân tử phân cực hơn và có khả năng tạo liên kết hydro với nước.</p> $\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \dots \text{H}-\text{N} \dots \text{H}-\text{O} \dots \text{H}-\text{N} \dots \\ \quad \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \end{array}$	0.25
	<p><u>Tính bazơ</u> :</p> <p>NH_3 có tính bazơ mạnh hơn PH_3, do liên kết N-H phân cực mạnh hơn liên kết P-H, làm cho nguyên tử N trong phân tử NH_3 giàu electron hơn, dễ dàng nhận proton hơn (một nguyên nhân nữa giải thích cho điều này là ion NH_4^+ bền hơn PH_4^+).</p>	0.25
	<p><u>Tính khử</u> :</p> <p>PH_3 có tính khử mạnh hơn nhiều so với NH_3, do nguyên tử P là một phi kim có độ âm điện nhỏ và phân tử PH_3 kém bền hơn NH_3.</p>	0.25


<p>Câu 3: (4,0 điểm)</p>	<p>1. Xác định công thức phân tử: Đặt C_xH_y là công thức phân tử của X</p> $x:y = \frac{88,235}{12} : \frac{11,765}{1} = 7,353:11,765 = 5:8$	0,5
	<p>X có dạng $\text{C}_{5n}\text{H}_{8n}$. X có độ bất bão hòa $\Delta = \frac{10n+2-8n}{2} = n+1$</p> <p>Do có 3 vòng nên $n+1=3$, suy ra $n=2$, công thức phân tử của X là $\text{C}_{10}\text{H}_{16}$</p>	1,0
	<p>X có 3 vòng 6C nên công thức cấu tạo của nó là:</p> 	0,5
	<p>hay</p> 	0.25
	<p>2</p> <p>2.1 Hidrocacbon Y: C_xH_y $\text{C}_x\text{H}_y + 2\text{Br}_2 \rightarrow \text{C}_x\text{H}_y\text{Br}_4$;</p> <p>theo giả thiết: $\% \text{Br} = \frac{80.4}{12x+y+320} \cdot 100 = 75,8 \rightarrow 12x + y = 102$</p> <p>Giá trị thỏa mãn: $x=8, y=6$. CTPT của Y: C_8H_6 ($\Delta=6$). Vì Y có khả năng phản ứng với brom theo tỉ lệ 1:1 và 1:2 chứng tỏ phân tử Y có 2 liên kết π kém bền và 1 nhân thơm.</p>	0.25 0.25 0.5

	<p>CTCT của Y:  Phenyl axetilen.</p> <p>2.2 Phương trình phản ứng:</p> $5 \text{ + 8\text{KMnO}_4 + 12\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 5 \text{ + 4\text{K}_2\text{SO}_4 + 5\text{CO}_2 + 12\text{H}_2\text{O} + 8\text{MnSO}_4$ $\text{ + \text{AgNO}_3 + \text{NH}_3 \rightarrow \text{ + \text{NH}_4\text{NO}_3$ $\text{ + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{Hg}^{2+}, \text{H}^+, 80^\circ\text{C}} \text{ $ $\text{ + 2\text{HBr} \rightarrow \text{ $	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>
<p>Câu 4: (4,0 điểm)</p>	<p>1a.</p> <p>* Khối lượng mỗi phần là : $\frac{7,1}{2} = 3,55 \text{ gam}$</p> <p>* Đốt cháy phần 1 :</p> $n_{\text{CO}_2} = \frac{7,7}{44} = 0,175 \text{ mol}; n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{2,25}{18} = 0,125 \text{ mol}$ <p>Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố:</p> $m_{\text{phần 1}} = m_{\text{C}} + m_{\text{H}} + m_{\text{O}} = 3,55 \text{ gam}$ $\Rightarrow m_{\text{O}} = 3,55 - 12 \cdot n_{\text{CO}_2} - 2 \cdot n_{\text{H}_2\text{O}} = 3,55 - 12 \cdot 0,175 - 2 \cdot 0,125 = 1,2 \text{ gam}$ $\Rightarrow n_{2\text{andehit trong mỗi phần}} = n_{\text{O}} = \frac{1,2}{16} = 0,075 \text{ mol}$ <p>* Phần 2 : $n_{\text{Ag}} = \frac{21,6}{108} = 0,2 \text{ mol} \Rightarrow \frac{n_{\text{Ag}}}{n_{2\text{andehit trong mỗi phần}}} = \frac{0,2}{0,075} = \frac{8}{3} > 2$</p> <p>$\Rightarrow$ phải có một andehit là HCHO andehit fomic (metanal)</p> <p>Đặt CT của andehit còn lại là : $\text{C}_n\text{H}_m\text{CHO}$</p> <p>Gọi trong mỗi phần gồm: x mol HCHO và y mol $\text{C}_n\text{H}_m\text{CHO}$</p> <p>Ta có :</p> $\begin{array}{ccc} \text{HCHO} & \xrightarrow{\text{AgNO}_3/\text{NH}_3} & 4\text{Ag} \\ x \text{ mol} & & 4x \text{ mol} \end{array} \quad ; \quad \begin{array}{ccc} \text{C}_n\text{H}_m\text{CHO} & \xrightarrow{\text{AgNO}_3/\text{NH}_3} & 2\text{Ag} \\ y \text{ mol} & & 2y \text{ mol} \end{array}$ $\Rightarrow \begin{cases} x + y = 0,075 \\ 4x + 2y = 0,2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,025 \\ y = 0,05 \end{cases}$ <p>Bảo toàn nguyên tố C và H ta có :</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0,25</p> <p>0,25</p> <p>0.5</p> <p>0.25</p>

$\begin{cases} n_C = n_{HCHO} + (n+1)n_{C_nH_nCHO} = 0,175 \\ n_H = 2n_{HCHO} + (m+1)n_{C_nH_nCHO} = 2,0,125 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0,025 + 0,05(n+1) = 0,175 \\ 0,025.2 + 0,05(m+1) = 0,25 \end{cases}$ $\Rightarrow \begin{cases} n = 2 \\ m = 3 \end{cases}$ <p>$\Rightarrow$ CTCT của andehit còn lại là : $CH_2=CH-CHO$ andehit acrylic (propenal)</p> <p>1b. Dùng Br_2 trong CCl_4 để phân biệt hai andehit : - $CH_2=CH-CHO$ làm mất màu Br_2 trong CCl_4 : $CH_2=CH-CHO + Br_2 \rightarrow CH_2Br-CHBr-CHO$ - $HCHO$ không làm mất màu Br_2 trong CCl_4.</p> <p>2. $m = 5000 \cdot 80\% = 4000 \text{ gam}$</p> $C_6H_{12}O_6 \xrightarrow[32^\circ C]{10n \text{ men}} 2C_2H_5OH + 2CO_2$ <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>180 gam</td> <td>92 gam</td> </tr> <tr> <td>4000 gam</td> <td>x gam</td> </tr> </table> $m_{C_2H_5OH} = \frac{4000.92}{180} \cdot 90\% = 1840(\text{gam}) \Rightarrow V_{C_2H_5OH \text{ nguyên chất}} = \frac{1840}{0,8} = 2300(\text{ml})$ $V_{\text{dd } C_2H_5OH 40\%} = \frac{2300.100}{40} = 5750(\text{ml}) \text{ hay } 5,75 \text{ lít}$	180 gam	92 gam	4000 gam	x gam	<p>0,25</p> <p>0,25</p> <p>0,25</p> <p>0.25 0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.5</p> <p>0.25</p>
180 gam	92 gam				
4000 gam	x gam				

<p>Câu 5: (4,0 điểm)</p>	<p>1. (a) Nếu ankin có dạng $RC \equiv CH$: $RC \equiv CH + AgNO_3 + NH_3 \rightarrow RC \equiv CAg + NH_4NO_3$ $n(\text{ankin}) = \frac{3,4 \text{ gam}}{170 \text{ gam/mol}} = 0,02 \text{ mol}$ $\Rightarrow$ và $n_{Br_2} > 2 \times n(\text{ankin}) = 0,04 \text{ mol}$ Điều này trái giả thiết, vì số mol Br_2 chỉ bằng $0,2L \times 0,15 \text{ mol/L} = 0,03 \text{ mol}$ Vậy ankin phải là C_2H_2 và như vậy ankan là C_2H_6, anken là C_2H_4. Từ phản ứng : $C_2H_2 + 2AgNO_3 + 2NH_3 \rightarrow C_2Ag_2 + 2NH_4NO_3$ $\Rightarrow n(C_2H_2) = 1/2n(AgNO_3) = 0,01 \text{ mol}$ Từ các phản ứng : $C_2H_2 + 2Br_2 \rightarrow C_2H_2Br_4$ $C_2H_4 + Br_2 \rightarrow C_2H_4Br_2$ $\Rightarrow n(C_2H_4) = 0,01 \text{ mol}$ $\Rightarrow n(C_2H_6) = \frac{0,672 \text{ L}}{22,4 \text{ L/mol}} - 0,01 \text{ mol} - 0,01 \text{ mol} = 0,01 \text{ mol}$ (b) Thổi hỗn hợp qua bình chứa dung dịch $AgNO_3/NH_3$ dư. Lọc tách kết tủa, hòa tan kết tủa trong dung dịch HCl dư thu được khí C_2H_2. $C_2H_2 + 2AgNO_3 + 2NH_3 \rightarrow C_2Ag_2 + 2NH_4NO_3$</p>	<p>0.5</p>
-------------------------------------	---	-------------------

	<p> $C_2Ag_2 + 2HCl \rightarrow C_2H_2 + 2AgCl$ Khí ra khỏi bình chứa dung dịch $AgNO_3/NH_3$, thổi tiếp qua dung dịch nước brom dư. Chiết lấy sản phẩm và đun nóng với bột Zn (trong CH_3COOH) thu được C_2H_4 : $C_2H_4 + Br_2 \rightarrow C_2H_4Br_2$ $C_2H_4Br_2 + Zn \rightarrow C_2H_4 + ZnBr_2$ Khí ra khỏi bình chứa dung dịch brom là khí C_2H_6 </p> <p> 2. (a) $n(H_2O) = 0,06 \text{ mol} \Rightarrow n(H) = 0,12 \text{ mol}$ Từ các phản ứng : $CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$ $2CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow Ca(HCO_3)_2$ với $n_{Ca(OH)_2} = 0,045 \text{ mol}$ và $n_{CaCO_3} = 0,02 \text{ mol} \Rightarrow n(CO_2)$ bằng 0,02 mol hoặc 0,07 mol. </p> <p> $n(O)$ tham gia phản ứng bằng $\frac{3,2 \text{ gam}}{16 \text{ gam/mol}} = 0,2 \text{ mol}$ Vậy số mol O trong A bằng : $n(O) = 0,02 \text{ mol} \cdot 2 + 0,06 \text{ mol} - 0,2 \text{ mol} < 0$ (loại) $n(O) = 0,07 \text{ mol} \cdot 2 + 0,06 \text{ mol} - 0,2 \text{ mol} = 0 \text{ mol}$ $\Rightarrow A$ là hidrocarbon có công thức đơn giản C_7H_{12} Vì $M_A < 100$, nên công thức phân tử của A chính là C_7H_{12} ($\Delta=2$) Cấu tạo của A phù hợp với giả thiết là: $CH_3-CH=C(CH_3)-CH=CH-CH_3$ (3-methylhexa-2,4-dien) </p> <p> (b) Các dạng đồng phân hình học : </p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p><i>cis-cis</i></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><i>cis-trans</i></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><i>trans-cis</i></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><i>trans-trans</i></p> </div> </div> <p> (c) Tác dụng với brom theo tỉ lệ mol 1:1 thì tạo được các sản phẩm : </p>	<p>1.0</p> <p>1.0</p> <p>0.5</p> <p>0.5</p> <p>0.5</p>
--	---	--



SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

**ĐỀ THI OLYMPIC 24/3 NĂM HỌC
2016-2017**

**MÔN: HÓA HỌC LỚP 11
(thời gian 150 phút)**

Câu 1: (4 điểm)

1.1. Một dung dịch A chứa đồng thời hai muối MgCl_2 0,004M và FeCl_3 0,001M. Cho KOH vào dung dịch A. Kết tủa nào tạo ra trước? Tìm pH thích hợp để tách 1 trong 2 ion Mg^{2+} hoặc Fe^{3+} ra khỏi dung dịch. Cho $T_{\text{Mg}(\text{OH})_2} = 10^{-11}$; $T_{\text{Fe}(\text{OH})_3} = 10^{-39}$. Biết rằng nếu nồng độ 10^{-6}M thì coi như đã hết.

1.2. Tính pH của dung dịch thu được khi trộn 25ml dung dịch CH_3COOH có pH = 3,00 với 15ml dung dịch KOH có pH = 11,00. Biết K_a của CH_3COOH là $10^{-4,76}$ (Khi tính lấy tới chữ số thứ 2 sau dấu phẩy ở kết quả cuối cùng).

Câu 2: (4 điểm)

2.1. Cho 66,2 gam hỗn hợp X gồm Fe_3O_4 , $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$, Al tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 3,1 mol KHSO_4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 466,6 gam muối sunfat trung hòa và 10,08 lít (đktc) khí Z gồm 2 khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối của Z so với He là . Tính phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp X?


2.2. Cho các dung dịch sau: NH_4NO_3 , $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, Na_2SO_4 , $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$, FeCl_3 , NaCl , $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$, FeCl_2 .

Nếu chỉ dùng một thuốc thử hãy nhận biết các dd trên. Trình bày cách nhận biết.

Câu 3: (4 điểm)

3.1. Từ đá vôi, than đá, nước cùng các chất vô cơ và điều kiện cần thiết khác, viết các phương trình phản ứng điều chế: Cao su Buna, Nhựa PVC, etanal

3.2. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau dưới dạng công thức cấu tạo, xác định các chất A, B₁, B₂, D, E, F.



Câu 4: (4,5 điểm)

4.1. Đốt cháy hoàn toàn 0,02 mol hỗn hợp X gồm 3 hiđrocacbon đồng phân A, B, C. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 5,75 lít dung dịch Ca(OH)_2 0,02M thu được kết tủa và khối lượng dung dịch tăng lên 5,08 gam. Cho Ba(OH)_2 dư vào dung dịch thu được, kết tủa lại tăng thêm, tổng khối lượng kết tủa 2 lần là 24,305 gam.

a. Xác định công thức phân tử của 3 hiđrocacbon

b. Xác định công thức cấu tạo A, B, C biết:

- Cả 3 chất đều không làm mất màu dung dịch brom.

- Khi đun nóng với dung dịch KMnO_4 loãng trong H_2SO_4 thì A và B đều cho cùng sản phẩm $\text{C}_9\text{H}_6\text{O}_6$ còn C cho sản phẩm $\text{C}_8\text{H}_6\text{O}_4$.

- Khi đun nóng với brom có mặt bột sắt A chỉ cho một sản phẩm monobrom. Còn chất B, C mỗi chất cho 2 sản phẩm monobrom

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra

4.2. Hoàn thành các phản ứng dưới đây. Xác định sản phẩm chính của mỗi phản ứng và dùng cơ chế giải thích sự hình thành sản phẩm chính đó.

(a) propilen + $\text{HCl} \rightarrow$

(b) (ancol sec-butylic) $\xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4, 180^\circ\text{C}}$

Câu 5: (3,5 điểm)

5.1. khi thực hiện este hóa 1 mol CH_3COOH và 1 mol $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ lượng este lớn nhất thu được là $\frac{2}{3}$ mol. để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hóa 1 mol CH_3COOH cần số mol $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ là bao nhiêu?

5.2. Đốt cháy hoàn toàn 13,36 gam hỗn hợp X gồm axit metacrylic, axit adipic, axit axetic và glixerol (trong đó số mol axit metacrylic bằng số mol axit axetic) bằng O_2 dư, thu được hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn Y vào dung dịch chứa 0,38 mol Ba(OH)_2 , thu được 49,25 gam kết tủa và dung dịch Z. Đun nóng Z lại thấy xuất hiện kết tủa. Cho 13,36 gam hỗn hợp X tác dụng với 140 ml dung dịch KOH 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Tính m?

----HẾT----

HƯỚNG DẪN CHẤM

Câu	HƯỚNG DẪN CHẤM	Điểm															
Câu1 1.1	<div>$\text{Mg}^{2+} + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{Mg}(\text{OH})_2 \downarrow$$\text{Fe}^{3+} + 3\text{OH}^- \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_3 \downarrow$<p>Để $\text{Mg}(\text{OH})_2$ xuất hiện thì $[\text{OH}^-] \geq \sqrt{\frac{10^{-11}}{4 \cdot 10^{-3}}} = 5 \cdot 10^{-5}$</p><p>Để $\text{Fe}(\text{OH})_3$ xuất hiện thì $[\text{OH}^-] \geq \sqrt[3]{\frac{10^{-39}}{10^{-3}}} = 10^{-12}$</p><p>Dễ thấy $\text{Fe}(\text{OH})_3$ tạo thành trước</p><p>Để $\text{Mg}(\text{OH})_2$ kết tủa thì $[\text{OH}^-] = 5 \cdot 10^{-5} \Rightarrow [\text{H}^+] = 2 \cdot 10^{-10} \Rightarrow \text{pH} = 9,699$</p><p>Để $\text{Fe}(\text{OH})_3$ kết tủa hoàn toàn thì $[\text{Fe}^{3+}] > 10^{-6} \Rightarrow [\text{OH}^-]^3 < 10^{-33} \Rightarrow \text{pH} > 3$</p><p>Vậy để $\text{Fe}(\text{OH})_3$ tách khỏi dung dịch thì $3 < \text{pH} < 9,699$</p></div>	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25															
1.2	<div><p>b. Gọi C_A là nồng độ M của dung dịch CH_3COOH</p>$\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$<table><tr><td>C</td><td>C_A</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>ΔC</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>[]</td><td>$C_A - x$</td><td>x</td><td></td><td>x</td></tr></table><p>Với $\text{pH} = 3,0 \Rightarrow x = 10^{-3}\text{M}$</p>$\frac{(10^{-3})^2}{C_A - 10^{-3}} = 10^{-4,76}$$C_A = \frac{10^{-6}}{10^{-4,76}} + 10^{-3} = 10^{-1,24+10^{-3}} \approx 0,0585\text{M}$</div>	C	C_A	0	0		ΔC	x		x	x	[]	$C_A - x$	x		x	0,25 0,25 0,25
C	C_A	0	0														
ΔC	x		x	x													
[]	$C_A - x$	x		x													

	<p>Dung dịch KOH có pH = 11,0 $\Rightarrow$ $[\text{OH}^-] = [\text{KOH}] = \frac{10^{-14}}{10^{-11}} = 10^{-3} \text{ M}$</p> <p>Sau khi trộn:</p> $C_{\text{CH}_3\text{COOH}} = \frac{0,0585 \times 25}{40} = 0,03656 \text{ M} \approx 3,66 \cdot 10^{-2} \text{ M}$ $C_{\text{KOH}} = \frac{10^{-3} \times 15}{40} = 3,75 \cdot 10^{-4} \text{ M}$ $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{KOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOK} + \text{H}_2\text{O}$ <p>Phản ứng $3,66 \cdot 10^{-2}$ $3,75 \cdot 10^{-4}$ 0 0</p> <p>Sau phản ứng ($3,66 \cdot 10^{-2} - 3,75 \cdot 10^{-4}$) 0 $3,75 \cdot 10^{-4}$ $3,75 \cdot 10^{-4}$</p> $\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$ <table border="0"> <tr> <td>C</td><td>0,036225</td><td>$3,75 \cdot 10^{-4}$</td></tr> <tr> <td>ΔC</td><td>0</td><td></td></tr> <tr> <td>[]</td><td>x</td><td>x</td></tr> <tr> <td></td><td>x</td><td></td></tr> <tr> <td>Nên $K_a =$</td><td>$0,036225 - x$</td><td>$x + 3,75 \cdot 10^{-4}$</td></tr> <tr> <td>$^4)/ (0,036225 -$</td><td>x</td><td>$x(x + 3,75 \cdot 10^{-4}) = 10^{-4,76} \rightarrow x$</td></tr> <tr> <td>$= 6,211 \cdot 10^{-4}$</td><td></td><td>pH = 3,21</td></tr> </table>	C	0,036225	$3,75 \cdot 10^{-4}$	ΔC	0		[]	x	x		x		Nên $K_a =$	$0,036225 - x$	$x + 3,75 \cdot 10^{-4}$	$^4)/ (0,036225 -$	x	$x(x + 3,75 \cdot 10^{-4}) = 10^{-4,76} \rightarrow x$	$= 6,211 \cdot 10^{-4}$		pH = 3,21	<p>0,25</p> <p>0,25</p> <p>0,5</p> <p>0,25</p> <p>0,5</p>
C	0,036225	$3,75 \cdot 10^{-4}$																					
ΔC	0																						
[]	x	x																					
	x																						
Nên $K_a =$	$0,036225 - x$	$x + 3,75 \cdot 10^{-4}$																					
$^4)/ (0,036225 -$	x	$x(x + 3,75 \cdot 10^{-4}) = 10^{-4,76} \rightarrow x$																					
$= 6,211 \cdot 10^{-4}$		pH = 3,21																					
Câu 2																							
2.1	<p>Vì $M_Z = 5 \rightarrow$ khí còn lại phải là H_2. Có $n_{\text{NO}} = 0,05(\text{mol})$ và $n_{\text{H}_2} = 0,4(\text{mol})$ và $m_Z = 2,3(\text{g})$</p> <p>Muối sunfat trung hòa có thể gồm FeSO_4, $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$, $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, K_2SO_4, $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$; H_2O</p> <p>Theo ĐLBTKL</p> $66,2 + 3,1 \cdot 136 = 466,6 + 0,45 \cdot 469 + m_{\text{H}_2\text{O}} \rightarrow m_{\text{H}_2\text{O}} = 18,9(\text{g}) \rightarrow n_{\text{H}_2\text{O}} = 1,05(\text{mol})$ <p>Đặt $n_{\text{NH}_4^+} = x(\text{mol})$.</p> <p>Theo ĐLBTK nguyên tố H: $3,1 = 4x + 2 \cdot 1,05 + 2 \cdot 0,4 \rightarrow x = 0,05(\text{mol})$</p> <p>Theo ĐLBTK nguyên tố N: $n_{\text{NO}_3} = 0,05 + 0,05 = 0,1(\text{mol}) \rightarrow n_{\text{Fe}(\text{NO}_3)_2} = 0,05(\text{mol})$</p> <p>Theo ĐLBTK O ta được $4a + 0,05 \cdot 6 = 1,05 + 0,05 \rightarrow a = 0,2(\text{mol})$ (Với $a = n_{\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3}$)</p> $\rightarrow m_{\text{Al}} = 66,2 - 0,2 \cdot 232 - 180 \cdot 0,05 = 10,8(\text{g})$ <p>%Al = 16,1%</p>	<p>0,25</p> <p>0,25</p> <p>0,25</p> <p>0,25</p> <p>0,25</p> <p>0,5</p> <p>0,25</p>																					
2.2	Nếu đúng hiện tượng + viết đúng pt phản ứng mỗi chất: 0,25x8	2,0																					
Câu 3																							
3.1	<p>$\text{CaO} + 3\text{C} \rightarrow \text{CaC}_2 + \text{CO}$ (lò điện)</p> <p>$\text{CaC}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{C}_2\text{H}_2$</p> <p>$2\text{C}_2\text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}\equiv\text{CH}$ (dk: t°, CuCl, NH_4Cl)</p> <p>$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}\equiv\text{CH} + \text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$ (xt: Pd/PbCO_3, t°)</p> <p>$n_{\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2} \rightarrow (\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2)_n$ (xt, p, t°)</p> <p>$\text{C}_2\text{H}_2 + \text{HCl} \rightarrow \text{CH}_2=\text{CHCl}$ (xt: HgCl_2, t°)</p> <p>$n_{\text{CH}_2=\text{CHCl}} \rightarrow (\text{CH}_2-\text{CHCl})_n$ (xt, p, t°)</p> <p>$\text{C}_2\text{H}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CH}_3\text{CHO}$</p>	<p>0,25</p> <p>0,25</p> <p>0,25</p> <p>0,25</p> <p>0,25</p> <p>0,25</p> <p>0,25</p> <p>0,25</p>																					
3.2	<p>$2\text{CH}_4 \rightarrow \text{HC}\equiv\text{CH} + 3\text{H}_2$ (1500 $^\circ\text{C}$) $\Rightarrow$ A: $\text{HC}\equiv\text{CH}$</p> <p>$\text{HC}\equiv\text{CH} + \text{HCl} \rightarrow \text{H}_2\text{C}=\text{CHCl}$ (B_1)</p> <p>$\text{HC}\equiv\text{CH} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{H}_3\text{C}-\text{CHCl}_2$ (B_2)</p> <p>$\text{H}_2\text{C}=\text{CHCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{CHO} + \text{NaCl}$</p> <p>$\text{H}_3\text{C}-\text{CHCl}_2 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{CHO} + 2\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ (D: CH_3CHO)</p> <p>$\text{CH}_3\text{CHO} + 1/2\text{O}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH}$ (E)</p>	<p>0,25</p> <p>0,25</p> <p>0,25</p> <p>0,25</p> <p>0,25</p> <p>0,25</p> <p>0,25</p>																					

4.2	<p>1. Phản ứng và cơ chế phản ứng:</p> <p>(c) Phản ứng :</p> $\text{CH}_3\text{---CH=CH}_2 + \text{HCl} \longrightarrow \begin{cases} \text{CH}_3\text{---CH(Cl)---CH}_3 & (\text{sản phẩm chính}) \\ \text{CH}_3\text{---CH}_2\text{---CH}_2\text{---Cl} \end{cases}$ <p>Cơ chế (cộng A_E) :</p> $\text{CH}_3\text{---CH=CH}_2 \xrightarrow{\text{H}^+} \begin{cases} \text{CH}_3\text{---CH}^+\text{---CH}_3 & (\text{X}) \\ \text{CH}_3\text{---CH}_2\text{---CH}_2^+ & (\text{Y}) \end{cases} \xrightarrow{\text{Cl}^-} \text{CH}_3\text{---CH(Cl)---CH}_3$ <p>Sản phẩm chính hình thành theo hướng tạo cacbocation trung gian bền vững hơn. Dễ thấy rằng cacbocation (X) bền hơn (Y) (do điện tích được giải tỏa nhiều hơn, với 6H^α), nên sản phẩm chính là isopropyl clorua.</p>	0,5 0,5
	<p>(d) Phản ứng :</p> $\text{CH}_3\text{---CH}_2\text{---CH(OH)---CH}_3 \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4} \begin{cases} \text{CH}_3\text{---CH=CH---CH}_3 + \text{H}_2\text{O} & (\text{sản phẩm chính}) \\ \text{CH}_2\text{=CH---CH}_2\text{---CH}_3 + \text{H}_2\text{O} \end{cases}$ <p>Cơ chế (tách E1) :</p> $\text{CH}_3\text{---CH}_2\text{---CH(OH)---CH}_3 \xrightarrow{\text{H}^+} \text{CH}_3\text{---CH}_2\text{---CH}^+\text{(OH}_2\text{)---CH}_3 \xrightarrow{-\text{H}_2\text{O}} \begin{cases} \text{CH}_3\text{---CH=CH---CH}_3 & (\text{X}) \\ \text{CH}_2\text{=CH---CH}_2\text{---CH}_3 & (\text{Y}) \end{cases}$ <p>Sản phẩm chính được hình thành theo hướng tạo sản phẩm bền hơn. Ở đây, (X) bền hơn (Y) do có số nguyên tử H^α tham gia liên hợp, làm bền hóa liên kết π nhiều hơn.</p>	0,5 0,5
Câu 5 5.1	<p>$\text{CH}_3\text{COOH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$</p> <p>Đầu : 1 1</p> <p>Phản ứng: 2/3 2/3 2/3 2/3</p> <p>còn lại: 1/3 1/3 2/3 2/3</p> <p>Do tạo ra 2/3 mol este nên ta có cân bằng sau:</p> $\frac{[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5][\text{H}_2\text{O}]}{[\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}][\text{CH}_3\text{COOH}]} = 4$ <p>$\text{CH}_3\text{COOH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$</p> <p>Đầu : 1 1</p> <p>Phản ứng: 2/3 2/3 2/3 2/3</p> <p>còn lại: 1/3 1/3 2/3 2/3</p> <p>vậy gọi số mol C₂H₅OH đã tham gia phản ứng là x, thì do hiệu suất là 0,9 tính theo axit nên số mol este sinh ra là 0,9, số mol C₂H₅OH còn lại là x-0,9. Vậy ta có PT:</p>	0,25 0,5 0,5

	$\frac{0,9 * 0,9}{0,1(x - 0,9)} = 4$ <p>suy ra $x=2,925$ mol.</p>	0,25 0,25
5.2	<p>$n_{C_4H_8O_2} = n_{CH_3COOH}$ nên quy X về :</p> $\begin{cases} C_6H_{10}O_4 : a \\ C_3H_8O_3 : b \end{cases}$ <p>Vì số mol</p> <p>Ta có ngay :</p> $\begin{cases} 6a + 3b = 0,51 \\ 146a + 92b = 13,36 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = 0,06 \\ b = 0,05 \end{cases}$ <p>$\xrightarrow{BT KL} 146.0,06 + 0,14.56 = m + 0,12.18 \rightarrow m = 14,44$</p> <p> $0,38 Ba(OH)_2 \xrightarrow{CO_2} \begin{cases} n_{BaCO_3} = 0,25 \\ \xrightarrow{BTNT .Ba} n_{Ba(HCO_3)_2} = 0,13 \end{cases} \rightarrow \sum C = 0,51$ </p> <p> $\begin{cases} a = 0,06 \\ b = 0,05 \end{cases} \xrightarrow{KOH} n_{H_2O} = 0,12$ </p>	0,25 0,5 0,5 0,5

**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO
QUẢNG NAM**

**KỲ THI OLYMPIC 24/3 QUẢNG NAM
NĂM HỌC: 2016-2017**

Môn thi : **HÓA HỌC 11**
 Thời gian: **150 phút** (không kể thời
 gian giao đề)
 Ngày thi: **25/03/2017**

(Đề thi có 02 trang)

**ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ
THPT CHU VĂN AN**

Câu I (3,0 điểm).

1. Chỉ dùng chất chỉ thị phenolphthalein, hãy trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch $NaHSO_4$, Na_2CO_3 , $AlCl_3$, $Fe(NO_3)_3$, $NaCl$, $Ca(NO_3)_2$. Các phản ứng minh họa viết dưới dạng ion thu gọn.

2. Trong phòng thí nghiệm có sẵn dung dịch NH_3 25% ($D = 0,91$ g/cm³). Cần bao nhiêu ml dung dịch NH_3 trên và bao nhiêu ml nước cất để pha chế được 0,5 lít dung dịch NH_3 có pH = 12. Biết NH_3 có $K_b = 1,8.10^{-5}$ và thể tích dung dịch không bị hao hụt khi pha trộn.

3. Xác định nồng độ NH_4Cl cần thiết để ngăn cản sự kết tủa $Mg(OH)_2$ trong 1 lít dung dịch chứa 0,010 mol NH_3 và 0,001 mol Mg^{2+} . Biết hằng số $K_b(NH_3) = 1,8.10^{-5}$ và $T_{Mg(OH)_2} = 7,1.10^{-12}$.


Câu II (5,0 điểm).

1. a/ Photpho tác dụng với clo tạo thành PCl_3 và PCl_5 . Nito có tạo thành hợp chất tương tự như photpho hay không? Vì sao?

b/ Thủy phân hoàn toàn 8,25 gam một photpho trihalogenua thu được dung dịch X. Để trung hòa X cần 100 ml dung dịch NaOH 3M. Xác định công thức của photpho trihalogenua.

2. a. Tại sao khi điều chế CO_2 trong phòng thí nghiệm, người ta thường cho dung dịch HCl tác dụng với đá vôi mà không dùng dung dịch H_2SO_4 ? Khí CO_2 sinh ra từ phương pháp trên thường có lẫn tạp chất là khí HCl và hơi nước, trình bày phương pháp hóa học để tinh chế CO_2 .

b. Xác định các chất vô cơ ứng với các kí hiệu A, A_1 , A_2 , A_3 , X, X_1 , X_2 , X_3 trong sơ đồ chuyển hóa sau và viết các phương trình hóa học. Biết A là một kim loại có hóa trị 2.



3. Hỗn hợp X gồm Mg, Cu và Al. Cho 19,92 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 9,856 lít H_2 (đktc) và còn m_1 gam chất rắn không tan. Cho 19,92 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO_3 loãng dư thu được V lít NO (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 97,95 gam muối khan. Cho m_1 gam chất rắn không tan tác dụng với dung dịch HNO_3 loãng dư thu được 0,32V lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Tính phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp X.

Câu III (4,0 điểm).

1. Sáu hidrocarbon A, B, C, D, E, F đều có công thức phân tử C_4H_8 . Cho dư từng chất vào dung dịch brom trong CCl_4 khi không chiếu sáng thì thấy A, B, C, D làm mất màu rất nhanh, E làm mất màu chậm, còn F không làm mất màu dung dịch brom. Các sản phẩm thu được từ B và C là những đồng phân quang học không đối quang của nhau. Khi cho tác dụng với H_2 (xúc tác Ni, t°) thì A, B, C cho cùng một sản phẩm. B có nhiệt độ sôi cao hơn C. Lập luận để xác định tên gọi của A, B, C, D, E, F.

2. Hidrocarbon A có công thức phân tử là C_6H_8 . Biết 1 mol A tác dụng với dung dịch $\text{KMnO}_4/\text{H}_2\text{SO}_4$ thu được 2 mol CO_2 và 2 mol HOOC-COOH .

a) Xác định công thức cấu tạo của A.

b) A có đồng phân hình học không? Nếu có hãy viết công thức cấu trúc của các đồng phân đó và gọi tên chúng.

3. Cho 6,9 gam chất hữu cơ X có công thức phân tử C_7H_8 tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO_3 trong NH_3 , khi phản ứng hoàn toàn thu được 22,95 gam kết tủa. Xác định công thức cấu tạo của X.

Câu IV (4,0 điểm).

1. So sánh lực axit của các chất sau:

$(\text{CH}_3)_3\text{CCOOH}$; $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{COOH}$; $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}=\text{CHCOOH}$; $(\text{CH}_3)_2\text{CHCOOH}$. Giải thích?

2. Giải thích vì sao:

a/ Khi cho etanol vào nước thì thể tích dung dịch thu được lại giảm so với tổng thể tích của hai chất ban đầu.

b/ o-nitrophenol có nhiệt độ sôi thấp hơn các đồng phân m-nitrophenol và p-nitrophenol.


3. Chia 20,8 gam hỗn hợp gồm hai andehit đơn chức là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau:

- Phần một tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO_3 trong NH_3 đun nóng, thu được 108 gam Ag.

- Phần hai tác dụng hoàn toàn với H_2 dư (xúc tác Ni, t^0), thu được hỗn hợp X gồm hai ancol Y và Z ($M_Y < M_Z$). Đun nóng X với H_2SO_4 đặc ở 140^0C , thu được 4,52 gam hỗn hợp ba ete. Biết hiệu suất phản ứng tạo ete của Y bằng 50%. Tính hiệu suất tạo ete của Z.

Câu V (4,0 điểm).

1. Viết các phương trình hóa học (các chất hữu cơ viết bằng công thức cấu tạo) theo sơ đồ sau:



2. Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ mạch hở A và B (phân tử chỉ chứa C, H, O). Phân tử A và B đều có số nguyên tử hydro gấp đôi số nguyên tử cacbon. Nếu lấy cùng số mol A hoặc B phản ứng hết với Na thì đều thu được V lít H_2 . Còn nếu lấy số mol A hoặc B như trên cho phản ứng hết với H_2 thì cần vừa đủ 2V lít (các thể tích khí đo trong cùng điều kiện). Cho 33,8 gam X phản ứng hết với Na, thu được 5,6 lít H_2 (đktc). Cho 33,8 gam X phản ứng hết với $AgNO_3$ trong NH_3 , lượng Ag sinh ra phản ứng hết với HNO_3 đặc, thu được 13,44 lít NO_2 (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Xác định công thức cấu tạo của A, B.

Cho biết nguyên tử khối: H=1; O=16; Cl=35,5; N=14; C=12; F = 19; Cl = 35,5; Br=80;

I = 127; Al=27; Fe=56; Cu=64; Ag=108; Mg = 24

-----HẾT-----

Ghi chú: Học sinh **không** được phép sử dụng bảng Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Họ và tên Học sinh:.....SBD:.....

Họ và tên Giám thị 1:.....

Họ và tên Giám thị 2:.....

**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO
QUẢNG NAM**

**KỲ THI OLYMPIC 24/3 QUẢNG NAM
NĂM HỌC: 2016-2017**

Môn thi : **HÓA HỌC 11**
Thời gian: **150 phút** (không kể thời
gian giao đề)
Ngày thi: **25/03/2017**

**ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ
THPT CHU VĂN AN VAN**

HƯỚNG DẪN CHẤM

Câu I (3,0 điểm).

1. Chỉ dùng chất chỉ thị phenolphthalein, hãy trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch NaHSO_4 , Na_2CO_3 , AlCl_3 , $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$, NaCl , $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$. Các phản ứng minh họa viết dưới dạng ion thu gọn.

2. Trong phòng thí nghiệm có sẵn dung dịch NH_3 25% ($D = 0,91 \text{ g/cm}^3$). Cần bao nhiêu ml dung dịch NH_3 trên và bao nhiêu ml nước cất để pha chế được 0,5 lít dung dịch NH_3 có $\text{pH} = 12$. Biết NH_3 có $K_b = 1,8 \cdot 10^{-5}$ và thể tích dung dịch không bị hao hụt khi pha trộn.

3. Xác định nồng độ NH_4Cl cần thiết để ngăn cản sự kết tủa $\text{Mg}(\text{OH})_2$ trong 1 lít dung dịch chứa 0,010 mol NH_3 và 0,001 mol Mg^{2+} . Biết hằng số $K_b(\text{NH}_3) = 1,8 \cdot 10^{-5}$ và $T_{\text{Mg}(\text{OH})_2} = 7,1 \cdot 10^{-12}$.

Y	NỘI DUNG	ĐIỂM																				
1 1,0đ	<p>Trích mẫu thử cho mỗi lần thí nghiệm:</p> <p>Cho phenolphthalein vào mỗi mẫu thử. Mẫu thử có màu hồng là dung dịch Na_2CO_3, các mẫu thử còn lại không màu.</p> $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{OH}^-$ <p>Dùng Na_2CO_3 làm thuốc thử để cho vào các mẫu thử còn lại.</p> <p>Mẫu thử có sủi bọt khí không màu là NaHSO_4</p> $\text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ <p>Mẫu thử tạo kết tủa keo trắng và sủi bọt khí không màu là AlCl_3</p> $2\text{Al}^{3+} + 3\text{CO}_3^{2-} + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow + 3\text{CO}_2 \uparrow$ <p>Mẫu thử tạo kết tủa đỏ nâu và sủi bọt khí không màu là $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$</p> $2\text{Fe}^{3+} + 3\text{CO}_3^{2-} + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Fe}(\text{OH})_3 \downarrow + 3\text{CO}_2 \uparrow$ <p>Mẫu thử tạo kết tủa trắng là $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$</p> $\text{Ca}^{2+} + \text{CO}_3^{2-} \rightarrow \text{CaCO}_3 \downarrow$ <p>Mẫu thử không tạo hiện tượng là NaCl.</p>																					
2 1,0đ	<p>$\text{pH} = 12 \Rightarrow [\text{OH}^-] = 10^{-2}\text{M}$. Gọi x là nồng độ của NH_3 ngay sau khi pha loãng</p> <p>Xét quá trình:</p> <table><tr><td></td><td>$\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$</td><td>$\rightleftharpoons$</td><td>$\text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$</td><td>$K_b = 1,8 \cdot 10^{-5}$</td></tr><tr><td>bđ</td><td>x(M)</td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>pli</td><td>10^{-2}</td><td></td><td>10^{-2}</td><td>10^{-2}</td></tr><tr><td>cb</td><td>$x - 10^{-2}$</td><td></td><td>10^{-2}</td><td>10^{-2}</td></tr></table> $\text{Ta có: } K_b = 1,8 \cdot 10^{-5} = \frac{10^{-2} \cdot 10^{-2}}{x - 10^{-2}} \Rightarrow x = \frac{5009}{900} \approx 5,566\text{M}$ <p>Với dung dịch NH_3 25% ($D = 0,91 \text{ g/cm}^3$) $\Rightarrow [\text{NH}_3]_{\text{bđ}} = \frac{10 \cdot 25 \cdot 0,91}{17} = \frac{455}{34} \approx 13,38\text{M}$</p> <p>Gọi V là thể tích (ml) NH_3 25% cần dùng</p> $\frac{V \cdot \frac{455}{34}}{500} = \frac{5009}{900} \Rightarrow V = 207,94$		$\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$	$\rightleftharpoons$	$\text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$	$K_b = 1,8 \cdot 10^{-5}$	bđ	x(M)		0	0	pli	10^{-2}		10^{-2}	10^{-2}	cb	$x - 10^{-2}$		10^{-2}	10^{-2}	
	$\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$	$\rightleftharpoons$	$\text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$	$K_b = 1,8 \cdot 10^{-5}$																		
bđ	x(M)		0	0																		
pli	10^{-2}		10^{-2}	10^{-2}																		
cb	$x - 10^{-2}$		10^{-2}	10^{-2}																		

	$\Rightarrow$ Thể tích nước cất cần dùng là 292,06 ml																							
3 1,0đ	<p>Điều kiện để không tạo thành kết tủa là $[Mg^{2+}].[OH^-]^2 < 7,1.10^{-12}$</p> $\Rightarrow [OH^-] < \left[\frac{7,1.10^{-12}}{[Mg^{2+}]} \right]^{\frac{1}{2}} = \left[\frac{7,1.10^{-12}}{10^{-3}} \right]^{\frac{1}{2}} = 8.10^{-5}$ <p>Mặt khác, OH^- tham gia vào cân bằng</p> $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$ $K_b = \frac{[NH_4^+].[OH^-]}{[NH_3]} = 1,75.10^{-5}$ <p>Để $[OH^-] < 8.10^{-5}$ thì $[NH_4^+]$ cần thiết là</p> $[NH_4^+] > \frac{1,8.10^{-5}.0,01}{8.10^{-5}} = 2,25.10^{-3} (M)$																							
Câu II (5,0 điểm).																								
<p>1. a/ Photpho tác dụng với clo tạo thành PCl_3 và PCl_5. Nitơ có tạo thành hợp chất tương tự như photpho hay không? Vì sao?</p> <p>b/ Thủy phân hoàn toàn 8,25 gam một photpho trihalogenua thu được dung dịch X. Để trung hòa X cần 100 ml dung dịch NaOH 3M. Xác định công thức của photpho trihalogenua.</p> <p>2. a. Tại sao khi điều chế CO_2 trong phòng thí nghiệm, người ta thường cho dung dịch HCl tác dụng với đá vôi mà không dùng dung dịch H_2SO_4? Khí CO_2 sinh ra từ phương pháp trên thường có lẫn tạp chất là khí HCl và hơi nước, trình bày phương pháp hóa học để tinh chế CO_2.</p> <p>b. Xác định các chất vô cơ ứng với các kí hiệu A, A_1, A_2, A_3, X, X_1, X_2, X_3 trong sơ đồ chuyển hóa sau và viết các phương trình hóa học. Biết A là một kim loại có hóa trị 2.</p> <div style="text-align: center;"><table><tr><td>A</td><td>(1)</td><td>A_1</td><td>(4)</td><td>A_2</td><td>(7)</td><td>A_3</td></tr><tr><td></td><td></td><td>(3)</td><td>X</td><td>(6)</td><td>X</td><td>(9)</td><td>X</td></tr><tr><td>CO</td><td>(2)</td><td>X_1</td><td>(5)</td><td>X_2</td><td>(8)</td><td>X_3</td></tr></table></div>			A	(1)	A_1	(4)	A_2	(7)	A_3			(3)	X	(6)	X	(9)	X	CO	(2)	X_1	(5)	X_2	(8)	X_3
A	(1)	A_1	(4)	A_2	(7)	A_3																		
		(3)	X	(6)	X	(9)	X																	
CO	(2)	X_1	(5)	X_2	(8)	X_3																		
<p>3. Hỗn hợp X gồm Mg, Cu và Al. Cho 19,92 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 9,856 lít H_2 (đktc) và còn m_1 gam chất rắn không tan. Cho 19,92 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO_3 loãng dư thu được V lít NO (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 97,95 gam muối khan. Cho m_1 gam chất rắn không tan tác dụng với dung dịch HNO_3 loãng dư thu được 0,32V lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Tính phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp X.</p>																								
1 1,5đ	<p>a/ Cấu hình của N: $1s^2 2s^2 2p^3$ P: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3 3d^0$ (ở trạng thái kích thích: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 3p^3 3d^1$) P có thể tạo ra 3 liên kết cộng hóa trị hoặc 5 liên kết cộng hóa trị do có thể sử dụng cả obitan d để tạo liên kết. Trong khi đó, N không có obitan d nên chỉ có thể sử dụng tối đa 4 obitan (1 obitan s và 3 obitan d) nên N có cộng hóa trị tối đa là 4. Vì</p>																							

	<p>vậy, nitơ chỉ tạo hợp chất NCl_3 rất không bền mà không tạo được hợp chất NCl_5.</p> <p>b/ PTHH: $\text{PX}_3 + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{PO}_3 + 3\text{HX}$ $\text{H}_3\text{PO}_3 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{HPO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ $\text{HX} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaX} + \text{H}_2\text{O}$</p> <p style="text-align: center;">0,1.3</p> <p>Số mol của $\text{PX}_3 = \frac{8,25}{5} = 0,06$</p> <p>$\Rightarrow 31 + 3M_X = \frac{8,25}{0,06} \Rightarrow M_X = 35,5$</p> <p>Công thức của photpho trihalogenua là PCl_3</p>	
2 1,5đ	<p>a/ Người ta không dùng dung dịch H_2SO_4 để tác dụng với đá vôi vì phản ứng sinh ra chất ít tan (CaSO_4) bám lên đá vôi làm cho phản ứng xảy ra chậm.</p> <p>PTHH: $\text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{CaSO}_4\downarrow + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$.</p> <p>* Phương pháp hóa học để tinh chế CO_2 có lẫn tạp chất HCl, H_2O: Cho hỗn hợp (CO_2, HCl, và hơi H_2O) lội chậm qua bình đựng dung dịch NaHCO_3 bão hòa, dư thì khí HCl bị hấp thụ hết, do có phản ứng: $\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$ Khí đi ra khỏi bình là CO_2 và hơi H_2O tiếp tục được dẫn qua bình đựng H_2SO_4 đặc, dư thì hơi H_2O bị hấp thụ hết. Khí đi ra khỏi bình là CO_2 tinh khiết.</p> <p>b/ A là Ba; A_1 là BaO; A_2 là Ba(OH)_2; A_3 là BaCl_2; X là BaCO_3; X_1 là CO_2; X_2 là NaHCO_3 (hoặc KHCO_3); X_3 là Na_2CO_3 (hoặc K_2CO_3). Có thể thay Ba và hợp chất của Ba bằng Ca và hợp chất của Ca.</p> <p>Các PTHH: 1/ $2\text{Ba} + \text{O}_2 \xrightarrow{3/4\text{t}^\circ} 2\text{BaO}$ 2/ $2\text{CO} + \text{O}_2 \xrightarrow{3/4\text{t}^\circ} 2\text{CO}_2$ 3/ $\text{BaO} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{BaCO}_3$ 4/ $\text{BaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ba(OH)}_2$ 5/ $\text{CO}_2 \text{ dư} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaHCO}_3$ 6/ $\text{Ba(OH)}_2 + 2\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{BaCO}_3 + \text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$ (hoặc $\text{Ba(OH)}_2 + \text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{BaCO}_3 + \text{NaOH} + \text{H}_2\text{O}$) 7/ $\text{Ba(OH)}_2 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{BaCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 8/ $\text{NaHCO}_3 + \text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ (hoặc $2\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{3/4\text{t}^\circ} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$) 9/ $\text{BaCl}_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{BaCO}_3 + 2\text{NaCl}$</p>	
3 2,0đ	<p>Các quá trình hóa học:</p> <p>* $\text{X} + \text{ddHCl}$ dư: $\text{Mg} \rightarrow 2\text{e} + \text{Mg}^{2+}$ $\text{Al} \rightarrow 3\text{e} + \text{Al}^{3+}$ $2\text{H}^+ + 2\text{e} \rightarrow \text{H}_2$</p> <p>Chất rắn không tan là Cu</p> <p>* $\text{X} + \text{HNO}_3$ dư: có thể tạo NH_4^+ $\text{Mg} \rightarrow 2\text{e} + \text{Mg}^{2+}$ $\text{Al} \rightarrow 3\text{e} + \text{Al}^{3+}$ $\text{Cu} \rightarrow 2\text{e} + \text{Cu}^{2+}$ $4\text{H}^+ + \text{NO}_3^- + 3\text{e} \rightarrow \text{NO} + 2\text{H}_2\text{O}$ $10\text{H}^+ + \text{NO}_3^- + 8\text{e} \rightarrow \text{NH}_4^+ + 3\text{H}_2\text{O}$</p> <p>* $\text{Cu} + \text{HNO}_3$ dư: $\text{Cu} \rightarrow 2\text{e} + \text{Cu}^{2+}$ $4\text{H}^+ + \text{NO}_3^- + 3\text{e} \rightarrow \text{NO} + 2\text{H}_2\text{O}$</p> <p>Số mol $\text{H}_2 = 9,856/22,4 = 0,44 \text{ mol}$.</p>	

<p>Gọi x là số mol của NH_4^+. Gọi y là số mol của NO ứng với V lít. $\Rightarrow 0,32y$ là số mol của NO ứng với 0,32V lít. Theo bảo toàn electron: $n_{e/KL} = 8x + 3y = 3.0,32y + 2.0,44$ (I)</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center;"> $\begin{array}{c} \text{NH}_4^+ : x\text{mol} \\ \text{NO}_3^- \end{array}$ </div> <div style="margin: 0 10px;"> $\left. \begin{array}{l} \text{Mg}^{2+}; \text{Al}^{3+}; \text{Cu}^{2+} \end{array} \right\} : 19,92\text{gam}$ </div> </div> <p>Ta có: 97,95 gam muối gồm</p> <p>Theo bảo toàn điện tích: $n_{\text{NO}_3^-} = n_{e/KL} + n_{\text{NH}_4^+} = 8x + 3y + x = 9x + 3y$ $\Rightarrow 19,92 + 18x + 62(9x + 3y) = 97,95$ (II) Từ (I) và (II) ta có $x = 0,014375$; $y = 0,375$</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> $\Rightarrow n_{\text{Cu}} = \frac{3.0,32.0,375}{2} = 0,18 \text{ mol} \Rightarrow \%m_{\text{Cu}} = \frac{0,18.64.100}{19,92} = \mathbf{57,83\%}$ </div> </div> <p>Ta có: $24n_{\text{Mg}} + 27n_{\text{Al}} + 0,18.64 = 19,92$ và $2n_{\text{Mg}} + 3n_{\text{Al}} = 2.0,44$ $\Rightarrow n_{\text{Mg}} = 0,08$; $n_{\text{Al}} = 0,24$</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> $\text{Vậy } \%m_{\text{Mg}} = \frac{0,08.24.100}{19,92} = \mathbf{9,64\%}$ </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> $\%m_{\text{Al}} = \frac{0,24.27.100}{19,92} = \mathbf{32,53\%}$ </div> </div>	
---	--

Câu III (4,0 điểm).

1. Sáu hidrocarbon A, B, C, D, E, F đều có công thức phân tử C_4H_8 . Cho dư từng chất vào dung dịch brom trong CCl_4 khi không chiếu sáng thì thấy A, B, C, D làm mất màu rất nhanh, E làm mất màu chậm, còn F không làm mất màu dung dịch brom. Các sản phẩm thu được từ B và C là những đồng phân quang học không đối quang của nhau. Khi cho tác dụng với H_2 (xúc tác Ni, t^0) thì A, B, C cho cùng một sản phẩm. B có nhiệt độ sôi cao hơn C. Lập luận để xác định tên gọi của A, B, C, D, E, F.

2. Hidrocarbon A có công thức phân tử là C_6H_8 . Biết 1 mol A tác dụng với dung dịch $\text{KMnO}_4/\text{H}_2\text{SO}_4$ thu được 2 mol CO_2 và 2 mol HOOC-COOH .

a) Xác định công thức cấu tạo của A.

b) A có đồng phân hình học không? Nếu có hãy viết công thức cấu trúc của các đồng phân đó và gọi tên chúng.

3. Cho 6,9 gam chất hữu cơ X có công thức phân tử C_7H_8 tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO_3 trong NH_3 , khi phản ứng hoàn toàn thu được 22,95 gam kết tủa. Xác định công thức cấu tạo của X.


1 1,5đ	<p>Các chất ứng với CTPT C_4H_8 là but-1-en; <i>cis</i>-but-2-en; <i>trans</i>-but-2-en; methylpropen; xiclobutan và metylxiclopropan. Vì F hầu không phản ứng với Br_2/CCl_4 nên F là xiclobutan. Vì E phản ứng chậm với Br_2/CCl_4 nên E là metylxiclopropan. Vì A, B, C, khi hiđro hóa đều cho cùng sản phẩm nên A, B, C, có cùng mạch Cacbon. Vậy D là methylpropen. Vì B, C tác dụng với Br_2/CCl_4 cho những sản phẩm là các đồng phân quang học không đối quang của nhau (có ít nhất $2C^*$), nên B, C là đồng phân <i>cis</i>, <i>trans</i> của nhau. Do B có nhiệt độ sôi cao hơn C nên B là đồng phân <i>cis</i> (có độ phân cực lớn hơn). Vậy B là <i>cis</i>-but-2-en; C là <i>trans</i>-but-2-en; A là but-1-en.</p>	
2	a/ Theo đề : 1 mol A + dd $\text{KMnO}_4/\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2 \text{ mol CO}_2 + 2 \text{ mol HOOC-}$	

<p>1,0đ</p>	<p>COOH => A có 2 nhóm $H_2C=$ và 2 nhóm $=CH-CH=$ $\frac{2.6+2-8}{2}=3$ A có $(\pi + V) = \frac{2.6+2-8}{2}$, do đó công thức cấu tạo của A phải là $H_2C=CH-CH=CH-CH=CH_2$ b/ A có cặp đồng phân hình học là</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> $\begin{array}{c} H & & H \\ & \backslash & / \\ & C = C \\ / & & \backslash \\ CH_2=CH & & CH=CH_2 \\ cis(Z) - \text{hexa-1,3,5-trien} \end{array}$ </div> <div style="text-align: center;"> $\begin{array}{c} H & & CH=CH_2 \\ & \backslash & / \\ & C = C \\ / & & \backslash \\ CH_2=CH & & H \\ trans(E) - \text{hexa-1,3,5-trien} \end{array}$ </div> </div>	
<p>3 1,5đ</p>	<p>C_7H_8 có $(\pi + v) = 4$ Gọi x là số liên kết $-C\equiv CH$ ($x \leq 2$) PTHH: $C_7H_8 + xAgNO_3 + xNH_3 \rightarrow C_7H_{8-x}Ag_x \downarrow + xNH_4NO_3$ Có $n\downarrow = n(C_7H_8) = 6,9/92 = 0,075 \text{ mol}$ => $M\downarrow = 92 + 107x = 22,95/0,075 \Rightarrow x = 2$. Vậy C_7H_8 có 2 liên kết $-C\equiv CH$ Các CTCT của C_7H_8 thỏa mãn là $CH\equiv C-CH_2-CH_2-CH_2-C\equiv CH$; $CH\equiv C-CH(CH_3)-CH_2-C\equiv CH$; $CH\equiv C-C(CH_3)_2-C\equiv CH$; $CH\equiv C-CH(C_2H_5)-C\equiv CH$.</p>	
<p>Câu IV (4,0 điểm).</p> <p>1. So sánh lực axit của các chất sau: $(CH_3)_3CCOOH$; $CH_3CH=CHCH_2COOH$; $CH_3CH_2CH=CHCOOH$; $(CH_3)_2CHCOOH$. Giải thích?</p> <p>2. Giải thích vì sao: a/ Khi cho etanol vào nước thì thể tích dung dịch thu được lại giảm so với tổng thể tích của hai chất ban đầu. b/ <i>o</i>-nitrophenol có nhiệt độ sôi thấp hơn các đồng phân <i>m</i>-nitrophenol và <i>p</i>-nitrophenol.</p> <p>3. Chia 20,8 gam hỗn hợp gồm hai anđehit đơn chức là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau: - Phần một tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch $AgNO_3$ trong NH_3 đun nóng, thu được 108 gam Ag. - Phần hai tác dụng hoàn toàn với H_2 dư (xúc tác Ni, t^0), thu được hỗn hợp X gồm hai ancol Y và Z ($M_Y < M_Z$). Đun nóng X với H_2SO_4 đặc ở 140^0C, thu được 4,52 gam hỗn hợp ba ete. Biết hiệu suất phản ứng tạo ete của Y bằng 50%. Tính hiệu suất tạo ete của Z.</p>		
<p>1 1,0đ</p>	<p>Lực axit giảm dần theo dãy: $CH_3CH=CHCH_2COOH > CH_3CH_2CH=CHCOOH > (CH_3)_2CHCOOH > (CH_3)_3CCOOH$ Giải thích: Các axit có chứa liên kết $C=C$ làm tăng lực axit (do độ âm điện của các nguyên tử C_{sp^2} khá cao), ở axit thứ 2 có chứa liên kết</p> $CH_3-CH_2-CH=CH-C(OH)=O$ <p>có hiệu ứng +C nên lực axit kém hơn so với axit thứ nhất, hai axit cuối có các nhóm CH_3 đẩy electron nên làm giảm lực axit và số nhóm CH_3 càng nhiều thì lực axit càng giảm</p>	
<p>2 1,0đ</p>	<p>a/ Do hình thành liên kết hiđro mạnh giữa nguyên tử oxi tích điện âm của etanol và hiđro tích điện dương của H_2O nên khoảng cách phân tử etanol-H_2O gần hơn khoảng cách etanol-etanol và H_2O-H_2O. Do đó</p>	

	<p>thể tích dung dịch giảm.</p> <p>b/ <i>o</i>-nitrophenol do có nhóm OH gần nhóm NO₂ nên có sự hình thành liên kết hiđro nội phân tử (giữa nguyên tử H của nhóm OH với nguyên tử O của nhóm NO₂), làm giảm khả năng tạo liên kết hiđro liên phân tử nên nhiệt độ sôi thấp.</p>	
<p>3 2,0đ</p>	<p>* Phần 1:</p> <p>Ta có: $n_{Ag} = \frac{108}{108} = 1$ mol</p> <p>Nếu 2 anđehit $\neq$ HCHO thì</p> $RCHO + 2AgNO_3 + 3NH_3 + H_2O \xrightarrow{t^0} RCOONH_4 + 2Ag + 2NH_4NO_3$ $\bar{M}_{\text{anđehit}} = \frac{10,4}{0,5} = 20,8$ <p>$\Rightarrow n_{\text{anđehit}} = 1/2 = 0,5$ mol $\Rightarrow$ không phù hợp</p> <p>Do đó 2 anđehit phải là HCHO và CH₃CHO</p> <p>PTHH: $HCHO + 4AgNO_3 + 6NH_3 + 2H_2O \xrightarrow{t^0} (NH_4)_2CO_3 + 4Ag + 4NH_4NO_3$</p> <p style="text-align: center;">x mol 4x mol</p> $CH_3CHO + 2AgNO_3 + 3NH_3 + H_2O \xrightarrow{t^0} CH_3COONH_4 + 2Ag + 2NH_4NO_3$ <p style="text-align: center;">y mol 2y</p> <p>Có: $\begin{cases} 30x + 44y = 10,4 \\ 4x + 2y = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,2 \\ y = 0,1 \end{cases}$</p> <p>* Phần 2:</p> <p>Các phản ứng: $HCHO + H_2 \xrightarrow{t^0, Ni} CH_3OH$ (Y)</p> <p>$CH_3CHO + H_2 \xrightarrow{t^0, Ni} CH_3CH_2OH$ (Z)</p> <p>$2CH_3OH \xrightarrow{H_2SO_4, t^0} CH_3OCH_3 + H_2O$</p> <p>$2C_2H_5OH \xrightarrow{H_2SO_4, t^0} C_2H_5OC_2H_5 + H_2O$</p> <p>$CH_3OH + C_2H_5OH \xrightarrow{H_2SO_4, t^0} CH_3OC_2H_5 + H_2O$</p> <p>Có $n_Y = x = 0,2$ mol; $n_Z = y = 0,1$ mol</p> <p>$n_{Y(\text{pur})} = 0,2 \cdot 50\% = 0,1$ mol; $n_{Z(\text{pur})} = a$ mol</p> <p>$\Rightarrow n_{H_2O} = (0,1 + a)/2$ mol</p> <p>BTKL cho các phản ứng tạo ete: $32 \cdot 0,1 + 46 \cdot a = 4,52 + 18 \cdot (0,1 + a)/2$</p> <p>$\Rightarrow a = 0,06$</p> <p>$\frac{0,06}{0,1} \cdot 100\% = 60\%$</p> <p>Vậy $H\%(C_2H_5OH) =$</p>	

Câu V (4,0 điểm).

1. Viết các phương trình hóa học (các chất hữu cơ viết bằng công thức cấu tạo) theo sơ đồ sau:



2. Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ mạch hở A và B (phân tử chỉ chứa C, H, O). Phân tử A và B đều có số nguyên tử hiđro gấp đôi số nguyên tử cacbon. Nếu lấy cùng số mol A hoặc B phản ứng hết với Na thì đều thu được V lít H₂. Còn nếu lấy số mol A hoặc B như trên cho phản ứng hết với H₂ thì cần vừa đủ 2V lít (các thể tích khí đo

uigeli.xyz

Trang 81

<p>→ $R + 46 = 74 \rightarrow R = 28 \rightarrow -R-$ là $-C_2H_4-$ → Công thức cấu tạo của A: $HO - CH_2 - CH_2 - CHO$ hoặc $CH_3 - CH(OH) - CHO$ Công thức cấu tạo của B: $CH_2 = CH - CH_2 - OH$</p>	
--	--

Ghi chú: Đối với các bài toán, Học sinh giải theo cách khác, nếu đúng vẫn đạt điểm tối đa của bài toán đó.

-----HẾT-----

**SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN**

**ĐỀ THAM KHẢO OLYMPIC
MÔN HÓA KHỐI 11
THỜI GIAN: 150 phút**

Câu 1:

- Có 25gam dung dịch bão hòa muối sunfat của một kim loại có hóa trị II ngậm nước. Khi hạ nhiệt độ từ $80^\circ C$ xuống $25^\circ C$ thì có 8,9gam tinh thể muối ngậm nước này kết tinh(kết tủa). Tìm công thức phân tử của muối ngậm nước biết rằng ở $80^\circ C$ và ở $25^\circ C$ độ hòa tan của muối lần lượt là: 53,6 và 23.
- Cho dung dịch chứa Cl^- có nồng độ 0,1M và CrO_4^{2-} nồng độ $10^{-4}M$. Thêm từ từ dung dịch $AgNO_3$ vào. Hỏi kết tủa $AgCl$ hay Ag_2CrO_4 xuất hiện trước và khi kết tủa thứ hai bắt đầu xuất hiện thì tỉ lệ nồng độ các ion Cl^- và CrO_4^{2-} bằng bao nhiêu? Có thể dùng Ag^+ để kết tủa phân đoạn Cl^- và CrO_4^{2-} được hay không?
Biết nồng độ từ $10^{-6}M$ trở xuống coi như ion đó được tách hết. Cho $T_{AgCl} = 10^{-10}$ và $T_{Ag_2SO_4} = 10^{-12}$.

Câu 2:

- Có 5 lọ được đánh số, mỗi lọ chứa một trong các dung dịch sau: natri sunfat; canxi axetat; nhôm sunfat; natri hidroxit; bari clorua.
 - Rót từ từ lọ (4) vào lọ (3) có kết tủa trắng.
 - Rót dung dịch từ lọ (2) vào lọ (1) có kết tủa keo, tiếp tục rót thêm thì kết tủa đó bị tan.
 - Rót dung dịch lọ (4) vào lọ (5), ban đầu chưa có kết tủa, rót thêm thì có lượng nhỏ kết tủa xuất hiện.

Cho biết hóa chất nào trong từng lọ đã đánh số. Viết phương trình minh họa.

- Trình bày phương pháp nhận biết các anion có trong dung dịch hỗn hợp gồm: $NaNO_3$, Na_2SO_4 , Na_2SO_3 và Na_2CO_3 .
- Hỗn hợp A gồm 3 kim loại Mg, Zn, Al. Hòa tan hoàn toàn 7,539gam A bằng dung dịch HNO_3 thu được dung dịch B và hỗn hợp khí D gồm NO và N_2O . Thu khí D vào bình dung tích 3,20lit (không đổi) có chứa sẵn N_2 ở $0^\circ C$ và 0,23atm thì nhiệt độ trong bình tăng lên đến $27,3^\circ C$, áp suất tăng lên đến 1,10atm và khối lượng bình tăng thêm 3,720gam.
Cho 7,539gam gam A vào bình đựng 1,0 lít dung dịch KOH 2,0M đến khi phản ứng hoàn toàn, lọc bỏ phần không tan thì khối lượng dung dịch tăng thêm 5,718gam. Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong A.

Câu 3:

1. Hợp chất hữu cơ X có cấu tạo không vòng có công thức phân tử C_4H_7Cl và có cấu hình E. Cho X tác dụng với NaOH trong điều kiện đun nóng thu được hỗn hợp sản phẩm bên có cùng công thức phân tử C_4H_8O . Xác định cấu trúc có thể có của X.

2. Trình bày cơ chế và cho biết sản phẩm tạo thành khi hidrat hóa ciclobutylene trong dung dịch H_2SO_4 loãng.

3. Một hidrocarbon (A) mạch hở có tỉ khối so với không khí bằng 2,759.

a. Tìm công thức phân tử của A.

b. Tìm công thức cấu tạo đúng của A, biết khi cho một mol A tác dụng với dung dịch $KMnO_4$ trong dung dịch H_2SO_4 thu được 2mol CO_2 và 2mol $HOOC-COOH$.

c. A có đồng phân hình học không? Biểu thị đồng phân hình học (nếu có) và gọi tên.

Câu 4: Cho 2,76g chất hữu cơ X (chứa C, H, O) có công thức phân tử trùng công thức đơn giản. Cho X tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó đem cô cạn thì phần bay hơi chỉ có hơi nước và chất rắn còn lại chứa hai muối natri chiếm khối lượng 4,44gam. Nung hai muối này trong oxi dư, phản ứng hoàn toàn thu được 3,18gam Na_2CO_3 ; 2,464lit CO_2 (đkc) và 0,9gam nước. Tìm công thức cấu tạo của X..

Câu 5: Hỗn hợp khí A gồm etan và propan.

a. Đốt cháy một ít hỗn hợp A thu được khí CO_2 và hơi nước theo tỉ lệ thể tích 11:15. Tính phần trăm về thể tích mỗi chất trong hỗn hợp A.

b. Đun nóng một ít hỗn hợp A trong một bình kín có mặt xúc tác thích hợp để thực hiện phản ứng dehidro hóa (tách một phân tử H_2). Sau phản ứng thu được hỗn khí B có tỉ khối so với hidro là 13,5.

+ Tính hiệu suất phản ứng dehidro hóa, biết rằng sản phẩm phản ứng chỉ có olefin và hidro; etan và propan bị dehidro hóa với hiệu suất như nhau.

+ Tách hỗn hợp olefin từ hỗn hợp B và hidrat hóa chúng khi có mặt axit H_2SO_4 loãng thu được hỗn hợp ancol C. Lấy m gam hỗn hợp ancol C cho tác dụng hết với Na thấy bay ra 448ml khí (đkc). Oxihoa m gam hỗn hợp ancol C bằng O_2 không khí ở nhiệt độ cao và có xúc tác Cu được hỗn hợp sản phẩm D. Cho D tác dụng với $AgNO_3$ trong NH_3 dư thu được 2,806gam bạc kim loại.

Tính phần trăm số mol các ancol trong hỗn hợp C. Giả thuyết các phản ứng hidrat hóa olefin và phản ứng oxihoa ancol xảy ra với hiệu suất 100%, D chỉ gồm andehit và axeton.

TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN

ĐÁP ÁN THAM KHẢO OLYMPIC MÔN HÓA KHỐI 11 THỜI GIAN: 150 phút

Câu hỏi	Bài giải	Điểm
Câu 1 (4 điểm)	<p>1. Ở $80^\circ C$ khối lượng muối khan trong 25gam dung dịch 53,6.25</p> $100+53,6 = 8,72g$ <p>Ở $25^\circ C$ khối lượng dung dịch: $25-8,9=16,1g$</p> $\frac{23.16,1}{100+23} = 3,01g$ <p>Khối lượng muối khan tách ra ở dạng kết tinh ngậm nước là:</p> $8,72-3,01=5,71g$ <p>Công thức muối ngậm nước là $MSO_4.nH_2O$</p> $MSO_4.nH_2O \rightarrow MSO_4 + nH_2O$ $(M+96+18n)5,71 = 8,9(M+96)$	<p>0,25đ</p> <p>0,25đ</p> <p>0,25đ</p> <p>0,25đ</p> <p>0,25đ</p> <p>0,25đ</p> <p>0,25đ</p> <p>0,25đ</p>

	<p>$M=32n - 96$ chọn $n=5$ và $M=64(\text{Cu})$</p> <p>Công thức muối $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$</p> <p>2.</p> <p>a. Các phản ứng:</p> $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \rightleftharpoons \text{AgCl} \quad T_1 = 10^{-10}$ $2\text{Ag}^+ + \text{CrO}_4^{2-} \rightleftharpoons \text{Ag}_2\text{CrO}_4 \quad T_2 = 10^{-12}$ <p>Điều kiện để có kết tủa AgCl: $C_{\text{Ag}^+} \cdot C_{\text{Cl}^-} > T_1$</p> $\text{Suy ra } C_{\text{Ag}^+} > \frac{T_1}{C_{\text{Cl}^-}} = \frac{10^{-10}}{10^{-1}} = 10^{-9}$ <p>Điều kiện để có kết tủa Ag_2CrO_4: $C_{\text{Ag}^+}^2 \cdot C_{\text{CrO}_4^{2-}} > T_2$</p> $\text{Suy ra } C_{\text{Ag}^+} > \sqrt{\frac{T_2}{C_{\text{CrO}_4^{2-}}}} = \sqrt{\frac{10^{-12}}{10^{-4}}} = 10^{-4}$ <p>Vì $C_{\text{Ag}^+} > C_{\text{Ag}^+}$ nên AgCl kết tủa trước</p> <p>Theo quy luật tích số tan khi cả hai cùng kết tủa thì $[\text{Ag}^+].[\text{Cl}^-] = 10^{-10} (1)$ và $[\text{Ag}^+]^2. [\text{CrO}_4^{2-}] = 10^{-12} (2)$</p> $\frac{[\text{Cl}^-]}{\sqrt{[\text{CrO}_4^{2-}]}} = 10^{-4}$ <p>Chia (1) cho (2) $\sqrt{[\text{CrO}_4^{2-}]} = 10^{-4}$</p> <p>Khi CrO_4^{2-} bắt đầu kết tủa, $[\text{CrO}_4^{2-}] = 10^{-4}$ khi đó nồng độ của ion $\text{Cl}^- = 10^{-6}$.</p> <p>Có thể xem như trong dung dịch không còn ion Cl^-. Vậy có thể kết tủa phân đoạn phân đoạn Cl^- và CrO_4^{2-} bằng Ag^+</p>	<p>0,25đ</p> <p>0,25đ</p> <p>0,25đ</p> <p>0,25đ</p> <p>0,25đ</p> <p>0,25đ</p> <p>0,25đ</p>
<p>Câu 2</p> <p>4 điểm</p>	<p>1.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Lọ (2) chứa NaOH * Lọ (1) chứa $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ vì <p>Lúc đầu: $6\text{NaOH} + \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \rightarrow 2\text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{Na}_2\text{SO}_4$</p> <p>Rót thêm: $\text{NaOH} + \text{Al}(\text{OH})_3 \rightarrow \text{NaAlO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$</p> <ul style="list-style-type: none"> * Lọ (4) chứa Na_2SO_4 * Lọ (3) chứa BaCl_2 <p>$\text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{BaCl}_2 \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{BaSO}_4$</p> <ul style="list-style-type: none"> * Lọ (5) chứa $\text{Ca}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ <p>$\text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{Ca}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \rightarrow 2\text{CH}_3\text{COONa} + \text{CaSO}_4$ (ít tan)</p>	<p>0,125đ</p> <p>0, 125đ</p> <p>0, 125đ</p> <p>0, 125đ</p> <p>0, 125đ</p> <p>0,125đ</p> <p>0, 125đ</p>

	<p>2. Cho HCl thu khí SO₂, CO₂ dẫn qua bình 1 chứa Br₂ bình 2 chứa Br₂ dư rồi qua bình 3 chứa dd Ca(OH)₂ dư. dung dịch Br₂ mất màu nhận ra gốc SO₃²⁻ Làm đục dd Ca(OH)₂ nhận ra gốc CO₃²⁻ Cho dd BaCl₂ vào dung dịch thu được Xuất hiện kết tủa không tan nhận ra gốc SO₄²⁻ Dùng kim loại Cu cho vào nước lọc xuất hiện khí không màu hóa nâu trong không khí nhận ra gốc NO₃⁻ viết phương trình.</p> <p>3. Gọi x,y,z là số mol Mg, Zn, Al trong 7,539gam A $24,03x + 65,38y + 26,98z = 7,539$ Số mol N₂ = 0,03286mol Số mol sau khi thêm D = 0,14286mol $\Rightarrow$ số mol D = 0,11mol Số mol NO = 0,08mol Số mol N₂O = 0,03mol Lập phương trình: $2x + 2y + 3z = 0,48$ Cho A vào KOH $\text{Zn} + 2\text{KOH} \rightarrow \text{K}_2\text{ZnO}_2 + \text{H}_2$ $2\text{Al} + 2\text{KOH} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{KAlO}_2 + 3\text{H}_2$ Biện luận và kết luận KOH dư Độ tăng khối lượng dung dịch $(65,38 - 2,016)y + (26,98 - 3,024)z = 5,718$ Tìm x = 0,06; y = 0,06; z = 0,08 %Mg = 19,34%; %Zn = 52,03%; %Al = 28,63%</p>	<p>0,125đ 0,125đ 0,125đ 0,125đ 0,125đ 0,125đ 0,5đ</p> <p>0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ</p>
<p>Câu 3</p>	<p>1. Đồng vị cấu trúc E thì C₄H₇Cl có 3 cấu trúc</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{C} = \text{C} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{H} \quad \text{CH}_2\text{Cl} \end{array}$ <p>(1)</p> </div> <div style="text-align: center;"> $\begin{array}{c} \text{C}_2\text{H}_5 \quad \text{H} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{C} = \text{C} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{Cl} \quad \text{H} \end{array}$ <p>(2)</p> </div> <div style="text-align: center;"> $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \quad \text{H} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{C} = \text{C} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{Cl} \quad \text{H} \end{array}$ <p>(3)</p> </div> </div> <p>X + dung dịch NaOH, t^oc thu được hỗn hợp sản phẩm bền</p> <p>Vậy cấu trúc của X là :</p> <div style="text-align: center;"> $\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} \quad \text{H} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{C} = \text{C} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{H} \quad \text{CH}_2\text{Cl} \end{array}$ </div> <p>2.</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center;"> $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{CH} \end{array}$ </div> <div style="margin: 0 10px;">+</div> <div style="text-align: center;"> $\text{CH}=\text{CH}_2$ </div> <div style="margin: 0 10px;">+</div> <div style="text-align: center;"> $\text{CH}-\text{CH}_3$ </div> <div style="margin: 0 10px;">→</div> <div style="text-align: center;"> $\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2$ </div> </div> <p>CH₃ + H₂O $\xrightarrow{-H^+}$ $\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$</p>	<p>0,25đ. 4 công thức</p> <p>0,25đ. 4 gđ</p>

	Có hai dạng cis- 2-methylcyclopentanol và trans- 2-methylcyclopentanol	
	3. a. Đặt CTPT của (A) là C_xH_y , với x,y nguyên dương $y \leq 2x+2$, y chẵn. $M_A = 12x+y=2,759.29=80$ $0 < y = 80-12x \leq 2x+2 \Rightarrow 5,6 \leq x \leq 6,7 \Rightarrow x=6, y=8$ CTPT C_6H_8 b. CTCT: $CH_2=CH-CH=CH-CH=CH_2$ c. Có đồng phân hình học Viết đồng phân cis cis- hexa-1,3,5-trien Đồng phân trans cis- hexa-1,3,5-trien	0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ
Câu 4	Tìm công thức cấu tạo của X.. -Số mol $Na_2CO_3 = 0,03mol$ Số mol $CO_2 = 0,1mol$ Số mol $H_2O = 0,05mol$ Số mol $NaOH$ phản ứng $= 0,06mol$ $\Rightarrow$ số mol $H_2O = 0,04mol$ $2,76(g)Y + 0,06mol NaOH \rightarrow$ hai muối + $0,04mol H_2O$ Số mol H trong Y + $0,06 = 0,1+0,08$ Đặt công thức của X: $C_xH_yO_z$ Tìm được $n_C=0,14$; $n_H=0,12$; $n_O=0,06$ $x:y:z=7:6:3$ CTPT: $C_7H_6O_3$ có $M=138$ Số mol X = $0,02mol$, số mol $NaOH = 0,06mol$ CTCT: $HO-C_6H_4-O-CH=O$	0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ
Câu 5	1 Gọi x,y là số mol C_2H_6, C_3H_8 trong A $C_2H_6 + 3,5O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$ $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$ Tìm được $y=3x$ $\% C_2H_6=25\%$; $\% C_3H_8=75\%$	0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ
	2 a. Gọi a là số mol ban đầu của C_2H_6 , h là hiệu suất $C_2H_6 \xrightarrow{xt, t^{oc}} C_2H_4 + H_2$ $C_3H_8 \xrightarrow{xt, t^{oc}} C_3H_6 + H_2$ Có $n_A = a + 3a = 4a$ Số mol B = $4a + 4ah = 4a(1+h)$ BTKL: $m_A = m_B = 30a + 44.3a = 162a$ $M_B = \frac{162a}{4a(1+h)} = 13,5.2 = 27 \Rightarrow h=0,5 (50\%)$ b. Xét phản ứng cộng vào H_2O và olefin $C_2H_4 + H_2O \xrightarrow{xt, t^{oc}} C_2H_5OH (x \text{ mol})$	0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ

$\text{C}_3\text{H}_6 + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{xt, t^{oc}} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH} \text{ (y mol)}$ $\text{C}_3\text{H}_6 + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{xt, t^{oc}} \text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3 \text{ (z mol)}$ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{Na} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{ONa} + 0,5\text{H}_2$ $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH} + \text{Na} \rightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{ONa} + 0,5\text{H}_2$ $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3 + \text{Na} \rightarrow \text{CH}_3\text{CH}(\text{ONa})\text{CH}_3 + 0,5\text{H}_2$ $0,5(x+y+z) = 0,02$ <p>Cho tác dụng với O_2/Cu</p> $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 0,5\text{O}_2 \xrightarrow{xt, t^{oc}} \text{CH}_3\text{CHO} + \text{H}_2\text{O}$ $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH} + 0,5\text{O}_2 \xrightarrow{xt, t^{oc}} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO} + \text{H}_2\text{O}$ $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3 + 0,5\text{O}_2 \xrightarrow{xt, t^{oc}} (\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{O} + \text{H}_2\text{O}$ <p>Tác dụng dd $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$</p> $\text{CH}_3\text{CHO} + 2\text{AgNO}_3 + 3\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CH}_3\text{COONH}_4 + 2\text{NH}_4\text{NO}_3 + 2\text{Ag}$ $\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO} + 2\text{AgNO}_3 + 3\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{COONH}_4 + 2\text{NH}_4\text{NO}_3 + 2\text{Ag}$ $2x+2z = 0,026$ <p>Tìm được $x=0,01 \Rightarrow \% \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}=25\%$ $y=0,027 \Rightarrow \% (\text{CH}_3)_2\text{CHOH}=67,5\%$ $z=0,003 \Rightarrow \% \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}=7,5\%$</p>	<p>0,25đ</p> <p>0,25đ</p> <p>0,25đ</p> <p>0,25đ</p> <p>0,25đ</p>
---	---

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN

ĐỀ THI OLYMPIC
MÔN: HÓA 11
THỜI GIAN: 180

PHÚT

Câu I: (4 điểm)

1.1 Hoàn thành các phản ứng sau:

- a. $\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{D} + \text{H}_2\text{O}$ b. $\text{A} + \text{E} \rightarrow \text{F} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
c. $\text{A} + \text{G} \rightarrow \text{H} \downarrow + \text{B} + \text{H}_2\text{O}$ d. $\text{A} + \text{I} \rightarrow \text{D} + \text{J} + \text{H}_2\text{O}$
e. $\text{A} \rightarrow \text{D} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ f. $\text{A} + \text{K} \rightarrow \text{L} + \text{M} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

Biết A là hợp chất của Na.

1.2. Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết 5 dung dịch muối sau chỉ dùng một thuốc thử: dd NaCl; dd AlCl₃; dd FeCl₃; dd CuCl₂; dd ZnCl₂.

1.3. Từ quặng photphoric và các điều kiện có đủ, viết phương trình phản ứng điều chế: P, suppephotphat đơn và suppe photphat kép. Tính độ dinh dưỡng của suppe photphat kép.

Câu II. (4,0 điểm)

1. Nêu hiện tượng và viết phương trình ion rút gọn (nếu có) cho các thí nghiệm sau:

a/ Cho từ từ đến dư dung dịch NH₃ vào dung dịch chứa hỗn hợp FeCl₃ và CuSO₄.

b/ Cho từ từ đến dư dung dịch KHSO₄ vào dung dịch chứa hỗn hợp NaAlO₂ và Na₂CO₃.

c/ Cho dung dịch $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ vào dung dịch HCl 1M, đun nóng nhẹ.

d/ Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch K_2HPO_3 .

2. Hỗn hợp bột A gồm Al và Mg được hoà tan hoàn toàn trong dung dịch HNO_3 , làm tạo thành dung dịch B chứa 3 muối và không có khí thoát ra. Cho tiếp dung dịch NaOH vào dung dịch B rồi lọc tách kết tủa C tạo thành, thu được dung dịch D có chứa 2 muối. Nung C đến khối lượng không đổi được chất rắn E chỉ gồm 2 oxit.

Viết các phương trình dưới dạng ion biểu diễn những quá trình trên .

Câu III. (4,0 điểm)

1. Hoà tan m gam NH_4HCO_3 vào 120 ml dung dịch HCl 0,25 M thấy thoát ra V lit khí (đktc). Phản ứng xong, đổ lượng dư dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$ vào dung dịch tạo thành, được a gam kết tủa. Mặt khác khi đun nóng nhẹ m gam NH_4HCO_3 với lượng dư dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ thì sau khi phản ứng kết thúc thu được 1 dung dịch có khối lượng nhỏ hơn khối lượng của dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ đã dùng là 6,75 gam. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lượng nước bị bay hơi trong quá trình thí nghiệm là không đáng kể. Hãy xác định m, a, V. (3,0 điểm)

2. Cho cân bằng $\text{HCOOH} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCOO}^-$

Hòa tan 9,2 gam HCOOH vào trong nước pha loãng thành 500 ml (dung dịch A).

a/ Tính độ điện li của axit HCOOH trong dung dịch A, biết $\text{pH}_A = 2$.

b/ Tính hằng số phân li của axit HCOOH .

c/ Cần pha thêm bao nhiêu ml dung dịch HCl có $\text{pH} = 1$ vào 100,00 ml dung dịch A để độ điện li giảm 20%

d/ Nếu thêm 0,4 gam NaOH vào 50 ml dung dịch A, sau đó cho quỳ tím vào thì màu quỳ tím biến đổi như thế nào? Tính pH của dung dịch sau phản ứng.

Câu IV: (4 điểm)

Cho các chất hữu cơ mạch hở sau: $\text{C}_2\text{H}_2\text{ClBr}$, $\text{CH}_3\text{CH}=\text{C}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{Cl}$, $\text{C}_3\text{H}_2\text{Cl}_4$.

Biểu diễn các dạng đồng phân hình học của chúng và gọi tên.

Từ CH_4 và các hợp chất vô cơ không chứa Cacbon, hãy viết các phương trình phản ứng điều chế poli(butadien- stiren), ghi đầy đủ tác nhân và điều kiện phản ứng.

Câu V: (4 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn 11,7 gam chất hữu cơ X rồi dẫn hỗn hợp sản phẩm qua bình đựng dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$. Sau khi phản ứng kết thúc, thấy xuất hiện 40 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, cân lại bình thấy khối lượng bình tăng 7,7 gam. Đun nước lọc trong bình thấy xuất hiện thêm 25 gam kết tủa nữa.

Tìm CTPT của X biết $35 < d_{X/\text{H}_2} < 40$.

Cho toàn bộ lượng X ở trên tác dụng hoàn toàn với dung dịch $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{OH}$ dư thu được 43,8 gam kết tủa. Xác định CTCT có thể có của X.




Chất hữu cơ Y mạch hở có công thức đơn giản trùng với công thức đơn giản của X. Lấy cùng khối lượng của X và Y đem phản ứng với Br₂ dư thì lượng brom phản ứng với Y gấp 1,125 lần so với lượng brom phản ứng với X. Cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định CTCT của Y

Cho biết: Ag = 108; Ba = 137; Br = 80; C = 12; Fe = 56; H = 1; N = 14; O = 16; ; P = 31; S = 32; Ca = 40; Mg = 24, Al = 27; Zn = 65 ; As = 75.

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN

Đáp án đề thi Olympic hóa 11 - năm học 2015- 2016

1.1 Hoàn thành các phản ứng sau:



Biết A là hợp chất của Na.

1.2 Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết 5 dung dịch muối sau chỉ dùng một thuốc thử: dd NaCl; dd AlCl₃; dd FeCl₃; dd CuCl₂; dd ZnCl₂.

1.3. Từ quặng photphoric và các điều kiện có đủ, viết phương trình phản ứng điều chế: P, suppephotphat đơn và suppe photphat kép. Tính độ dinh dưỡng của suppe photphat kép.

Câu II. (4,0 điểm)

Câu 1	HƯỚNG DẪN CHẤM	Điểm																		
1.1 1.5đ	<p>a. $\text{NaHCO}_3 + \text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ A B D</p> <p>b. $\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ E F</p> <p>c. $\text{NaHCO}_3 + \text{Ba(OH)}_2 \rightarrow \text{BaCO}_3 + \text{NaOH} + \text{H}_2\text{O}$ G H</p> <p>d. $2\text{NaHCO}_3 + 2\text{KOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{K}_2\text{CO}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$ I J</p> <p>e. $2\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$</p> <p>f. $2\text{NaHCO}_3 + 2\text{KHSO}_4 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{K}_2\text{SO}_4 + 2\text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ K L M</p> <p>Học sinh không cần xác định A, B, D.....</p>	0,2 5đ 0,2 5đ 0,2 5đ 0,2 5đ 0,2 5đ 0,2 5đ																		
1.2 2đ	<table><tr><td></td><td>NaCl</td><td>AlCl₃</td><td>FeCl₃</td><td>CuCl₂</td><td>ZnCl₂</td></tr><tr><td>Dd NH₃</td><td>-</td><td>Kết tủa trắng</td><td>Kết tủa nâu đỏ</td><td>Kết tủa xanh</td><td>Kết tủa trắng</td></tr><tr><td>Dd NH₃ dư</td><td>1</td><td>Không tan</td><td>2</td><td>3</td><td>Tan (4)</td></tr></table> <p>Các phương trình: $\text{AlCl}_3 + 3\text{NH}_3 + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Al(OH)}_3 + 3\text{NH}_4\text{Cl}$ $\text{FeCl}_3 + 3\text{NH}_3 + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Fe(OH)}_3 + 3\text{NH}_4\text{Cl}$ $\text{CuCl}_2 + 2\text{NH}_3 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Cu(OH)}_2 + 2\text{NH}_4\text{Cl}$ $\text{ZnCl}_2 + 2\text{NH}_3 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Zn(OH)}_2 + 2\text{NH}_4\text{Cl}$ $\text{Zn(OH)}_2 + 4\text{NH}_3 \rightarrow \text{Zn(NH}_3)_4(\text{OH})_2$ Dùng thuốc thử khác không cho điểm</p>		NaCl	AlCl ₃	FeCl ₃	CuCl ₂	ZnCl ₂	Dd NH ₃	-	Kết tủa trắng	Kết tủa nâu đỏ	Kết tủa xanh	Kết tủa trắng	Dd NH ₃ dư	1	Không tan	2	3	Tan (4)	1,0 đ 0,2 5đ 0,2 5đ 0,2 5đ 0,2 5đ
	NaCl	AlCl ₃	FeCl ₃	CuCl ₂	ZnCl ₂															
Dd NH ₃	-	Kết tủa trắng	Kết tủa nâu đỏ	Kết tủa xanh	Kết tủa trắng															
Dd NH ₃ dư	1	Không tan	2	3	Tan (4)															
1.3 1.5đ	<p>Các phản ứng điều chế:</p> $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + \text{SiO}_2 + 2\text{C} \xrightarrow{\text{t}^\circ} 3\text{CaSiO}_3 + 2\text{CO} + 2\text{P}$ $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \text{ đ} \rightarrow \text{Ca(H}_2\text{PO}_4)_2 + 2\text{CaSO}_4$ $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 \text{ đ} \rightarrow 2\text{H}_3\text{PO}_4 + 3\text{CaSO}_4$ $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + 4\text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow 3\text{Ca(H}_2\text{PO}_4)_2$ <p>Supephotphat kép $\text{Ca(H}_2\text{PO}_4)_2 \rightarrow \text{P}_2\text{O}_5$ 234 </p>																			

1. Nêu hiện tượng và viết phương trình ion rút gọn (nếu có) cho các thí nghiệm sau:

- a/ Cho từ từ đến dư dung dịch NH_3 vào dung dịch chứa hỗn hợp FeCl_3 và CuSO_4 .
 b/ Cho từ từ đến dư dung dịch KHSO_4 vào dung dịch chứa hỗn hợp NaAlO_2 và Na_2CO_3 .
 c/ Cho dung dịch $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ vào dung dịch HCl 1M, đun nóng nhẹ.
 d/ Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch K_2HPO_3 .

2. Hỗn hợp bột A gồm Al và Mg được hoà tan hoàn toàn trong dung dịch HNO_3 , làm tạo thành dung dịch B chứa 3 muối và không có khí thoát ra. Cho tiếp dung dịch NaOH vào dung dịch B rồi lọc tách kết tủa C tạo thành, thu được dung dịch D có chứa 2 muối. Nung C đến khối lượng không đổi được chất rắn E chỉ gồm 2 oxit. Viết các phương trình dưới dạng ion biểu diễn những quá trình trên .

Câu 2	HƯỚNG DẪN CHẤM	Điểm
2.1 2.0đ	<p>a/ Trong dung dịch FeCl_3 và CuSO_4 có các ion : Fe^{3+}, Cu^{2+} Dung dịch NH_3 có cân bằng: $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$ Khi cho dung dịch NH_3 vào dung dịch FeCl_3 và CuSO_4 - Có kết tủa nâu, kết tủa xanh do pư: $\text{Fe}^{3+} + 3\text{OH}^- \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{OH})_3$ nâu đỏ $\text{Cu}^{2+} + 2\text{OH}^- \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{OH})_2$ xanh Sau kết tủa xanh $\text{Cu}(\text{OH})_2$ tự hoà tan trong dd NH_3 dư do phản ứng : $\text{Cu}(\text{OH})_2 + 4\text{NH}_3 \rightleftharpoons [\text{Cu}(\text{NH}_4)_4](\text{OH})_2$ dung dịch màu xanh đậm</p> <p>b/ Trong dung dịch chứa NaAlO_2 và Na_2CO_3 có các cân bằng</p> $\text{AlO}_2^- + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Al}(\text{OH})_3 + \text{OH}^- \quad (1)$ $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{OH}^- \quad (2)$ $\text{HCO}_3^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 + \text{OH}^- \quad (3)$ <p>Trong dung dịch KHSO_4 có cân bằng $\text{HSO}_4^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{SO}_4^{2-} + \text{H}_3\text{O}^+$ Khi cho đến dư dd H_2SO_4 và dd chứa NaAlO_2 và Na_2CO_3 làm dịch chuyển các cân bằng (1) và (3) sang phải có các hiện tượng : - Có khí thoát ra (khí CO_2) - Có kết tủa keo ($\text{Al}(\text{OH})_3$) Nếu dư KHSO_4 thì $\text{Al}(\text{OH})_3$ sẽ bị hoà tan</p> <p>c/ Trong dung dịch chứa $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ và HCl: Fe^{2+} bị oxi hóa bởi NO_3^-/H^+ nên sau khi phản ứng dung dịch có màu vàng và có khí không màu hóa nâu trong không khí bay ra. $3\text{Fe}^{2+} + \text{NO}_3^- + 4\text{H}^+ \rightarrow 3\text{Fe}^{3+} + \text{NO} + 3\text{H}_2\text{O}$</p> <p>d/ K_2HPO_3 là muối trung hòa nên khi cho NaOH vào dung dịch K_2HPO_3 không</p>	<p>0,2 5đ</p> <p>0,2 5đ</p> <p>0,2 5đ</p> <p>0,2 5đ</p> <p>0,2 5đ</p> <p>0,2 5đ</p> <p>0,2 5đ</p> <p>0,2 5đ</p> <p>0,5 đ</p>
2.2	2. 2,0 điểm	

2đ	$8\text{Al} + 30\text{H}^+ + 3\text{NO}_3^- \rightarrow 8\text{Al}^{3+} + 3\text{NH}_4^+ + 9\text{H}_2\text{O}$ (1)	0,5 đ
	$4\text{Mg} + 10\text{H}^+ + \text{NO}_3^- \rightarrow 4\text{Mg}^{2+} + \text{NH}_4^+ + 3\text{H}_2\text{O}$ (2)	
	- Thêm dd kiềm NaOH:	
	$\text{NH}_4^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{NH}_3$ (3)	
	$\text{Al}^{3+} + 3\text{OH}^- \rightarrow \text{Al}(\text{OH})_3$ (4)	
	$\text{Mg}^{2+} + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{Mg}(\text{OH})_2$ (5)	0,5 đ
	$\text{Al}(\text{OH})_3$ tan 1 phần	
	$\text{Al}(\text{OH})_3 + \text{OH}^- \rightarrow \text{AlO}_2^- + 2\text{H}_2\text{O}$ (6)	
	- Nung kết tủa C:	0,2 đ
	$2\text{Al}(\text{OH})_3 \xrightarrow{t_0} \text{Al}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ (8)	5đ
	$\text{Mg}(\text{OH})_2 \xrightarrow{t_0} \text{MgO} + \text{H}_2\text{O}$ (9)	0,2 đ
	Dung dịch D gồm 2 muối: NaNO_3 , NaAlO_2	0,2 đ
		5đ
		0,2 đ
		5đ
		0,2 đ
		5đ

Câu III. (4,0 điểm)

1. Hoà tan m gam NH_4HCO_3 vào 120 ml dung dịch HCl 0,25 M thấy thoát ra V lit khí (đktc). Phản ứng xong, đổ lượng dư dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$ vào dung dịch tạo thành, được a gam kết tủa. Mặt khác khi đun nóng nhẹ m gam NH_4HCO_3 với lượng dư dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ thì sau khi phản ứng kết thúc thu được 1 dung dịch có khối lượng nhỏ hơn khối lượng của dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ đã dùng là 6,75 gam. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lượng nước bị bay hơi trong quá trình thí nghiệm là không đáng kể. Hãy xác định m, a, V. (3,0 điểm)

2. Cho cân bằng $\text{HCOOH} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCOO}^-$

Hòa tan 9,2 gam HCOOH vào trong nước pha loãng thành 500 ml (dung dịch A).

a/ Tính độ điện li của axit HCOOH trong dung dịch A, biết $\text{pH}_A = 2$.

b/ Tính hằng số phân li của axit HCOOH .

c/ Cần pha thêm bao nhiêu ml dung dịch HCl có $\text{pH} = 1$ vào 100,00 ml dung dịch A để độ điện li giảm 20%

d/ Nếu thêm 0,4 gam NaOH vào 50 ml dung dịch A, sau đó cho quỳ tím vào thì màu quỳ tím biến đổi như thế nào? Tính pH của dung dịch sau phản ứng.









Câu 3	HƯỚNG DẪN CHẤM	Điểm
3.1	Khi cho dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$ vào thấy kết tủa nên NH_4HCO_3 dư, HCl hết	0,2 đ
1.5đ	$\text{NH}_4\text{HCO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ 0,03 mol ,03 mol 0,03 mol	
	V = V_{CO2} = 0,03. 22,4 = 0,672 lít	0,2 đ
	$\text{HCO}_3^- + \text{Ca}^{2+} + \text{OH}^- \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ x-0,03 x-0,03	
	$\text{NH}_4\text{HCO}_3 + \text{Ba}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{NH}_3 + \text{BaCO}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$ x x x	0,2 đ
	Gọi số mol của NH_4HCO_3 ban đầu là x mol	
	$m_{\text{BaCO}_3} + m_{\text{NH}_3} - m_{\text{NH}_4\text{HCO}_3} = m \text{ dd giảm}$	0,2 đ
	$197x + 17x - 79x = 6,75$	
	$\rightarrow x = 0,05 \text{ mol}$	0,2 đ
	$m_{(\text{NH}_4\text{HCO}_3)} = 0,05.79 = \mathbf{3,95 \text{ gam} = m}$	
	$m_{\text{CaCO}_3} = 0,02. 100 = \mathbf{2 \text{ gam} = a}$	5đ
		0,2

Câu IV: (4 điểm)

Cho các chất hữu cơ mạch hở sau: C_2H_2ClBr , $CH_3CH=C(CH_3)CH_2Cl$, $C_3H_2Cl_4$.

Biểu diễn các dạng đồng phân hình học của chúng và gọi tên.

Từ CH_4 và các hợp chất vô cơ không chứa Cacbon, hãy viết các phương trình phản ứng điều chế poli(butađien- stiren), ghi đầy đủ tác nhân và điều kiện phản ứng.

Câu 4	HƯỚNG DẪN CHẤM	Điểm
4.1 2.0đ	<p>1.(2 điểm) Biểu diễn các dạng đồng phân hình học :</p> <p>C_2H_2ClBr:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>cis-1-brom-2-clo eten</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>trans-1-brom-2-clo eten</p> </div> </div> <p>$CH_3CH=C(CH_3)CH_2Cl$</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>cis-1-clo-2-metyl but-2-en</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>trans-1-clo-2-metyl but-2-en</p> </div> </div> <p>$C_3H_2Cl_4$: có 2 chất có đồng phân hình học CCl_3-CHCl_2</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>cis-1,3,3,3- tetraclo propen</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>trans-1,3,3,3-tetraclo propen</p> </div> </div> <p>0,5 điểm)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>cis-1,2,3,3- tetraclo propen</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>trans-1,2,3,3-tetraclo propen</p> </div> </div>	<p>0,5 đ</p> <p>0,5 đ</p> <p>0,5 đ</p> <p>0,5 đ</p>
4.2 2đ	<p>Từ CH_4 và các hợp chất vô cơ không chứa Cacbon, hãy viết các phương trình phản ứng điều chế poli(butađien- stiren), ghi đầy đủ tác nhân và điều kiện phản ứng.</p> $2CH_4 \xrightarrow{1500^{\circ}C, LLN} C_2H_2 + 3H_2$ $3C_2H_2 \xrightarrow{C, 600^{\circ}C} C_6H_6$	<p>0,2</p> <p>5đ</p> <p>*8 =</p> <p>2.0</p>

	<p>Số mol kết tuả = số mol X = 0,15 $\Rightarrow M_{kt} = 43,8 : 0,15 = 292$</p> <p>Đặt CTPT của kết tuả là $C_6H_{6-x}Ag_x \Rightarrow M = 78 + 107x = 292 \Rightarrow x = 2 \Rightarrow X$ có 2 liên kết ba đầu mạch</p> <p>Vậy CTCT của X là : $CH \equiv C - CH_2 - CH_2 - C \equiv CH$ hoặc $CH \equiv C - CH(CH_3) - C \equiv CH$</p>	<p>5đ</p> <p>0,2 5đ</p> <p>0,2 5đ 0,2 5đ</p>
4.3 1.5đ	<p>Đặt CTPT của Y là $(CH)_m$</p> $\text{Số liên kết } \pi \text{ của Y} = \frac{2m+2-m}{2} = \frac{m+2}{2}$ <p>Lấy khối lượng của X và Y là 78 $\Rightarrow$ số mol của X = 1 mol; số mol của</p> $Y = \frac{78}{13m}$ <p>Ptpư : $C_6H_6 + 4Br_2 \rightarrow C_6H_6Br_4$ $1\text{mol} \rightarrow 4\text{mol}$</p> $(CH)_m + \frac{m+2}{2} Br_2 \rightarrow C_mH_mBr_{m+2}$ $\frac{78}{13m} \rightarrow \frac{78}{13m} \cdot \left(\frac{m+2}{2} \right) \text{ mol}$ <p>Theo bài ra : $\frac{78}{13m} \cdot \left(\frac{m+2}{2} \right) = 1,125 \cdot 4 = 4,5 \Rightarrow m = 4$</p> <p>CTPT của Y là C_4H_4, CTCT của Y : $CH \equiv C - CH = CH_2$</p>	<p>0,2 5đ</p> <p>0,2 5đ</p> <p>0,2 5đ</p> <p>0,2 5đ</p> <p>0,2 5đ</p>

ĐỀ THI OLYMPIC ĐỀ NGHỊ HÓA 11 TRƯỜNG THPT KHÂM ĐỨC

Câu 1:

1.1.

a. Tính pH của dung dịch HCl nồng độ $0,5 \cdot 10^{-7}$ mol/l.

b. Tính pH của dung dịch X được tạo thành khi trộn 200ml dung dịch HA 0,1M ($K_a = 10^{-3,75}$) với 200ml dung dịch KOH 0,05M.

1.2. Cho khí CO_2 lội qua dung dịch gồm $Ba(OH)_2$ 0,1M và $Sr(OH)_2$ 0,1M.

Chất nào kết tủa trước? Khi muối thứ hai bắt đầu kết tủa thì nồng độ ion muối thứ nhất còn lại trong dung dịch là bao nhiêu? Cho biết $T_{BaCO_3} = 8,1 \cdot 10^{-9}$, $T_{SrCO_3} = 9,4 \cdot 10^{-10}$.

Câu 2:


2.1.

a. Giải thích hiện tượng “ma trời” tại các nghĩa địa.

b. Trộn đậm hai lá cũng như nước tiểu với vôi hoặc tro bếp đều bị mất đậm.

Giải thích bằng phương trình phản ứng.

2.2. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:



Biết A_1 là hợp chất của lưu huỳnh và 2 nguyên tố khác, khối lượng mol của A_1 là 51 gam.

2.3. Có 2 dung dịch: Dung dịch A chứa 0,2 mol Na_2CO_3 và 0,3 mol NaHCO_3 ; dung dịch B chứa 0,5 mol HCl. Người ta tiến hành thí nghiệm:

TN1: Rót từ từ dung dịch B vào dung dịch A.

TN2: Rót từ từ dung dịch A vào dung dịch B.

TN3: Trộn nhanh hai dung dịch với nhau.

Tính thể tích khí thoát ra ở mỗi thí nghiệm.

Câu 3:

3.1. Những chất nào dưới đây có thể tồn tại đồng phân lập thể? Hãy xác định cấu hình Z/E, Cis/Trans, R/S nếu có.

a. $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$

b. $\text{CH}_2\text{OH}-\text{CHOH}-\text{CHO}$

c. $\text{CH}_3\text{CBr}=\text{C}(\text{CH}_3)\text{C}_2\text{H}_5$



3.2. Hidrocacbon A có công thức tổng quát C_nH_{n+1} . Một mol A phản ứng vừa đủ với 4 mol H_2 hay 1 mol Br_2 trong dung dịch nước brom. Oxi hóa A thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có axit axetic. Xác định công thức cấu tạo của A và viết phương trình phản ứng của A với dung dịch brom, với HBr.

Câu 4:

4.1. Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết 5 dung dịch muối sau chỉ dùng một thuốc thử: dd NaCl; dd AlCl_3 ; dd FeCl_3 ; dd CuCl_2 ; dd ZnCl_2 .

4.2. Công thức phân tử chung của 3 chất hữu cơ (X), (Y), (T) đều có dạng $(\text{CH})_n$.

Biết rằng:



Xác định công thức cấu tạo của 3 chất (X), (Y), (T) và viết các phương trình phản ứng.

Câu 5: Hai hợp chất thơm A và B đều có công thức phân tử $\text{C}_n\text{H}_{2n-8}\text{O}_2$. Hơi B có khối lượng riêng 5,447 gam/lít (đktc). A có khả năng phản ứng với kim loại Na giải phóng H_2 và có phản ứng tráng gương. B phản ứng được với Na_2CO_3 giải phóng CO_2 .

a. Viết công thức cấu tạo của A và B.



b. A có 3 đồng phân là A_1 , A_2 , A_3 trong đó A_1 là đồng phân octho. Viết sơ đồ chuyển hóa o-crezol thành A_1 .

ĐÁP ÁN

Câu 1:

1.1.

a. Vì nồng độ của $\text{HCl} < 10^{-7}$ nên phải kể đến sự điện li của nước.



Trong dung dịch có: $\text{Cl}^- = 0,5 \cdot 10^{-7}$, $\text{H}^+ = x$, $\text{OH}^- = 10^{-14}/x$

Theo định luật bảo toàn điện tích ta có:

$$x = 0,5 \cdot 10^{-7} + 10^{-14}/x$$

$$\Rightarrow x = 1,28 \cdot 10^{-7} = [\text{H}^+]$$


$$\Rightarrow \text{pH} = 6,89$$

b. $\text{HA} + \text{KOH} \rightarrow \text{KA} + \text{H}_2\text{O}$

Dung dịch sau khi trộn có $V = 0,4$ lít gồm: $\text{KA} = 0,01$ mol, HA dư = $0,01$ mol.

$\Rightarrow$ Nồng độ của $\text{KA} = \text{HA}$ dư = $0,025\text{M}$.

Đây là dung dịch đệm axit.



$$K_a = \frac{a(0,025 + a)}{0,025 - a} \Rightarrow a = 1,7535 \cdot 10^{-4} = [\text{H}^+]$$

$$\Rightarrow \text{pH} = 3,76$$

1.2.

BaCO_3 kết tủa khi $[\text{CO}_3^{2-}] > T_{\text{BaCO}_3}/[\text{Ba}^{2+}] \Rightarrow [\text{CO}_3^{2-}] > 81 \cdot 10^{-9}$.

SrCO_3 kết tủa khi $[\text{CO}_3^{2-}] > T_{\text{SrCO}_3}/[\text{Sr}^{2+}] \Rightarrow [\text{CO}_3^{2-}] > 94 \cdot 10^{-10}$.

Vậy SrCO_3 kết tủa trước.

Khi BaCO_3 bắt đầu kết tủa thì lúc này $[\text{CO}_3^{2-}]$ trong dung dịch bước vào ngưỡng $81 \cdot 10^{-9}$ nên nồng độ ion Sr^{2+} lúc này là:

$$[\text{Sr}^{2+}] = T_{\text{SrCO}_3}/[\text{CO}_3^{2-}]_{\text{lúc này}} = 1,16 \cdot 10^{-2}\text{M}$$

Câu 2:

2.1.

a. Tại các nghĩa địa, khi xác chết bị thối rữa, photpho được giải phóng dưới dạng photphin PH_3 có lẫn diphotphin P_2H_4 . Diphotphin là chất lỏng, dễ bay hơi và tự bốc cháy ngoài không khí ở nhiệt độ thường làm cho PH_3 cháy theo:



Các phản ứng trên tỏa ra năng lượng dưới dạng ánh sáng. Do đó khi cháy, hỗn hợp ($\text{PH}_3 + \text{P}_2\text{H}_4$) hình thành ngọn lửa màu vàng sáng, bay đi động trên mặt đất lúc ẩn lúc hiện người ta gọi là "ma trời".

b. Đạm 2 lá (NH_4NO_3) khi trộn với vôi $\text{Ca}(\text{OH})_2$ hay tro bếp K_2CO_3 thì:





$\Rightarrow$ mất một lượng $\text{NH}_3 \Rightarrow$ mất đạm.

Tương tự trong nước tiểu có hàm lượng urê cao, vi sinh vật hoạt động chuyển urê thành $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$:



$(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ tác dụng với vôi hay tro bếp:











⇒ mất một lượng NH_3 ⇒ mất đậm.

2.2. Do khối lượng mol của S = 32 ⇒ Trong A chỉ có 1 nguyên tử S.





⇒ Phần còn lại của A có khối lượng = 51 - 32 = 19.

⇒ A có công thức: NH_4HS



2.3.

TN1: Rót từ từ dung dịch B vào dung dịch A thì phản ứng xảy ra theo thứ tự:







HCO_3^- dư nên CO_2 tính theo $H^+ = 0,3 \text{ mol}$

⇒ $V_{CO_2} = 6,72 \text{ lít}$.

TN2: Rót từ từ dung dịch A vào dung dịch B thì đồng thời cùng tiếp xúc với H^+ theo

tỉ lệ 3:2 nên







Ta có $3x + 4x = 0,5 \Rightarrow x = 1/14$

⇒ $n_{CO_2} = 5x = 5/14$

⇒ $V_{CO_2} = 8 \text{ lít}$

TN3: Trộn nhanh hai dung dịch với nhau


* Giả sử HCO_3^- phản ứng trước




CO_3^{2-} dư. ⇒ $n_{CO_2} = 0,3 + 0,1 = 0,4$

⇒ $V_{CO_2} = 8,96 \text{ lít}$

* Giả sử CO_3^{2-} phản ứng trước





$$\Rightarrow n_{\text{CO}_2} = 0,2 + 0,1 = 0,3$$


$$\Rightarrow V_{\text{CO}_2} = 6,72 \text{ lít}$$

Vì cả 2 muối cùng phản ứng nên $6,72 < V_{\text{CO}_2} < 8,96$.



Câu 3:

3.1.

a. Chất này có 4 đồng phân hình học:



b. Chất này có cacbon bất đối $\Rightarrow$ Có đồng phân quang học R/S



c. Chất này có đồng phân hình học dạng trans và cis hoặc tương ứng là dạng Z và E.



3.2. $A + 4 \text{ mol H}_2 \rightarrow$ A có 4 liên kết π .


$A + 1 \text{ mol Br}_2 \rightarrow$ A có 1 liên kết đôi ngoài vòng

$\Rightarrow$ A có số liên kết π + vòng = 5


$$\text{Từ công thức } C_nH_{n+1} \text{ ta có số liên kết } \pi + \text{vòng} = \frac{2n + 2 - (n + 1)}{2} = 5$$

$\Rightarrow n = 9 \Rightarrow$ CTPT của A là C_9H_{10} .

Oxi hóa A thu được sản phẩm có axit axetic nên A có CTCT như sau:



Phương trình phản ứng của A với








Câu 4:

4.1.









	NaCl	AlCl ₃	FeCl ₃	CuCl ₂	ZnCl ₂
Dd NH ₃	-	Kết tủa trắng	Kết tủa nâu đỏ	Kết tủa xanh	Kết tủa trắng
Dd NH ₃ dư	1	Không tan	2	3	Tan (4)

Các phương trình:



Dùng thuốc thử khác không cho điểm

4.2.



Câu 5:

a. A, B thơm $\Rightarrow$ có vòng benzen

A phản ứng được với Na giải phóng H_2

$\Rightarrow$ A có thể là axit ($-\text{COOH}$) hoặc ancol ($-\text{OH}$).

Mặt khác A có phản ứng tráng gương $\Rightarrow$ A phải có nhóm $-\text{OH}$ và nhóm $-\text{CHO}$

B có $M = V.d = 5,447 \cdot 22,4 = 122$

$\Rightarrow$ CTPT của A và B là $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_2$

B tác dụng được với Na_2CO_3 tạo CO_2 vậy B là axit.

A và B có công thức cấu tạo như sau:

(A)

CHO

CHO

HO



HO



HO



CHO


(ortho-)

(meta-)

(para-)

(B) ☐ COOH

b. A₁ là đồng phân octho của A. Từ o- crezol điều chế A₁ theo sơ đồ sau:



SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM
Trường THPT Núi Thành
Câu 1. (2 điểm)

ĐỀ THI OLYMPIC HÓA HỌC 11
Thời gian làm bài 150 phút

- Dung dịch A chứa CH₃COOH 0,1M. Biết K_a của CH₃COOH = 1,75.10⁻⁵
 - Tính α của axit và pH của dung dịch A.
 - Hòa tan 4,1(g) CH₃COONa vào 500 ml dung dịch A, tính pH của dung dịch thu được ?
- Dung dịch A gồm các chất tan AlCl₃, FeCl₂ và CuCl₂ (C_M mỗi chất 0,1M).
 - Cho H₂S lội chậm qua dung dịch A cho đến bão hòa thì thu được kết tủa và dung dịch B. Hãy cho biết thành phần các chất trong kết tủa và trong dung dịch B.
 - Thêm dần NH₃ vào dung dịch B cho đến dư. Có hiện tượng gì xảy ra? Viết các phương trình phản ứng ion để giải thích.

Câu 2. (2,0 điểm)

- Cho hỗn hợp gồm CaCO₃, Fe₃O₄ và Al chia làm 2 phần. Phần 1 tác dụng với dung dịch HNO₃ loãng dư, tạo sản phẩm khử là NO duy nhất. Phần 2 tác dụng dung dịch NaOH dư thu được chất rắn. Chia đôi chất rắn, rồi cho tác dụng lần lượt với dung dịch H₂SO₄ loãng dư và CO dư, nung nóng. Viết các phương trình phản ứng xảy ra, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
- Hỗn hợp gồm 1,92 gam Mg và 4,48 gam Fe phản ứng vừa hết với hỗn hợp khí X gồm clo và oxi thu được hỗn hợp Y chỉ gồm các oxit và muối clorua. Hòa tan Y cần dùng một lượng vừa đủ là 120 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Z. Cho AgNO₃ dư vào dung dịch Z, phản ứng hoàn toàn, thu được 56,69 gam kết tủa. Tính phần trăm theo thể tích của khí clo trong hỗn hợp X.

Câu 3. (2,0 điểm)

- Đốt cháy hoàn toàn hidrocarbon R, thu được tỉ lệ số mol H₂O và CO₂ tương ứng bằng 1,125.
 - Xác định công thức phân tử của R.
 - R₁ là đồng phân của R, khi tác dụng với Cl₂, điều kiện thích hợp, tỉ lệ mol 1:1 thì thu được một dẫn xuất mono clo duy nhất (R₂). Gọi tên R₁, R₂ và viết phương trình phản ứng xảy ra.
- Trình bày phương pháp hóa học đơn giản nhất để phân biệt mỗi cặp chất dưới đây chứa trong các bình riêng biệt mất nhãn và viết các phương trình phản ứng xảy ra:

- a) m-bromtoluen và benzyl bromua. b) phenylaxetilen và stiren.
c) axetilen và propin. d) $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)-\text{COOH}$ và axit fomic.

Câu 4. (2 điểm)

1. Oxi hóa một lượng ancol C bằng oxi, xúc tác, thu được hỗn hợp X. Chia X thành ba phần bằng nhau:

Phần 1 tác dụng với dung dịch AgNO_3 trong amoniac dư thu được 21,6 gam Ag.

Phần 2 tác dụng với dung dịch NaHCO_3 dư thu được 2,24 lít khí.

Phần 3 tác dụng với Na vừa đủ thu được 4,48 lít khí và 25,8 gam chất rắn khan.

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

b) Xác định công thức cấu tạo của ancol C, biết đun nóng ancol C với H_2SO_4 đặc, ở 170°C được anken, các chất khí đo ở đktc và các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

2. Axit cacboxylic Y với mạch cacbon không phân nhánh, có công thức đơn giản nhất là CHO. Cứ 1 mol Y tác dụng hết với NaHCO_3 giải phóng 2 mol CO_2 . Dùng P_2O_5 để loại nước ra khỏi Y ta thu được chất Z có cấu tạo mạch vòng. Nếu oxi hóa hơi benzen bằng oxi, xúc tác, thu được chất Z, CO_2 và H_2O . Hãy tìm công thức cấu tạo, gọi tên Y và viết các phản ứng xảy ra.

Câu 5. (2 điểm)

1. Cho 6,048 gam Mg phản ứng hết với 189 gam dung dịch HNO_3 40% thu được dung dịch X (không chứa muối amoni) và hỗn hợp khí là oxit của nitơ. Thêm 392 gam dung dịch KOH 20% vào dung dịch X, rồi cô cạn và nung sản phẩm đến khối lượng không đổi thì thu được 118,06 gam hỗn hợp chất rắn. Hãy xác định nồng độ % của các chất trong X.

2. Em hãy giải thích và viết phương trình hóa học minh họa cho các nội dung sau:

a. Etilen dễ tham gia phản ứng cộng.

b. Propin có chứa nguyên tử H linh động.

Cho: H=1, O=16, Na=23, Mg=24, P=31, Cl=35,5; K=39, Ca=40, Fe=56, Ag=108, I=127.

-----Hết-----

Thí sinh không được dùng bảng HTTH và tính tan

ĐÁP ÁN ĐỀ THI OLYMPIC HÓA 11

Câu	Đáp án	Điểm
1.	a. Ta có công thức $\alpha \approx \sqrt{\frac{K}{C_{\text{tan}}}}$	0,25

	<div>thay số vào ta có $\alpha \approx \sqrt{\frac{1,75 \times 10^{-5}}{0,1}} = 1,32.10^{-2}$</div> <div>Với kết quả trên việc sử dụng công thức gần đúng là chấp nhận được Vậy $[H^+] = \alpha.C_{\text{tan}} = 1,32.10^{-2}.0,1 = 1,32.10^{-3}M \rightarrow pH \approx 2,88$</div> <div>b. Ta có C_M của $CH_3COONa = \frac{4,1}{82 \times 0,5} = 0,1M$ $CH_3COONa \rightarrow CH_3COO^- + Na^+$ $0,1M \qquad \qquad \qquad 0,1M$ $CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$ <table><tr><td>bđ</td><td>0,1M</td><td>0,1M</td><td>0</td></tr><tr><td>ph li</td><td>x M</td><td>x M</td><td>x M</td></tr><tr><td>cb</td><td>0,1 - x</td><td>0,1+x</td><td>x</td></tr></table><div>Ta có PT: $K_a = \frac{[CH_3COO^-] \times [H^+]}{[CH_3COOH]} = \frac{(0,1+x) \times x}{(0,1-x)} = 1,75.10^{-5}$ $\rightarrow x \approx 1,75.10^{-5} (M) \rightarrow pH \approx 4,76$ (học sinh có thể dùng CT tính pH của dung dịch đệm để suy ra vẫn cho điểm tối đa</div></div> <div>2. a. Kết tủa là CuS, dung dịch B gồm AlCl₃, FeCl₂, HCl, H₂S b. Xuất hiện kết tủa keo trắng và kết tủa đen $NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4^+$ $Al^{3+} + 3 NH_3 + 3H_2O \rightarrow Al(OH)_3 \downarrow + 3 NH_4^+.$ $H_2S + 2NH_3 \rightarrow 2NH_4^+ + S^{2-}$ $Fe^{2+} + S^{2-} \rightarrow FeS \downarrow$</div>	bđ	0,1M	0,1M	0	ph li	x M	x M	x M	cb	0,1 - x	0,1+x	x	<div>0,25</div> <div>0,25</div> <div>0,25</div> <div>0,5</div> <div>0,25</div> <div>0,25</div>
bđ	0,1M	0,1M	0											
ph li	x M	x M	x M											
cb	0,1 - x	0,1+x	x											
2	<div>1. Các phương trình phản ứng: $CaCO_3 + 2HNO_3 \rightarrow Ca(NO_3)_2 + CO_2 + H_2O$ $3Fe_3O_4 + 28HNO_3 \rightarrow 9Fe(NO_3)_3 + NO + 14H_2O$ $Al + 4HNO_3 \rightarrow Al(NO_3)_3 + NO + 2H_2O$ $Al + HOH + NaOH \rightarrow NaAlO_2 + 3/2H_2$ $CaCO_3 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + CO_2 + H_2O$ $Fe_3O_4 + 4H_2SO_4 \rightarrow FeSO_4 + Fe_2(SO_4)_3 + 4H_2O$ $CaCO_3 \xrightarrow{t^0} CaO + CO_2$ $Fe_3O_4 + 4CO \xrightarrow{t^0} 3Fe + 4CO_2$</div> <div>2. Quá trình cho nhận e: <table><tr><td>$Mg \rightarrow Mg^{2+} + 2e$ $0,08 \rightarrow 0,08 \rightarrow 0,16$ $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e$ $x \rightarrow x \rightarrow 2x$ $Fe \rightarrow Fe^{3+} + 3e$ $(0,08 - x) \rightarrow (0,08 - x) \rightarrow 3(0,08 - x)$</td><td>$Cl_2 + 2e \rightarrow 2Cl^-$ $a \rightarrow 2a \rightarrow 2a$ $O_2 + 4e \rightarrow 2O^{2-}$ $b \rightarrow 4b \rightarrow 2b$</td></tr></table><div>$\Rightarrow 2a + 4b + x = 0,4 \quad (1)$</div></div> <div>1,0</div> <div>0,5</div>	$Mg \rightarrow Mg^{2+} + 2e$ $0,08 \rightarrow 0,08 \rightarrow 0,16$ $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e$ $x \rightarrow x \rightarrow 2x$ $Fe \rightarrow Fe^{3+} + 3e$ $(0,08 - x) \rightarrow (0,08 - x) \rightarrow 3(0,08 - x)$	$Cl_2 + 2e \rightarrow 2Cl^-$ $a \rightarrow 2a \rightarrow 2a$ $O_2 + 4e \rightarrow 2O^{2-}$ $b \rightarrow 4b \rightarrow 2b$											
$Mg \rightarrow Mg^{2+} + 2e$ $0,08 \rightarrow 0,08 \rightarrow 0,16$ $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e$ $x \rightarrow x \rightarrow 2x$ $Fe \rightarrow Fe^{3+} + 3e$ $(0,08 - x) \rightarrow (0,08 - x) \rightarrow 3(0,08 - x)$	$Cl_2 + 2e \rightarrow 2Cl^-$ $a \rightarrow 2a \rightarrow 2a$ $O_2 + 4e \rightarrow 2O^{2-}$ $b \rightarrow 4b \rightarrow 2b$													

	<p>Các oxit tác dụng với axit HCl sinh ra muối và nước theo sơ đồ:</p> $2O^{2-} + 4H^+ \rightarrow 2H_2O$ $2b \rightarrow 4b$ $\Rightarrow n_{HCl} = 4b = 0,24 \Rightarrow b = 0,06 \text{ mol}$ <p>(1) $\Rightarrow 2a + x = 0,16$ (2)</p> <p>Dung dịch Z chứa muối $MgCl_2$, $FeCl_2$ và $FeCl_3$ với $\Sigma n_{Cl^-} = (2a + 0,24) \text{ mol}$</p> $Fe^{2+} + Ag^+ \rightarrow Fe^{3+} + Ag\downarrow$ $x \quad \quad \quad x$ $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl\downarrow$ $(2a + 0,24) \rightarrow (2a + 0,24)$ $\Rightarrow m_{kết tủa} = 108x + 143,5(2a + 0,24) = 56,69$ <p>Hay:</p> $108x + 287a = 22,25 \quad (3)$ <p>Giải hệ (2)(3): $a = 0,07 \text{ mol}$; $x = 0,02 \text{ mol}$</p> <p>Phần trăm thể tích của Cl_2 trong X là</p> $\%V_{Cl_2} = \frac{0,07 \cdot 100\%}{0,07 + 0,06} = 53,85\%$	0,5
3.	<p>1</p> <p>a) Do $n_{H_2O} : n_{CO_2} > 1 \Rightarrow R$ là C_nH_{2n+2} ($n \geq 1$)</p> <p>Phản ứng: $C_nH_{2n+2} + (3n+1)/2 O_2 \rightarrow nCO_2 + (n+1) H_2O$ (1)</p> <p>Từ (n+1): $n = 1,125 \Rightarrow n = 8 \Rightarrow R: C_8H_{18}$</p> <p>b) Do R_1 tác dụng với Cl_2 tạo 1 dẫn xuất monoclo duy nhất R_2</p> <p>$\Rightarrow R_1: (CH_3)_3C - C(CH_3)_3$: 2,2,3,3-tetrametylbutan</p> <p>$R_2: ClCH_2(CH_3)_2C - C(CH_3)_3$: 1-clo-2,2,3,3-tetrametylbutan</p> <p>$(CH_3)_3C - C(CH_3)_3 + Cl_2 \xrightarrow{as} ClCH_2(CH_3)_2C - C(CH_3)_3 + HCl$</p> <p>2.</p> <p>a) Dùng $AgNO_3$, đun nóng, benzyl bromua cho kết tủa vàng:</p> $C_6H_5CH_2Br + AgNO_3 + H_2O \rightarrow C_6H_5CH_2OH + AgBr + HNO_3$ <p>b) Dùng dung dịch $AgNO_3/NH_3$, phenylaxetilen cho kết tủa vàng xám:</p> $C_6H_5C \equiv CH + AgNO_3 + NH_3 \rightarrow C_6H_5C \equiv CAg + NH_4NO_3$ <p>c) Cho tác dụng với H_2O, xt. Lấy sản phẩm thực hiện phản ứng tráng gương</p> <p>Tạo kết tủa Ag là andehit, không phản ứng là xeton $\Rightarrow CH \equiv CH$ và $CH_3 - C \equiv CH$</p> <p>$H_2O + C_2H_2 \xrightarrow{HgSO_4, t^0} CH_3CHO$ $CH_3 - C \equiv CH + H_2O \xrightarrow{HgSO_4, t^0} CH_3COCH_3$</p> <p>$CH_3CHO + 2[Ag(NH_3)_2]OH \xrightarrow{t^0} CH_3COONH_4 + 2Ag\downarrow + 3NH_3 + H_2O$</p> <p>d) Cho tác dụng với Br_2/CCl_4</p> <p>Mất màu là $CH_2=C(CH_3)COOH$, không phản ứng là $HCOOH$</p> <p>$CH_2=C(CH_3)COOH + Br_2 \rightarrow CH_2Br - CBr(CH_3) - COOH$</p>	0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25
4	<p>1.</p> <p>Do oxi hóa C được SP tráng gương, tách nước tạo olefin $\Rightarrow C$ là ancol no, đơn chức mạch hở, bậc một. Vậy C: RCH_2OH ($R: C_nH_{2n+1} -$, $n \geq 1$).</p> <p>$2 RCH_2OH + O_2 \xrightarrow{xt, t^0} 2RCHO + 2 H_2O$ (1)</p> <p>$RCH_2OH + O_2 \xrightarrow{xt, t^0} RCOOH + H_2O$ (2)</p> <p>Hỗn hợp X gồm $RCHO$, $RCOOH$, H_2O và RCH_2OH dư.</p> <p>* Phần 1: $RCHO + 2[Ag(NH_3)_2]OH \xrightarrow{t^0} RCOONH_4 + 2Ag\downarrow + 3NH_3 + H_2O$ (2)</p> <p>* Phần 2: $RCOOH + NaHCO_3 \rightarrow RCOONa + H_2O + CO_2 \uparrow$ (4)</p>	

	<p>* Phần 2: $2 \text{RCOOH} + 2 \text{Na} \rightarrow 2 \text{RCOONa} + \text{H}_2 \uparrow$ (5) $2 \text{RCH}_2\text{OH} + 2 \text{Na} \rightarrow 2 \text{RCH}_2\text{ONa} + \text{H}_2 \uparrow$ (6) $2 \text{H}_2\text{O} + 2 \text{Na} \rightarrow 2 \text{NaOH} + \text{H}_2 \uparrow$ (7) Gọi số mol RCH_2OH, RCHO, RCOOH trong 1/3 hỗn hợp X lần lượt là x, y, z mol. Theo (1 → 7) và bài ra ta có hệ:</p> $\begin{cases} 2y = 0,2 \\ z = 0,1 \\ 0,5z + 0,5x + 0,5(y+z)z = 0,2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,1 \\ y = 0,1 \\ z = 0,1 \end{cases}$ <p>Chất rắn khan thu được sau phản ứng ở phần III gồm : 0,1 (mol) RCOONa ; 0,1 (mol) RCH_2ONa và 0,2 (mol) NaOH. Số gam chất rắn khan : $(\text{R} + 67) \cdot 0,1 + (\text{R} + 53) \cdot 0,1 + 40 \cdot 0,2 = 25,8$ (gam) $\Rightarrow \text{M}_\text{R} = 29 \Rightarrow \text{R}$ là C_2H_5 - Vậy ancol C: $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$.</p> <p>2. Vì 1 mol Y tác dụng được với $\text{NaHCO}_3 \rightarrow 2 \text{mol CO}_2 \Rightarrow \text{Y}$ là một axit 2 nấc $\Rightarrow$ CTPT của Y phải là $\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_4$ hay $\text{C}_2\text{H}_2(\text{COOH})_2$. Ứng với mạch không phân nhánh có 2 đồng phân cis-trans là:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> $\begin{array}{c} \text{HOOC} \quad \text{H} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{C} = \text{C} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{H} \quad \text{COOH} \end{array}$ <p>axit <i>trans</i>-butendioic (axit fumaric)</p> </div> <div style="text-align: center;"> $\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{C} = \text{C} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{HOOC} \quad \text{COOH} \end{array}$ <p>axit <i>cis</i>-butendioic (axit maleic) (Y)</p> </div> </div> <p>Chỉ có đồng phân cis mới có khả năng tách nước tạo anhiđrit (Z):</p> <div style="text-align: center;"> $\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{COOH} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{C} = \text{C} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{H} \quad \text{COOH} \end{array} \xrightarrow{\text{P}_2\text{O}_5} \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{H} - \text{C} - \text{O} \\ \parallel \quad \diagup \quad \diagdown \\ \text{C} = \text{C} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{H} \quad \text{C} = \text{O} \end{array} + \text{H}_2\text{O}$ </div>	<p>0,5</p> <p>0,5</p> <p>0,5</p> <p>0,5</p>
5	<p>1. $n_{\text{HNO}_3} = 1,2 \text{ mol}$ $n_{\text{Mg}} = 0,252$ $n_{\text{KOH đã lấy}} = 1,4 \text{ mol}$ Vì $n_{\text{KOH}} > n_{\text{HNO}_3}$ nên KOH dư 118,06 gam chất rắn gồm 0,252 mol MgO, x mol KOH và y mol KNO_2 $x + y = 1,4$ $40 \cdot 0,252 + 56x + 85y = 118,06$ $x = 0,38$ $y = 1,02$ $\Rightarrow n_{\text{NO}_3}$ trong dung dịch sau phản ứng = $n_{\text{KNO}_2} = 1,02$ $\Rightarrow n_{\text{N}^{+5} \text{ nhận electron}} = 1,2 - 1,02 = 0,18$. Gọi số mol electron mà N^{+5} nhận trung bình là n ta có $0,18 \cdot n = 0,252 \cdot 2$ $\Rightarrow n = 2,8$ coi như oxit thoát ra là 0,09 mol $\text{N}_2\text{O}_{2,2} \Rightarrow m_{\text{khi}} = 0,09 \cdot (28 + 16 \cdot 2,2) =$ 5,688 $m_{\text{dung dịch X}} = 6,048 + 189 - 5,688 = \mathbf{189,36 \text{ gam}}$ X chứa 0,252 mol $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$; 0,516 mol HNO_3 dư</p>	<p>0,25</p> <p>0,25</p> <p>0,25</p> <p>0,25</p>

<p>C%Mg(NO₃)₂=19,696% C%HNO₃= 17,167%</p> <p>2.</p> <p>a. Phân tử etilen có 1 liên kết π kém bền nên dễ tham gia phản ứng cộng</p> $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{Br}_2 \rightarrow \text{CH}_2\text{Br}-\text{CH}_2\text{Br}$ <p>b. Vì trong phân tử propin có liên kết 3 hút electron nên nguyên tử H liên kết trực tiếp với C sp³ linh động</p> $\text{CH}\equiv\text{C}-\text{CH}_3 + [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ \rightarrow \text{CAg}\equiv\text{C}-\text{CH}_3 + \text{NH}_3 + \text{NH}_4^+$ <p>CH₃-CH(OH)-CH₃ (sản phẩm chính)</p>	<p>0,5</p> <p>0,5</p>
--	-------------------------------------

**SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU
OLYMPIC (2016-2017)**

ĐỀ THAM KHẢO

MÔN HÓA

KHỐI 11

THỜI

GIAN: 150 phút

Câu I. (3,0 điểm)

1. Trộn 10 ml dung dịch CH₃COOH có pH= 3,5 với 10ml dung dịch Ba(OH)₂ có pH=11,5. Tính pH của dung dịch thu được, biết K_a(CH₃COOH) = 10^{-4,76}.

2. Có dung dịch A chứa hỗn hợp 2 muối MgCl₂ 10⁻³M và FeCl₃ 10⁻³M. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch A

a. Kết tủa nào tạo ra trước? Biết tích số tan của Mg(OH)₂ và Fe(OH)₃ lần lượt là: 10⁻¹¹ và 10⁻³⁹

b. Tìm pH thích hợp để tách 1 trong 2 ion Mg²⁺ hoặc Fe³⁺ ra khỏi dung dịch. Biết rằng nếu ion có nồng độ bé hơn hoặc bằng 10⁻⁶ M thì xem như đã được tách hết.

Câu II. (6,0 điểm)

1.(3,0 điểm) Hòa tan m gam NH₄HCO₃ vào 120 ml dung dịch HCl 0,25 M thấy thoát ra V lit khí (đktc). Phản ứng xong, đổ lượng dư dung dịch Ca(OH)₂ vào dung dịch tạo thành, được a gam kết tủa. Mặt khác khi đun nóng nhẹ m gam NH₄HCO₃ với lượng dư dung dịch Ba(OH)₂ thì sau khi phản ứng kết thúc thu được 1 dung dịch có khối lượng nhỏ hơn khối lượng của dung dịch Ba(OH)₂ đã dùng là 6,75 gam. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lượng nước bị bay hơi trong quá trình thí nghiệm là không đáng kể.

Hãy xác định m, a, V.

2. (3,0 điểm) Cho cân bằng $\text{HCOOH} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCOO}^-$

Hòa tan 9,2 gam HCOOH vào trong nước pha loãng thành 500 ml (dung dịch A).

a/ Tính độ điện li của axit HCOOH trong dung dịch A, biết pH_A = 2.

b/ Tính hằng số phân li của axit HCOOH.

c/ Cần pha thêm bao nhiêu ml dung dịch HCl có pH = 1 vào 100,00 ml dung dịch A để độ điện li giảm 20%

d/ Nếu thêm 0,4 gam NaOH vào 50 ml dung dịch A, sau đó cho quỳ tím vào thì màu quỳ tím biến đổi như thế nào? Tính pH của dung dịch sau phản ứng.

Câu III.(3,0 điểm)

Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Zn, FeCO_3 , Ag bằng lượng dư dung dịch HNO_3 , thu được hỗn hợp khí A gồm 2 hợp chất khí có tỷ khối đối với H_2 bằng 19,2 và dung dịch B. Cho B tác dụng hết với dung dịch NaOH dư tạo kết tủa. Lọc kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được 5,64 gam chất rắn. Tính khối lượng hỗn hợp X. Biết trong X khối lượng FeCO_3 bằng khối lượng Zn; mỗi chất trong X khi tác dụng với dung dịch HNO_3 ở trên chỉ cho 1 sản phẩm khử.

Câu IV. (3,0 điểm)

Kết quả phân tích một hợp chất hữu cơ A thu được 93,10%C và 6,90%H. Mặt khác, hoà tan 0,58 gam A trong 50 gam benzen thu được dung dịch đông đặc ở 4,988°C. Biết rằng benzen có hằng số nghiệm lạnh 5,12 và đông đặc ở 5,5°C.

4.1. Xác định công thức phân tử của A.

4.2. A làm mất màu nước brom, cộng hợp 2 mol H_2 và khi oxi hoá tạo thành axit benzoic; tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong amoniac cho kết tủa đặc trưng. Viết công thức cấu tạo, gọi tên A và các sản phẩm tạo thành. Viết sơ đồ phản ứng ở các dữ kiện trên.

4.3. B là một đồng phân của A với các tính chất sau: làm mất màu nước brom, cộng hợp 1 mol H_2 tạo thành D (C_9H_{10}); ở nhiệt độ cao và có áp suất cộng hợp 4 mol H_2 . Oxi hoá mạnh B tạo thành axit o-phthalic. Xác định cấu tạo của B bằng sơ đồ phản ứng.

Câu V: (5 điểm)

1.1. Viết phương trình hóa học điều chế:

- 2,3-dimetylbutan từ propen
- 2-metylpentan từ propan
- Metylxiclopropan từ propen

1.2. (2 điểm)

Oxi hóa hoàn toàn một Hidro cacbon X mạch hở, thể khí thu được **17,6** gam CO_2 và **5,4** gam H_2O .

a) Tìm CTPT X. Viết các đồng phân có thể có của X.

b) Tìm CTCT đúng của X biết X tác dụng với HCl dư thu dẫn xuất điclo Y có cấu tạo đối xứng.


c) Viết các đồng phân quang học của Y (sử dụng công thức Fisher) và xác định cấu hình mỗi đồng phân (S/R) đó.




-----HẾT-----

HƯỚNG DẪN CHẤM

Câu	Nội dung	Điểm
Câu I. (3,0 điểm)	<p>1. Dung dịch CH_3COOH có $\text{pH}=3,5 \Rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-3,5}$</p> $\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$ <p style="text-align: center;">C</p> <p>C- $10^{-3,5}$ $10^{-3,5}$ $10^{-3,5}$</p> <p>- Dựa vào K tính được $C = 6,07 \cdot 10^{-3} \text{ M}$</p> <p>- Dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ có $\text{pH}=11,5 \Rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-11,5} \Rightarrow [\text{OH}^-] = 10^{-2,5}$</p> <p>Sau khi trộn thì $C_{\text{CH}_3\text{COOH}} = 3,035 \cdot 10^{-3} \text{ (Vdd= 20ml)}$</p> <p style="text-align: center;">$C_{\text{OH}^-} = 1,58 \cdot 10^{-3}$</p> $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^- \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$ <p style="text-align: center;">$3,035 \cdot 10^{-3}$ $1,58 \cdot 10^{-3}$</p> <p style="text-align: center;">$1,58 \cdot 10^{-3}$ $1,58 \cdot 10^{-3}$ $1,58 \cdot 10^{-3}$</p> <p style="text-align: center;">$1,455 \cdot 10^{-3}$ 0 $1,58 \cdot 10^{-3}$</p> <p>Ta được dung dịch đệm CH_3COOH $1,455 \cdot 10^{-3} \text{ M}$ và CH_3COO^- $1,58 \cdot 10^{-3} \text{ M}$</p> $\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$ <p style="text-align: center;">$1,455 \cdot 10^{-3} \text{ M}$ $1,58 \cdot 10^{-3} \text{ M}$</p> <p style="text-align: center;">$1,455 \cdot 10^{-3} - x$ $1,58 \cdot 10^{-3} + x$ x</p> <p>Dựa vào K tính được $x = 1,565 \cdot 10^{-5} \Rightarrow \text{pH} = 4,8$</p> <p>2. a. $\text{MgCl}_2 \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 2\text{Cl}^-$ và $\text{Mg}^{2+} + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{Mg}(\text{OH})_2$ $\text{FeCl}_3 \rightarrow \text{Fe}^{3+} + 3\text{Cl}^-$ và $\text{Fe}^{3+} + 3\text{OH}^- \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_3$ Để tạo kết tủa $\text{Fe}(\text{OH})_3$ thì $[\text{OH}^-] \geq 10^{-12} \text{ M}$ (1) Để tạo kết tủa $\text{Mg}(\text{OH})_2$ thì $[\text{OH}^-] \geq 10^{-4} \text{ M}$ (2) Từ (1) và (2) suy ra $\text{Fe}(\text{OH})_3$ kết tủa trước. b. Để tạo kết tủa $\text{Mg}(\text{OH})_2$ thì $[\text{OH}^-] \geq 10^{-4} \text{ M} \Rightarrow \text{pH} \geq 10$ Để tạo kết tủa $\text{Fe}(\text{OH})_3$ hoàn toàn thì $T_{\text{Fe}(\text{OH})_3} \leq 10^{-6} \Rightarrow [\text{OH}^-]^3 \geq 10^{-33} \Rightarrow \text{pH} \geq 3$</p> <p>Vậy để tách Fe^{3+} ra khỏi dung dịch cần có $3 \leq \text{pH} \leq 10$</p>	<p>0.5</p> <p>0.5</p> <p>0.5</p> <p>0.5</p> <p>1</p>
Câu II. (6,0 điểm)	<p>1. 2,0 điểm</p> <p>Khi cho dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$ vào thấy kết tủa nên NH_4HCO_3 dư, HCl hết</p> $\text{NH}_4\text{HCO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ <p style="text-align: center;">0,03 mol 0,03 mol 0,03 mol</p> <p>V = V_{CO2} = 0,03. 22,4 = 0,672 lít</p> $\text{HCO}_3^- + \text{Ca}^{2+} + \text{OH}^- \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ <p style="text-align: center;">x-0,03 x-0,03</p> $\text{NH}_4\text{HCO}_3 + \text{Ba}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{NH}_3 + \text{BaCO}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$ <p style="text-align: center;">x x x</p> <p>Gọi số mol của NH_4HCO_3 ban đầu là x mol</p> <p>$m_{\text{BaCO}_3} + m_{\text{NH}_3} - m_{\text{NH}_4\text{HCO}_3} = m \text{ dd giảm}$</p> <p>$197x + 17x - 79x = 6,75$</p> <p>$\Rightarrow x = 0,05 \text{ mol}$</p> <p>$m_{(\text{NH}_4\text{HCO}_3)} = 0,05 \cdot 79 = \mathbf{3,95 \text{ gam} = m}$</p> <p>$m_{\text{CaCO}_3} = 0,02 \cdot 100 = \mathbf{2 \text{ gam} = a}$</p>	<p>0.5</p> <p>0.5</p> <p>0.5</p> <p>0.5</p>

	<p>2. 3,0 điểm</p> <p>$n \text{HCOOH} = 0,2 \text{ mol} \rightarrow [\text{HCOOH}] = 0,4\text{M}$</p> <p style="text-align: center;"> $\text{HCOOH} \rightleftharpoons \text{HCOO}^- + \text{H}^+$ </p> <p>Bđ 0,4M</p> <p>Điện li 0,4a 0,4a 0,4a</p> <p>CB 0,4(1-a) 0,4a 0,4a</p> <p>a/ gọi a là độ điện li của HCOOH $\text{pH} = 2 \rightarrow [\text{H}^+] = 0,01 \text{ M}$ $\rightarrow 0,4a = 0,01 \rightarrow a = 0,025 = 2,5\%$</p> <p>b/ $K_{a(\text{HCOOH})} = \frac{[\text{HCOO}^-] \cdot [\text{H}^+]}{[\text{HCOOH}]}$ $= \frac{(0,4a)^2}{(0,4(1-a))} = 10^{-3,59}$</p> <p>c/</p> <p style="text-align: center;"> $\text{HCOOH} \rightleftharpoons \text{HCOO}^- + \text{H}^+$ </p> <p>Bđ 0,4M</p> <p>Điện li 0,4b 0,4b 0,4b + x</p> <p>CB 0,4(1-b) 0,4b 0,4b + x</p> <p>Độ điện li giảm 20% $\rightarrow b = 80\% \quad b = 0,02$</p> <p>$K_a = 0,4b \cdot (0,4b + x) / (0,4(1-b)) = 10^{-3,59}$</p> <p>Thay $b = 0,02 \rightarrow x = 0,0046 \text{ M}$</p> <p>Gọi V là thể tích của HCl cần thêm vào $\rightarrow \text{pH} = 1 \rightarrow [\text{H}^+] = 0,1\text{M}$ $\rightarrow V \cdot 0,1 = (V+100) \cdot 0,0046$ $V = 4,82 \text{ ml}$</p> <p>d/ $n\text{NaOH} = 0,01 \text{ mol}; n\text{HCOOH} = 0,02 \text{ mol}$ $\text{HCOOH} + \text{NaOH} \rightarrow \text{HCOONa} + \text{H}_2\text{O}$ $0,01 \text{ mol} \quad 0,01 \text{ mol} \quad 0,01 \text{ mol}$ $\text{HCOONa} \rightarrow \text{HCOO}^- + \text{Na}^+$ $0,01 \text{ mol} \quad 0,01 \text{ mol} \quad 0,01 \text{ mol}$ $[\text{HCOOH}] = 0,01/0,05 = 0,2\text{M}$ $[\text{HCOO}^-] = 0,2\text{M}$</p> <p style="text-align: center;"> $\text{HCOOH} \rightleftharpoons \text{HCOO}^- + \text{H}^+$ </p> <p>Bđ 0,2M</p> <p>Điện li y 0,2+y y</p> <p>CB 0,2-y 0,2+y y</p> <p>$K_a = (0,2+y)y / (0,2-y) = 10^{-3,59}$ $\rightarrow y = 2,56 \cdot 10^{-4} \text{M} \rightarrow \text{pH} = 3,59 < 6$ Quỳ tím chuyển màu đỏ</p>	<p>1</p> <p>0.5</p> <p>0.5</p> <p>0.5</p> <p>0.5</p>
<p>Câu III. (3,0 điểm)</p>	<p>$\overline{M}_A = 19,22 = 38,4$. A gồm 2 hợp chất khí, trong đó 1 là CO_2 (vì ban đầu có FeCO_3). Khí còn lại có $M < 38,4$ và là sản phẩm khử HNO_3, đó là NO.</p> <p>Giả sử trong 1mol A có x mol $\text{CO}_2 \Rightarrow 44 \cdot x + 30(1-x) = 38,4$ $\Rightarrow x = 0,6$ hay $n_{\text{CO}_2} = 1,5n_{\text{NO}}$.</p> <p>Gọi a, b, c lần lượt là số mol FeCO_3, Zn, Ag trong X.</p> <p>Nếu sản phẩm khử chỉ có NO: $n_{\text{CO}_2} = n_{\text{FeCO}_3} = a \text{ (mol)}$; $n_{\text{NO}} = (n_{\text{FeCO}_3} + 2 \cdot n_{\text{Zn}} + n_{\text{Ag}}) / 3 = (a + 2b + c) / 3$.</p> <p>Mặt khác $m_{\text{Zn}} = m_{\text{FeCO}_3} \Rightarrow 116 \cdot a = 65 \cdot b \Rightarrow a < b$</p>	<p>0.5</p>

	<p>nên $n_{\text{NO}} = (a + 2b + c)/3 > a + \frac{c}{3} > a = n_{\text{CO}_2}$ Trái với $n_{\text{CO}_2} = 1,5n_{\text{NO}}$. Vậy sản phẩm khử ngoài NO còn có NH_4NO_3. Mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu chỉ khử NO_3^- đến 1 chất nhất định $\Rightarrow$ Các phản ứng xảy ra là: $3\text{FeCO}_3 + 10\text{HNO}_3 \rightarrow 3\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 + \text{NO} + 3\text{CO}_2 + 5\text{H}_2\text{O}$ $3\text{Ag} + 4\text{HNO}_3 \rightarrow 3\text{AgNO}_3 + \text{NO} + 2\text{H}_2\text{O}$ $4\text{Zn} + 10\text{HNO}_3 \rightarrow 4\text{Zn}(\text{NO}_3)_2 + \text{NH}_4\text{NO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ Dung dịch B có Fe^{3+}, Ag^+, Zn^{2+}, H^+, NH_4^+, NO_3^-. Khi tác dụng với dung dịch NaOH dư có các phản ứng tạo kết tủa: $\text{Fe}^{3+} + 3\text{OH}^- \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_3 \downarrow$ $2\text{Ag}^+ + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{Ag}_2\text{O} \downarrow + \text{H}_2\text{O}$ Nung kết tủa: $2\text{Fe}(\text{OH})_3 \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{O};$ $2\text{Ag}_2\text{O} \rightarrow 4\text{Ag} + \text{O}_2$ Chất rắn thu được gồm Fe_2O_3 và Ag. $n_{\text{CO}_2} = n_{\text{FeCO}_3} = a \text{ (mol)}; \quad n_{\text{NO}} = (n_{\text{FeCO}_3} + n_{\text{Ag}})/3 = (a+c)/3;$ $n_{\text{Fe}_2\text{O}_3} = a/2$ $\begin{cases} a = 1,5(a+c)/3 \\ 160.a/2 + 108.c = 5,64 \end{cases}$ $a = c = 0,03.$ Vậy hỗn hợp ban đầu có: $m_{\text{FeCO}_3} = m_{\text{Zn}} = 0,03.116 = 3,48\text{g};$ $m_{\text{Ag}} = 3,24\text{g}$ $m_x = 10,2 \text{ gam}$</p>	<p>0.5</p> <p>0.75</p> <p>0.25</p> <p>0.5</p> <p>0.5</p>
<p>Câu IV. (3,0 điểm)</p>	<p>4.1. Đặt công thức tổng quát của A là C_xH_y $x : y = \frac{93,10}{12} : \frac{6,90}{1} = 7,758 : 6,900 = 9 : 8$ $\Rightarrow$ CTPT của A có dạng $(\text{C}_9\text{H}_8)_n$ $\text{MA} = \frac{5,12.0,58.1000}{(5,5 - 4,988).50} = 116$ $\Rightarrow 116n = 116 \Rightarrow n = 1 \Rightarrow$ CTPT C_9H_8</p> <p>4.2. Oxi hóa C_9H_8 tạo axit benzoic $\rightarrow$ A là hidrocarbon thơm chỉ có 1 nhánh chứa 3C. A cộng hợp 2 mol $\text{H}_2 \Rightarrow$ có 2 nối đôi hoặc 1 nối ba. A tác dụng với dung dịch $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$ tạo kết tủa $\Rightarrow$ nối ba ở đầu mạch. $\Rightarrow$ CTCT của A là  Các sơ đồ phản ứng:</p>	

$\Delta = \frac{4 \cdot 2 + 2 - 6}{2} = 2 \Rightarrow X \text{ có } 2 \text{ lk } \pi$	0,125đ
b) CTCT có thể có của X: $\text{CH}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ $\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_3$ $\text{CH}_2=\text{C}=\text{CH}-\text{CH}_3$ $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$	0,125đ 0,125đ 0,125đ 0,125đ
c) CTCT đúng X: $\text{C}_4\text{H}_6 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{C}_4\text{H}_8\text{Cl}_2$ có cấu tạo đối xứng Vậy CTCT đúng X: $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$	0,25đ
Viết đúng cấu hình và xác định đúng góc quay mỗi đồng phân quang học : $0,125 + 0,125 = 0,25$ đ <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  (1) (2S, 3R) </div> <div style="text-align: center;">  (2) (2R, 3R) </div> <div style="text-align: center;">  (3) (2S, 3S) </div> </div> <p>(Trong đó (1) là đồng phân quang học không quang hoạt)</p>	0,25đ 0,25đ 0,25đ

**TRƯỜNG THPT HIỆP ĐỨC
QUẢNG NAM**

ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ

**KỲ THI OLIMPIC 24/3 LẦN THỨ HAI
Năm học: 2016-2017**

Môn thi : **HÓA HỌC - LỚP 11**
 Thời gian: **150 phút** (không kể thời gian
 giao đề)
 Ngày thi: **25/3/2017**
 (Đề thi có 02 trang, gồm 05 câu)

Câu I. (4,0 điểm)

1. Hoà tan m gam NH_4HCO_3 vào 120 ml dung dịch HCl 0,25 M thấy thoát ra V lit khí (đktc). Phản ứng xong, đổ lượng dư dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$ vào dung dịch tạo thành, được a gam kết tủa. Mặt khác khi đun nóng nhẹ m gam NH_4HCO_3 với lượng dư dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ thì sau khi phản ứng kết thúc thu được 1 dung dịch có khối lượng nhỏ hơn khối lượng của dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ đã dùng là 6,75 gam. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lượng nước bị bay hơi trong quá trình thí nghiệm là không đáng kể. Hãy xác định m, a, V.

2. Cho cân bằng $\text{HCOOH} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCOO}^-$
 Hòa tan 9,2 gam HCOOH vào trong nước pha loãng thành 500 ml (dung dịch A).

a/ Tính độ điện li của axit HCOOH trong dung dịch A, biết $\text{pH}_A = 2$.

b/ Tính hằng số phân li của axit HCOOH .

c/ Cần pha thêm bao nhiêu ml dung dịch HCl có $\text{pH} = 1$ vào 100,00 ml dung dịch A để độ điện li giảm 20%

Cho biết nguyên tử khối : H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5; Br = 80; P = 31; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137; Pb = 207; Ni = 59; Sn = 119.

(Thí sinh không được sử dụng Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)

Họ và tên thí sinh:.....SBD:.....Phòng thí:.....

Họ và tên giám thị 1:.....Chữ

ký:.....

Họ và tên giám thị 2:.....Chữ

ký:.....

**TRƯỜNG THPT HIỆP ĐỨC
QUẢNG NAM**

**KỲ THI OLIMPIC 24/3 LẦN THỨ HAI
Năm học: 2016-2017**

(Hướng dẫn chấm gồm có 05
trang)


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ
Môn thi : **Hóa học 11**
Ngày thi: **25/3/2017**

Câu	Nội dung đáp án	Điểm
Câu I		4,00 đ
1.	<p>Khi cho dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$ vào thấy kết tủa nên NH_4HCO_3 dư, HCl hết</p> $\text{NH}_4\text{HCO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ <p>0,03 mol ,03 mol 0,03 mol</p> <p>$V = V_{\text{CO}_2} = 0,03 \cdot 22,4 = 0,672$ lít</p> $\text{HCO}_3^- + \text{Ca}^{2+} + \text{OH}^- \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ <p>x-0,03 x-0,03</p> $\text{NH}_4\text{HCO}_3 + \text{Ba}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{NH}_3 + \text{BaCO}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$ <p>x x x</p> <p>Gọi số mol của NH_4HCO_3 ban đầu là x mol</p> $m_{\text{BaCO}_3} + m_{\text{NH}_3} - m_{\text{NH}_4\text{HCO}_3} = m \text{ dd giảm}$ $197x + 17x - 79x = 6,75 \rightarrow x = 0,05 \text{ mol}$ <p>$m_{(\text{NH}_4\text{HCO}_3)} = 0,05 \cdot 79 = 3,95 \text{ gam} = m$</p> <p>$m_{\text{CaCO}_3} = 0,02 \cdot 100 = 2 \text{ gam} = a$</p>	2,00
2.	<p>$n \text{ HCOOH} = 0,2 \text{ mol} \rightarrow [\text{HCOOH}] = 0,4\text{M}$</p> $\text{HCOOH} \rightleftharpoons \text{HCOO}^- + \text{H}^+$ <p>Bđ 0,4M</p> <p>Điện li 0,4a 0,4a 0,4a</p> <p>CB 0,4(1-a) 0,4a 0,4a</p> <p>a/ gọi a là độ điện li của HCOOH</p> <p>$\text{pH} = 2 \rightarrow [\text{H}^+] = 0,01 \text{ M}$</p>	2,00

	<p>→ 0,4a= 0,01 → a = 0,025 =2,5%</p> <p>b/ $Ka_{(HCOOH)} = [HCOO^-].[H^+]/[HCOOH]$</p> <p style="text-align: center;">$= (0,4.a)^2/(0,4(1-a)) = 10^{-3,59}$</p> <p>c/</p> <table><tr><td></td><td>HCOOH</td><td></td><td>HCOO⁻ + H⁺</td></tr><tr><td>Bđ</td><td>0,4M</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Điện li</td><td>0,4b</td><td>0,4b</td><td>0,4b+ x</td></tr><tr><td>CB</td><td>0,4(1-b)</td><td>0,4b</td><td>0,4b + x</td></tr></table> <p>Độ điện li giảm 20% → b= 80%a =0,02</p> <p>$Ka = 0,4b.(0,4b + x)/(0,4(1-b) = 10^{-3,59}$</p> <p>Thay b = 0,02 → x = 0,0046 M</p> <p>Gọi V là thể tích của HCl cần thêm vào</p> <p>→ pH =1 → [H⁺] = 0,1M</p> <p>→ V.0,1 = (V+100).0,0046</p> <p>V = 4,82 ml</p> <p>d/ nNaOH = 0,01 mol; nHCOOH= 0,02 mol</p> <p>HCOOH + NaOH → HCOONa + H₂O</p> <p style="text-align: center;">0,01 mol 0,01 mol 0,01 mol</p> <p>HCOONa → HCOO⁻ + Na⁺</p> <p style="text-align: center;">0,01 mol 0,01 mol 0,01 mol</p> <p style="text-align: center;">[HCOOH] = 0,01/0,05 = 0,2M</p> <p>[HCOO⁻] = 0,2M</p> <table><tr><td></td><td>HCOOH</td><td></td><td>HCOO⁻ + H⁺</td></tr><tr><td>Bđ</td><td>0,2M</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Điện li</td><td>y</td><td>0,2+y</td><td>y</td></tr><tr><td>CB</td><td>0,2-y</td><td>0,2+y</td><td>y</td></tr></table> <p>$Ka = (0,2+y)y/(0,2-y)= 10^{-3,59}$</p> <p>→ y = 2,56.10⁻⁴M → pH = 3,59 < 6 Quỳ tím chuyển màu đỏ</p>		HCOOH		HCOO ⁻ + H ⁺	Bđ	0,4M			Điện li	0,4b	0,4b	0,4b+ x	CB	0,4(1-b)	0,4b	0,4b + x		HCOOH		HCOO ⁻ + H ⁺	Bđ	0,2M			Điện li	y	0,2+y	y	CB	0,2-y	0,2+y	y	
	HCOOH		HCOO ⁻ + H ⁺																															
Bđ	0,4M																																	
Điện li	0,4b	0,4b	0,4b+ x																															
CB	0,4(1-b)	0,4b	0,4b + x																															
	HCOOH		HCOO ⁻ + H ⁺																															
Bđ	0,2M																																	
Điện li	y	0,2+y	y																															
CB	0,2-y	0,2+y	y																															
Câu II		4,00 đ																																
1.	<p>1. a/ n(OH⁻) = 0,009 mol; nH⁺ = 0,004 mol</p> <p>→ OH⁻ dư, nOH⁻= 0,005 mol → [OH⁻] =0,01 M→ pH = 12</p> <p>b/ nOH⁻ = 0,36 mol; nBaCO₃ = 0,03 mol</p> <p>TH1: OH⁻ dư</p> <p>nCO₂ = n BaCO₃ = 0,03 mol → V_{co2} =0,672 lít</p> <p>TH2: tạo ra hai muối</p> <p>CO₂ + OH⁻ → HCO₃⁻</p> <p>0,3mol 0,3 mol</p>	1.50																																

	$\text{CO}_2 + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ $0,03\text{mol} \quad 0,06\text{mol} \quad 0,03\text{mol}$ $V_{\text{CO}_2} = 0,33.22,4 = \mathbf{7,392 \text{ lit}}$	
2.	<p>2.</p> <p>Pư: $\text{FeS} + 10\text{H}^+ + 9\text{NO}_3^- \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{SO}_4^{2-} + 9\text{NO}_2\uparrow + 5\text{H}_2\text{O}$</p> <p style="text-align: center;">a 9a</p> <p>$\text{FeCO}_3 + 4\text{H}^+ + \text{NO}_3^- \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{CO}_2\uparrow + \text{NO}_2\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$</p> <p style="text-align: center;">b b b</p> <p>a/ Gọi a,b là số mol mỗi muối trong hỗn hợp</p> $d_{X,Y/H_2} = \frac{44b + (9a+b).46}{(9a+b).2} = 22,805 \Rightarrow b = 2,877a$ <p>Chọn a=1, b=2,877 (mol) → Tìm m →</p> <p>Tính % → %FeS = 20,87%; %FeCO₃ = 79,13%</p> <p>b/ Phản ứng đime hóa NO₂:</p> $2\text{NO}_2 \leftrightarrow \text{N}_2\text{O}_4$ <p>n_{đầu} : 11,877a</p> <p>n_{pư} : 2x x</p> <p>n_{cb} : 11,877a-2x x , $n_{\text{CO}_2} = b$</p> $d_{X,Y,Z/H_2} = \frac{(11,877a-2x).46 + 44b + 92x}{(11,877a-2x+b+x).2} = 30,61$ <p>Thay b=2,877a ... → $\frac{x}{a} = 3,762 \Rightarrow x = 3,762a$</p> <p>Số mol NO₂ bị đime hóa là 2x →</p> $\frac{3,762a.2}{11,877a} = 63,35\%$ <p>%NO₂ bị đime hóa</p> <p>-Phản ứng đime hóa diễn ra khi làm lạnh và khi đó màu của hỗn hợp nhạt dần.</p> <p>- Cân bằng dịch về phải khi hạ nhiệt độ ⇒ Phản ứng đime hóa là tỏa nhiệt.</p>	2.50
Câu III		4,00 đ
1.	<p>1. Phân biệt các chất :</p> <p>a/ Dùng AgNO₃, đun nóng, benzyl bromua cho kết tủa vàng:</p> $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{Br} + \text{AgNO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH} + \text{AgBr} + \text{HNO}_3$ <p>b/ Dùng dung dịch AgNO₃/NH₃, phenylaxetilen cho kết tủa vàng xám :</p>	1.50

	$\text{C}_6\text{H}_5\text{C}\equiv\text{CH} + \text{AgNO}_3 + \text{NH}_3 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{C}\equiv\text{CAg} + \text{NH}_4\text{NO}_3$	
2.	<p>2. a/ Nếu ankin có dạng $\text{RC}\equiv\text{CH}$:</p> $\text{RC}\equiv\text{CH} + \text{AgNO}_3 + \text{NH}_3 \rightarrow \text{RC}\equiv\text{CAg} + \text{NH}_4\text{NO}_3$ $\Rightarrow n(\text{ankin}) = n(\text{AgNO}_3) = 6,8/170 = 0,04 \text{ mol}$ <p>Và $n(\text{Br}_2) > 2n(\text{ankin}) = 0,08 \text{ mol}$. Điều này trái với giả thiết: $n\text{Br}_2 = 0,06 \text{ mol}$</p> <p>Vậy ankin phải là C_2H_2 và như vậy ankan là C_2H_6, anken là C_2H_4.</p> <p>Từ phản ứng :</p> $\text{C}_2\text{H}_2 + 2\text{AgNO}_3 + 2\text{NH}_3 \rightarrow \text{C}_2\text{Ag}_2 + 2\text{NH}_4\text{NO}_3$ $\Rightarrow n(\text{C}_2\text{H}_2) = 1/2n(\text{AgNO}_3) = 0,02 \text{ mol}$ <p>Từ các phản ứng :</p> $\text{C}_2\text{H}_2 + 2\text{Br}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_2\text{Br}_4$ $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{Br}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4\text{Br}_2$ $\Rightarrow n(\text{C}_2\text{H}_4) = 0,02 \text{ mol}$ $\Rightarrow n(\text{C}_2\text{H}_6) = 0,02 \text{ mol}$ <p>b/ (1,0 điểm) Thổi hỗn hợp qua bình chứa dung dịch $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$ dư. Lọc tách kết tủa, hòa tan kết tủa trong dung dịch HCl dư thu được khí C_2H_2.</p> $\text{C}_2\text{H}_2 + 2\text{AgNO}_3 + 2\text{NH}_3 \rightarrow \text{C}_2\text{Ag}_2 + 2\text{NH}_4\text{NO}_3$ $\text{C}_2\text{Ag}_2 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_2 + 2\text{AgCl}$ <p>Khí ra khỏi bình chứa dung dịch $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$, thổi tiếp qua dung dịch nước brom dư. Chiết lấy sản phẩm và đun nóng với bột Zn (trong CH_3COOH) thu được C_2H_4 :</p> $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{Br}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4\text{Br}_2$ $\text{C}_2\text{H}_4\text{Br}_2 + \text{Zn} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4 + \text{ZnBr}_2$ <p>Khí ra khỏi bình chứa dung dịch brom là khí C_2H_6</p>	2.50
Câu IV		4,00 đ
	<p>Ankan A: $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ và Hidrocacbon B: C_nH_y</p> $n\text{CaCO}_3 = n\text{CO}_2 = 0,06 \text{ mol}$ $n = n_{\text{CO}_2}/n(\text{H.C}) = 0,06/0,01 = 6$ <p>A: C_6H_{14}</p> $\text{C}_6\text{H}_{14} + 19/2\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 7\text{H}_2\text{O}$	

	$CH_3CH_2\overset{+}{C}HCH_3 \xrightarrow{H_2O} CH_3CH_2CH(CH_3)\overset{+}{O}H_2 \xrightarrow{-H^+} CH_3CH_2CH(OH)CH_3$ $\searrow$ $CH_3CH_2CH(CH_3)\overset{+}{O}C_2H_5 \xrightarrow{-H^+} CH_3CH_2CH(CH_3)OC_2H_5$ <p style="text-align: center;"><i>H</i></p>	
3.	<p>Xác định công thức cấu tạo của A. Xác định số đồng phân lập thể (nếu có)</p> <p>Đặt A: C_xH_y</p> <p>$x : y = (88,235:12) : 11,765 = 10 : 16 \Rightarrow$ CT thực nghiệm $(C_{10}H_{16})_n$</p> <p>$M_A = 136 \Rightarrow$ CTPT A : $C_{10}H_{16}$ (số lk π + số vòng = 3)</p> <p>A tác dụng Br_2 theo tỉ lệ mol 1:2 $\Rightarrow$ A có 2 liên kết π và 1 vòng</p> <p>A không tác dụng với $AgNO_3/NH_3 \Rightarrow$ A không có nối ba đầu mạch</p> <p>Ozon phân hoàn toàn A tạo ra 2 sản phẩm hữu cơ : andehitfomic và 3-axetyl-6-on heptanal</p> <p>$\Rightarrow$ CTCT A:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">0,5đ</p> <p>A có 1 C^* nên số đồng phân lập thể là 2</p>	1.50

Nếu học sinh làm theo cách khác nhưng đúng vẫn cho điểm tối đa

-----Hết-----