


TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN

Câu 1: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ như hình vẽ bên dưới. Vector chỉ phương của đường thẳng AB là



- A. $\overrightarrow{AC}$. B. $\overrightarrow{BD}$. C. $\overrightarrow{CD}$. D. $\overrightarrow{A'D'}$.

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Biết rằng: $B(-1;1;3), C(-1;-1;2), D(1;0;-2), D'(2;-2;-3)$. Tìm một véc tơ chỉ phương của đường thẳng AA'

- A. $\vec{u} = (1;-2;1)$. B. $\vec{u} = (1;2;1)$. C. $\vec{u} = (-1;-2;1)$. D. $\vec{u} = (1;-2;-1)$.

$$d: \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 1 + 2t, (t \in \mathbb{R}) \\ z = 3 + t \end{cases}$$

Câu 3: Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, đường thẳng có một vector chỉ phương là

- A. $\vec{u}_1 = (-1;2;3)$. B. $\vec{u}_3 = (2;1;3)$. C. $\vec{u}_4 = (-1;2;1)$. D. $\vec{u}_2 = (2;1;1)$.

Câu 4: Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;1;0)$ và $B(0;1;2)$. Vector nào dưới đây là một vector chỉ phương của đường thẳng AB .

- A. $\vec{d} = (-1;1;2)$. B. $\vec{a} = (-1;0;-2)$. C. $\vec{b} = (-1;0;2)$. D. $\vec{c} = (1;2;2)$.

Câu 5: Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x}{-1} = \frac{y-4}{2} = \frac{z-3}{3}$. Vector nào say đây **không phải** là một vector chỉ phương của d ?

- A. $\vec{u}_1 = (-1;2;3)$. B. $\vec{u}_2 = (3;-6;-9)$. C. $\vec{u}_3 = (1;-2;-3)$. D. $\vec{u}_4 = (-2;4;3)$.

Câu 6: Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+1}{2}$ nhận véc tơ $\vec{u}(a;2;b)$ làm véc tơ chỉ phương. Tính $a+b$.

- A. -8 . B. 8 . C. 4 . D. -4 .

Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, tọa độ nào sau đây là tọa độ của một vectơ chỉ

phương của đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 1 - 6t, (t \in \mathbb{R}) \\ z = 9t \end{cases}$?

- A. $\left(\frac{1}{3}; \frac{-1}{2}; \frac{3}{4}\right)$ B. $\left(\frac{1}{3}; \frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right)$ C. $(2; 1; 0)$ D. $(4; -6; 0)$

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{3} = \frac{y-3}{4} = \frac{z+3}{-1}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d ?

- A. $\vec{u}_2 = (3; 4; -1)$ B. $\vec{u}_1 = (3; 4; 1)$ C. $\vec{u}_3 = (2; 3; -3)$ D. $\vec{u}_4 = (2; -3; 3)$

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(1; 0; 1)$ và $N(2; 1; 0)$. Đường thẳng MN có phương trình tham số là

- A. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 1 + t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 1 + t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = t \\ z = 1 + t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 1 - t \end{cases}$

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng Δ đi qua điểm $M(2; -3; 5)$ và song song với đường

thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3 - t \\ z = 4 + t \end{cases}$ có phương trình tham số là

- A. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -3 + 3t \\ z = 5 + 4t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = -2 + t \\ y = 3 + 3t \\ z = -5 + 4t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = 3 - t \\ z = -5 + t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -3 - t \\ z = 5 + t \end{cases}$

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng Δ đi qua điểm $M(1; -2; 0)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P): 2x - 3y - z + 2 = 0$ có phương trình tham số là

- A. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -3 - 2t \\ z = -t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 - 3t \\ z = -t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = -2 + 2t \\ z = -3t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 2t \\ y = -3t \\ z = -t \end{cases}$

Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $M(-1; -1; 2)$ và $N(1; 3; 4)$. Đường thẳng MN có phương trình chính tắc là

- A. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{4} = \frac{z+2}{2}$ B. $\frac{x+1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{1}$
C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+2}{1}$ D. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+3}{4} = \frac{z+4}{2}$

Câu 13: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;3)$ và đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+7}{-2}$. Đường thẳng đi qua A và song song với đường thẳng d có phương trình là:

A. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{-2}$

B. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{2}$

C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-2}{-2}$

D. $\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-3}{-2}$

Câu 14: Trong không gian $Oxyz$, cho d là đường thẳng đi qua điểm $A(1;2;3)$ và vuông góc với mặt phẳng $(\alpha): 4x + 3y - 7z + 1 = 0$. Phương trình chính tắc của d là

A. $\frac{x-1}{-4} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-3}{-7}$

B. $\frac{x-1}{4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{-7}$

C. $\frac{x-4}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z+7}{3}$

D. $\frac{x+1}{4} = \frac{y+2}{3} = \frac{z+3}{-7}$

Câu 15: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-4}{-5} = \frac{z+5}{3}$. Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng d ?

A. $M(3;4;-5)$

B. $N(2;-5;3)$

C. $P(-3;-4;5)$

D. $Q(2;5;-3)$

Câu 16: Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 - t \\ y = -1 + 2t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$ có một vector chỉ phương là:

A. $\vec{u}_1 = (2; -1; 3)$

B. $\vec{u}_2 = (-1; 2; 3)$

C. $\vec{u}_3 = (2; 1; 3)$

D. $\vec{u}_4 = (1; 2; 3)$

Câu 17: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+1}{3}$. Điểm nào dưới đây không thuộc d ?

A. $Q(2;1;-1)$

B. $M(1;3;2)$

C. $P(-1;3;-4)$

D. $N(4;-3;5)$

Câu 17: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-4}{-5} = \frac{z+1}{3}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d ?

A. $\vec{u}_2(2;4;-1)$

B. $\vec{u}_1(-2;5;-3)$

C. $\vec{u}_3(2;5;3)$

D. $\vec{u}_4(3;4;1)$

Câu 19: Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x}{-2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-3}{1}$ và $d_2: \begin{cases} x = 1 - 4t \\ y = -2 + 2t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. d_1 và d_2 cắt nhau B. d_1 và d_2 chéo nhau

C. $d_1 \equiv d_2$. D. $d_1 // d_2$.

Câu 20: Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-5}{m} (m \neq 0)$ và

$d_2: \begin{cases} x = 1-t \\ y = 2t \\ z = 3+t \end{cases}$. Hai đường thẳng d_1 và d_2 vuông góc với nhau khi m bằng

A. $m = -2$. B. $m = -4$. C. $m = -5$. D. $m = -3$.

Câu 21: Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng tương đối giữa 2 đường thẳng d và d' ?

$$d: \begin{cases} x = 1+2t \\ y = 2-2t \\ z = t \end{cases} \quad \text{và} \quad d': \begin{cases} x = -2t' \\ y = -5+3t' \\ z = 4+t' \end{cases}$$

A. Cắt nhau. B. song song. C. Trùng nhau. D. Chéo nhau.

Câu 22: Cho $d_1: \frac{x-1}{-2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-4}{3}$ và $d_2: \begin{cases} x = -1+t \\ y = -t \\ z = 2+mt \end{cases}$. Tìm m để d_1 và d_2 vuông góc với nhau

A. -1 . B. 1 . C. -2 . D. 2 .

Câu 23: Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d: \begin{cases} x = 3+t \\ y = 2-3t \\ z = 5+2t \end{cases}$ và $d': \begin{cases} x = 6-t' \\ y = 1-t' \\ z = 3+2t' \end{cases}$. Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng Δ và d là

A. $I(4; -1; 7)$. B. $H(3; 2; 5)$. C. $K(6; 1; 3)$. D. $J(3; -1; -2)$.

Câu 24: Trong không gian $Oxyz$, một viên đạn được bắn ra từ điểm $A(2; 1; -1)$ và trong 3 giây đầu đạn đi với vận tốc không đổi, vector vận tốc (trên giây) là $\vec{v} = (1; 3; -2)$. Hỏi viên đạn bắn trúng mục tiêu nằm ở điểm nào sau đây?

A. $M(4; 0; -2)$ B. $N(-1; 1; -3)$ C. $P(4; 7; -5)$ D. $Q(3; 9; -6)$

Câu 25: Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng (P) chứa hai đường thẳng cắt nhau

$$d: \begin{cases} x = 1+t \\ y = -1-t \\ z = 12-3t \end{cases} \quad \text{và} \quad d': \begin{cases} x = 1-t \\ y = 2+2t \\ z = 3 \end{cases}$$

A. $x-y+12z-15=0$ B. $6x+3y+z+15=0$ C. $x-y+12z+15=0$ D. $6x+3y+z-15=0$

$$d: \begin{cases} x=3+t \\ y=-1-2t \\ z=-1+t \end{cases} \quad \text{và} \quad d': \begin{cases} x=t \\ y=-2t \\ z=1+t \end{cases}$$

Câu 26: Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng: mặt phẳng (P) chứa d và d' là:

- A. $x+y+z-1=0$. B. $x+2y+z-2=0$. C. $x-y+z-1=0$. D. $x+y+z-4=0$.

Câu 27: Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-7}{1} = \frac{z-3}{4}$ và $d': \frac{x-6}{3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z+2}{1}$. Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng trên

- A. $A(-3;5;-5)$. B. $B(5;9;11)$. C. $C(9;-3;-1)$. D. $N(0;3;-4)$.

Câu 28: Trong không gian $Oxyz$, một viên đạn được bắn ra từ điểm $A(1;2;4)$ và trong ba giây, đầu đạn có vận tốc không đổi; véc tơ vận tốc (km/s) là $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$. Hỏi tại thời điểm sau 3 giây viên đạn có thể trúng mục tiêu là điểm nào trong các điểm sau đây?

- A. $P(1;3;5)$. B. $M(2;3;6)$. C. $N(-1;-3;5)$. D. $Q(-2;-3;5)$.

Câu 29: Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{3}$ và $d': \frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{-3}$ cắt nhau. Phương trình mặt phẳng (a) chứa hai đường $(d), (d')$

- A. $-x+2y-z+5=0$. B. $2x-y+4=0$.
C. $x-2y-5=0$. D. $-12x+6y+5=0$.

Câu 30: Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{-2}$ và $d': \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z}{-2}$. Phương trình mặt phẳng (a) chứa hai đường $(d), (d')$

- A. $-2x+3y-4z+8=0$. B. $x-2y+5=0$.
C. $2x-5y-4z-5=0$. D. $2x-5y-4z+8=0$.

Câu 31: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng $d: \frac{x+1}{-1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-1}{3}$?

- A. $P(-1;2;1)$. B. $Q(1;-2;-1)$. C. $N(-1;3;2)$. D. $R(1;2;1)$.

$$d: \begin{cases} x = t \\ y = 1 - t, (t \in \mathbb{R}) \\ z = 2 + t \end{cases}$$

Câu 32: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm nào sau đây?

- A. $K(1; -1; 1)$. B. $E(1; 1; 2)$. C. $H(1; 2; 0)$. D. $F(0; 1; 2)$.

Câu 33: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng d có phương trình $\frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{-4}$. Điểm nào sau đây **không** thuộc đường thẳng d ?

- A. $P(7; 2; 1)$. B. $Q(-2; -4; 7)$. C. $N(4; 0; -1)$. D. $M(1; -2; 3)$.

Câu 34: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - \sqrt{3}y + 1 = 0$. Tính góc tạo bởi (P) với trục Oy .

- A. 60° . B. 30° . C. 120° . D. 150° .

Câu 35: Góc giữa hai mặt phẳng $(P): x - 2y + z + 3 = 0$ và $(Q): x + y - 2z - 2 = 0$ bằng


- A. 30° . B. 90° . C. 45° . D. 60° .

Câu 36: Góc giữa hai đường thẳng $(d): \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 \\ z = 3 - t \end{cases}, (t \in \mathbb{R})$ và $(d'): \begin{cases} x = 1 + 2t' \\ y = -1 \\ z = 2 - 2t' \end{cases}, (t' \in \mathbb{R})$ bằng

- A. 0° . B. 45° . C. 30° . D. 60° .

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ như hình vẽ bên dưới. Vector chỉ phương của đường thẳng AB là



- A. $\overrightarrow{AC}$. B. $\overrightarrow{BD}$. C. $\overrightarrow{CD}$. D. $\overrightarrow{A'D'}$.

Lời giải

Mặt phẳng $(P): 2x - 3y + 5z - 1 = 0$ có một vector pháp tuyến là $\overrightarrow{n_2} = (2; -3; 5)$.

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Biết rằng:

$B(-1; 1; 3), C(-1; -1; 2), D(1; 0; -2), D'(2; -2; -3)$. Tìm một véc tơ chỉ phương của đường thẳng AA'

- A. $\vec{u} = (1; -2; 1)$. B. $\vec{u} = (1; 2; 1)$. C. $\vec{u} = (-1; -2; 1)$. D. $\vec{u} = (1; -2; -1)$.

Lời giải

$$\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{DD'} = (1; -2; -1)$$

Ta có

$$d: \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 1 + 2t, (t \in \mathbb{R}) \\ z = 3 + t \end{cases}$$

Câu 3: Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, đường thẳng có một vector chỉ phương là

- A. $\vec{u}_1 = (-1; 2; 3)$. B. $\vec{u}_3 = (2; 1; 3)$. C. $\vec{u}_4 = (-1; 2; 1)$. D. $\vec{u}_2 = (2; 1; 1)$.

Lời giải

$$d: \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 1 + 2t \\ z = 3 + t \end{cases} \text{ có một vector chỉ phương là } \vec{u}_4 = (-1; 2; 1) .$$

Câu 4: Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 1; 0)$ và $B(0; 1; 2)$. Vector nào dưới đây là một vector chỉ phương của đường thẳng AB .

- A. $\vec{d} = (-1; 1; 2)$. B. $\vec{a} = (-1; 0; -2)$. C. $\vec{b} = (-1; 0; 2)$. D. $\vec{c} = (1; 2; 2)$.

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{AB} = (-1; 0; 2)$ suy ra đường thẳng AB có VTCP là $\vec{b} = (-1; 0; 2)$.

Câu 5: Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x}{-1} = \frac{y-4}{2} = \frac{z-3}{3}$. Vector nào say đây **không phải** là một vector chỉ phương của d ?

- A. $\vec{u}_1 = (-1; 2; 3)$. B. $\vec{u}_2 = (3; -6; -9)$. C. $\vec{u}_3 = (1; -2; -3)$. D. $\vec{u}_4 = (-2; 4; 3)$.

Lời giải

Ta có một vector chỉ phương của d là $\vec{u}_1 = (-1; 2; 3)$.

$\vec{u}_2 = -3\vec{u}_1$, $\vec{u}_3 = -\vec{u}_1 \Rightarrow$ các vector $\vec{u}_2, \vec{u}_3$ cũng là vector chỉ phương của d .

Không tồn tại số k để $\vec{u}_4 = k\vec{u}_1$ nên $\vec{u}_4 = (-2; 4; 3)$ không phải là vector chỉ phương của d .

Câu 6: Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+1}{2}$ nhận véc tơ $\vec{u}(a; 2; b)$ làm véc tơ chỉ phương. Tính $a + b$.

- A. -8 . B. 8 . C. 4 . D. -4 .

Đường thẳng d có một véc tơ chỉ phương là $\vec{v}(2;1;2)$.

$\vec{u}(a;2;b)$ làm véc tơ chỉ phương của d suy ra $\vec{u}$ và $\vec{v}$ cùng phương nên

$$\frac{a}{2} = \frac{2}{1} = \frac{b}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} a=4 \\ b=4 \end{cases}$$

Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, tọa độ nào sau đây là tọa độ của một véc tơ chỉ

phương của đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x=2+4t \\ y=1-6t, (t \in \mathbb{R}) \\ z=9t \end{cases}$?

- A. $\left(\frac{1}{3}; -\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right)$ B. $\left(\frac{1}{3}; \frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right)$ C. $(2;1;0)$ D. $(4;-6;0)$

Lời giải

Δ suy ra véc tơ chỉ phương của Δ là $\vec{u} = (4; -6; 9) = 12\left(\frac{1}{3}; -\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right)$.

Từ phương trình

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{3} = \frac{y-3}{4} = \frac{z+3}{-1}$. Véc tơ nào dưới đây là một véc tơ chỉ phương của d ?

- A. $\vec{u}_2 = (3;4;-1)$ B. $\vec{u}_1 = (3;4;1)$ C. $\vec{u}_3 = (2;3;-3)$ D. $\vec{u}_4 = (2;-3;3)$

Lời giải

$d: \frac{x-2}{3} = \frac{y-3}{4} = \frac{z+3}{-1}$ có một véc tơ chỉ phương là $\vec{u}_2 = (3;4;-1)$

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(1;0;1)$ và $N(2;1;0)$. Đường thẳng MN có phương trình tham số là

- A. $\begin{cases} x=1+2t \\ y=2t \\ z=1+t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x=1+t \\ y=t \\ z=1+t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x=1-t \\ y=t \\ z=1+t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x=1+t \\ y=t \\ z=1-t \end{cases}$

Lời giải

Đường thẳng MN có véc tơ chỉ phương $\vec{MN} = (1;1;-1)$ và đi qua $M(1;0;1)$ nên có phương

trình tham số là $\begin{cases} x=1+t \\ y=t \\ z=1-t \end{cases}$

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng Δ đi qua điểm $M(2;-3;5)$ và song song với đường

thẳng $d: \begin{cases} x=1+2t \\ y=3-t \\ z=4+t \end{cases}$ có phương trình tham số là

- A. $\begin{cases} x=2+t \\ y=-3+3t \\ z=5+4t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x=-2+t \\ y=3+3t \\ z=-5+4t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x=-2+2t \\ y=3-t \\ z=-5+t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x=2+2t \\ y=-3-t \\ z=5+t \end{cases}$.

Lời giải

Đường thẳng Δ song song với đường thẳng d nên có vector chỉ phương $\vec{u}_{\Delta} = \vec{u}_d = (2; -1; 1)$

, và đi qua $M(2;-3;5)$ nên có phương trình tham số là $\begin{cases} x=2+2t \\ y=-3-t \\ z=5+t \end{cases}$.

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng Δ đi qua điểm $M(1;-2;0)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P): 2x-3y-z+2=0$ có phương trình tham số là

- A. $\begin{cases} x=2+t \\ y=-3-2t \\ z=-t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x=1+2t \\ y=-2-3t \\ z=-t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x=1-t \\ y=-2+2t \\ z=-3t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x=2t \\ y=-3t \\ z=-t \end{cases}$.

Lời giải

Đường thẳng Δ vuông góc với mặt phẳng (P) nên có vector chỉ phương

$\vec{u}_{\Delta} = \vec{n}_{(P)} = (2; -3; -1)$, và đi qua $M(1;-2;0)$ nên có phương trình tham số là $\begin{cases} x=1+2t \\ y=-2-3t \\ z=-t \end{cases}$.

Câu 12: Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho hai điểm $M(-1;-1;2)$ và $N(1;3;4)$. Đường thẳng MN có phương trình chính tắc là

- A. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{4} = \frac{z+2}{2}$. B. $\frac{x+1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{1}$.
C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+2}{1}$. D. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+3}{4} = \frac{z+4}{2}$.

Lời giải

Ta có đường thẳng MN đi qua điểm $M(-1;-1;2)$ và nhận $\vec{MN} = (2; 4; 2)$ làm véc tơ chỉ

phương nên có phương trình chính tắc là: $\frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-2}{2} \Leftrightarrow \frac{x+1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{1}$.

Câu 13: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;3)$ và đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+7}{-2}$. Đường thẳng đi qua A và song song với đường thẳng d có phương trình là:

- A. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{-2}$ B. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{2}$
- C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-2}{-2}$ D. $\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-3}{-2}$

Lời giải

Đường thẳng đi qua A và song song với d nên có một vector chỉ phương là $\vec{u} = (2; 1; -2)$.

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{-2}$$

Phương trình đường thẳng cần tìm:

Câu 14: Trong không gian $Oxyz$, cho d là đường thẳng đi qua điểm $A(1;2;3)$ và vuông góc với mặt phẳng $(\alpha): 4x + 3y - 7z + 1 = 0$. Phương trình chính tắc của d là

- A. $\frac{x-1}{-4} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-3}{-7}$ B. $\frac{x-1}{4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{-7}$
- C. $\frac{x-4}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z+7}{3}$ D. $\frac{x+1}{4} = \frac{y+2}{3} = \frac{z+3}{-7}$

Lời giải

Ta có $(\alpha): 4x + 3y - 7z + 1 = 0 \Rightarrow \vec{n}_{(\alpha)} = (4; 3; -7)$ là VTPT của mặt phẳng (α) .

Mà đường thẳng $d \perp (\alpha) \Rightarrow \vec{n}_{(\alpha)} = (4; 3; -7)$ là VTCP của đường thẳng d .

Ta lại có $A(1;2;3) \in d$.

Suy ra phương trình chính tắc của đường thẳng d là: $\frac{x-1}{4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{-7}$.

Câu 15: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-4}{-5} = \frac{z+5}{3}$. Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng d ?

- A. $M(3; 4; -5)$ B. $N(2; -5; 3)$ C. $P(-3; -4; 5)$ D. $Q(2; 5; -3)$

Lời giải

Thay tọa độ của điểm $M(3; 4; -5)$ vào phương trình đường thẳng d ta có

$$\frac{3-3}{2} = \frac{4-4}{-5} = \frac{-5+5}{3}.$$

Do đó $M \in d$

- Câu 16:** Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 - t \\ y = -1 + 2t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$ có một vector chỉ phương là:
- A. $\vec{u}_1 = (2; -1; 3)$. B. $\vec{u}_2 = (-1; 2; 3)$. C. $\vec{u}_3 = (2; 1; 3)$. D. $\vec{u}_4 = (1; 2; 3)$.

Lời giải

Đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 - t \\ y = -1 + 2t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$ có một vector chỉ phương là $\vec{u}_2 = (-1; 2; 3)$.

- Câu 17:** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+1}{3}$. Điểm nào dưới đây không thuộc d ?
- A. $Q(2; 1; -1)$. B. $M(1; 3; 2)$. C. $P(-1; 3; -4)$. D. $N(4; -3; 5)$.

Lời giải

Ta có: $\frac{2-2}{1} = \frac{1-1}{-2} = \frac{-1+1}{3} = 0$ (đúng)

$\frac{1-2}{1} = \frac{3-1}{-2} = \frac{2+1}{3}$ (Sai)

$\frac{1-2}{1} = \frac{3-1}{-2} = \frac{-4+1}{3}$ (đúng)

$\frac{4-2}{1} = \frac{-3-1}{-2} = \frac{5+1}{3}$ (đúng)

Do đó chọn B

- Câu 17:** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-4}{-5} = \frac{z+1}{3}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d ?
- A. $\vec{u}_2(2; 4; -1)$. B. $\vec{u}_1(-2; 5; -3)$. C. $\vec{u}_3(2; 5; 3)$. D. $\vec{u}_4(3; 4; 1)$.

Lời giải

Đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-4}{-5} = \frac{z+1}{3}$ có một vector chỉ phương là $\vec{u}_1(-2; 5; -3)$

- Câu 19:** Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x}{-2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-3}{1}$ và $d_2: \begin{cases} x = 1 - 4t \\ y = -2 + 2t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$.
 Khẳng định nào sau đây đúng?
A. d_1 và d_2 cắt nhau **B.** d_1 và d_2 chéo nhau
C. $d_1 \equiv d_2$. **D.** $d_1 // d_2$.

Lời giải

Đường thẳng $d_1: \frac{x}{-2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-3}{1}$ có vector chỉ phương $\vec{u}_1 = (-2; 1; 1)$ và đi qua điểm $A(0; -1; 3)$.

Đường thẳng $d_2: \begin{cases} x = 1 - 4t \\ y = -2 + 2t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$ có vector chỉ phương $\vec{u}_2 = (-4; 2; 2)$.

Ta có $\vec{u}_1 = \frac{1}{2} \vec{u}_2$ và $A \notin d_2$. Do đó $d_1 // d_2$.

- Câu 20:** Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-5}{m} (m \neq 0)$ và $d_2: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2t \\ z = 3 + t \end{cases}$. Hai đường thẳng d_1 và d_2 vuông góc với nhau khi m bằng
A. $m = -2$. **B.** $m = -4$. **C.** $m = -5$. **D.** $m = -3$.

Lời giải

Đường thẳng $d_1: \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-5}{m} (m \neq 0)$ có vector chỉ phương $\vec{u}_1 = (3; 4; m)$.

Đường thẳng $d_2: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2t \\ z = 3 + t \end{cases}$ có vector chỉ phương $\vec{u}_2 = (-1; 2; 1)$.

Để $d_1 \perp d_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = 0 \Leftrightarrow 3 \cdot (-1) + 4 \cdot 2 + m \cdot 1 = 0 \Leftrightarrow m = -5$

- Câu 21:** Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - 2t \\ z = t \end{cases}$ và $d': \begin{cases} x = -2t' \\ y = -5 + 3t' \\ z = 4 + t' \end{cases}$. Xét vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng d và d' ?

A. Cắt nhau.

B. song song.

C. Trùng nhau.

D. Chéo nhau.

Lời giải

d có VTCP $\vec{u} = (2; -2; 1)$ và đi qua $M(1; 2; 0)$.

d' có VTCP $\vec{u}' = (-2; 3; 1)$ và đi qua $M'(0; -5; 4)$.

Từ đó ta có:

$$\overrightarrow{MM'} = (-1; -7; 4) \text{ và } [\vec{u}, \vec{u}'] = \begin{vmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -2 \end{vmatrix} = (-5; -4; 2) \neq \vec{0}$$

$$\text{Lại có } [\vec{u}, \vec{u}'] \cdot \overrightarrow{MM'} = (-1) \cdot (-5) + (-7) \cdot (-4) + 4 \cdot 2 = 41 \neq 0$$

Suy ra d chéo nhau với d' .

Câu 22: Cho $d_1: \frac{x-1}{-2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-4}{3}$ và $d_2: \begin{cases} x = -1+t \\ y = -t \\ z = 2+mt \end{cases}$. Tìm m để d_1 và d_2 vuông góc với nhau

A. -1.

B. 1.

C. -2.

D. 2.

Lời giải

Ta có $\vec{n}_1 = (-2; 1; 3), \vec{u}_2 = (1; -1; m)$

$$d_1 \perp d_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = 0 \Leftrightarrow -2 - 1 + 3m = 0 \Leftrightarrow m = 1$$

Câu 23: Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 3+t \\ y = 2-3t \\ z = 5+2t \end{cases}$ và $d: \begin{cases} x = 6-t' \\ y = 1-t' \\ z = 3+2t' \end{cases}$. Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng Δ và d là

A. $I(4; -1; 7)$.

B. $H(3; 2; 5)$.

C. $K(6; 1; 3)$.

D. $J(3; -1; -2)$.

Lời giải

$$\text{Xét hệ phương trình } \begin{cases} 3+t = 6-t' \\ 2-3t = 1-t' \\ 5+2t = 3+2t' \end{cases} \text{ có nghiệm } (t; t') = (1; 2).$$

Vậy tọa độ giao điểm của hai đường thẳng Δ và d là $I(4; -1; 7)$

Câu 24: Trong không gian $Oxyz$, một viên đạn được bắn ra từ điểm $A(2; 1; -1)$ và trong 3 giây đầu đạn đi với vận tốc không đổi, vector vận tốc (trên giây) là $\vec{v} = (1; 3; -2)$. Hỏi viên đạn bắn trúng mục tiêu nằm ở điểm nào sau đây?

A. $M(4;0;-2)$

B. $N(-1;1;-3)$

C. $P(4;7;-5)$

D. $Q(3;9;-6)$

Lời giải

$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 + 3t \\ z = -1 - 2t \end{cases}$$

Phương trình mô tả quỹ đạo chuyển động của viên đạn là

Lần lượt thay tọa độ các điểm vào phương trình quỹ đạo chuyển động của viên đạn ta thấy tọa độ các điểm M, N, Q không thỏa mãn phương trình. Do đó viên đạn không bắn trúng mục tiêu ở các điểm này.

Thay tọa độ điểm P vào phương trình mô tả quỹ đạo chuyển động của viên đạn ta có

$$\begin{cases} 4 = 2 + t \\ 7 = 1 + 3t \\ -5 = -1 - 2t \end{cases} \Leftrightarrow t = 2$$

Vậy viên đạn bắn trúng mục tiêu đặt ở điểm P .

Câu 25: Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng (P) chứa hai đường thẳng cắt nhau

$$d: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 - t \\ z = 12 - 3t \end{cases} \quad d': \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 + 2t \\ z = 3 \end{cases} \quad \text{và} \quad \text{là:}$$

A. $x - y + 12z - 15 = 0$
 $6x + 3y + z - 15 = 0$

B. $6x + 3y + z + 15 = 0$

C. $x - y + 12z + 15 = 0$

D.

Lời giải

Đường thẳng d và d' có vector chỉ phương lần lượt là $\vec{u}_d = (1; -1; -3)$ và $\vec{u}_{d'} = (-1; 2; 0)$

Mặt phẳng (P) chứa hai đường thẳng cắt nhau d và d' nên có vector pháp tuyến là $\vec{n}_P = [\vec{u}_d; \vec{u}_{d'}] = (6; 3; 1)$

$$d: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 - t \\ z = 12 - 3t \end{cases}$$

Mặt khác, mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d nên mặt phẳng (P) chứa điểm $M(1; -1; 12)$

Vậy phương trình mặt phẳng (P) là: $6(x-1) + 3(y+1) + 1(z-12) = 0 \Leftrightarrow 6x + 3y + z - 15 = 0$

$$d: \begin{cases} x = 3 + t \\ y = -1 - 2t \\ z = -1 + t \end{cases} \quad d': \begin{cases} x = t \\ y = -2t \\ z = 1 + t \end{cases}$$

Câu 26: Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng:

mặt phẳng (P) chứa d và d' là:

A. $x + y + z - 1 = 0$. B. $x + 2y + z - 2 = 0$. C. $x - y + z - 1 = 0$. D. $x + y + z - 4 = 0$.

Lời giải

Đường thẳng d và d' lần lượt chứa hai điểm $M(3; -1; -1)$ và $N(0; 0; 1)$.

Ta có $\overrightarrow{MN} = (-3; 1; 2)$, vector chỉ phương của đường thẳng d là $\overrightarrow{u_d} = (1; -2; 1)$.

Mặt phẳng (P) chứa hai đường thẳng d và d' nên có vector pháp tuyến là

$\overrightarrow{n_P} = [\overrightarrow{u_d}; \overrightarrow{MN}] = (-5; -5; -5)$ hay có vector pháp tuyến là $\overrightarrow{n_P} = (1; 1; 1)$.

Mặt khác, mặt phẳng (P) chứa đường thẳng $d: \begin{cases} x = 3 + t \\ y = -1 - 2t \\ z = -1 + t \end{cases}$ nên mặt phẳng (P) chứa điểm $M(3; -1; -1)$.

Vậy phương trình mặt phẳng (P) là: $x + y + z - 1 = 0$.

Câu 27: Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-7}{1} = \frac{z-3}{4}$ và

$d': \frac{x-6}{3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z+2}{1}$. Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng trên

A. $A(-3; 5; -5)$. B. $B(5; 9; 11)$. C. $C(9; -3; -1)$. D. $N(0; 3; -4)$.

Lời giải

Ta có Tọa độ của A thỏa mãn cả hai phương trình đường thẳng. Do đó A là giao điểm của hai đường thẳng

Câu 28: Trong không gian $Oxyz$, một viên đạn được bắn ra từ điểm $A(1; 2; 4)$ và trong ba giây, đầu đạn có

vận tốc không đổi; véc tơ vận tốc (km/s) là $\vec{v} = \left(\frac{2}{3}; \frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right)$. Hỏi tại thời điểm sau 3 giây viên đạn có thể trúng mục tiêu là điểm nào trong các điểm sau đây?

A. $P(1; 3; 5)$. B. $M(2; 3; 6)$. C. $N(-1; -3; 5)$. D. $Q(-2; -3; 5)$.

Lời giải

Cách 1:

Ta có: Trong thời gian từ 0 đến 3 giây phương trình mô tả quỹ đạo chuyển động của viên đạn là:

$$d: \begin{cases} x = 1 + \frac{1}{3}t \\ y = 2 + \frac{1}{3}t \\ z = 4 + \frac{2}{3}t \end{cases}$$

với $t = 3$ ta được điểm $M(2; 3; 6)$.

Cách 2: Sau 3 giây viên đạn sẽ tới mục tiêu là điểm M sao cho $\overline{AM} = 3v$

$$\text{P} \begin{cases} x_M = 1 + 1 = 2 \\ y_M = 2 + 1 = 3 \\ z_M = 4 + 2 = 6 \end{cases} \text{P} \quad M(2; 3; 6)$$

Câu 29: Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{3}$ và $d': \frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{-3}$ cắt nhau. Phương trình mặt phẳng (α) chứa hai đường $(d), (d')$

A. $-x + 2y - z + 5 = 0$

B. $2x - y + 4 = 0$

C. $x - 2y - 5 = 0$

D. $-12x + 6y + 5 = 0$

Lời giải

Ta có $\overline{u_d} = (1; 2; 3), \overline{u_{d'}} = (1; 2; -3) \Rightarrow \overline{n_\alpha} = [\overline{u_d}, \overline{u_{d'}}] = (-12; 6; 0)$

Mặt khác (α) qua $M_0(-1; 2; -1) \Rightarrow (\alpha): -12(x+1) + 6(y-2) + 0(z+1) = 0$

$$\Leftrightarrow (\alpha): 2x - y + 4 = 0$$

Câu 30: Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{-2}$ và $d': \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z}{-2}$. Phương trình mặt phẳng (α) chứa hai đường $(d), (d')$

A. $-2x + 3y - 4z + 8 = 0$

B. $x - 2y + 5 = 0$

C. $2x - 5y - 4z - 5 = 0$

D. $2x - 5y - 4z + 8 = 0$

Lời giải

Ta có $(d) \cap (d') \Rightarrow \overline{u_d} = (1; 2; -2), M_0(-1; 2; -1) \in d; M_{0'}(1; 2; 0) \in d'$

$$\Rightarrow \overline{n_\alpha} = [\overline{u_d}, \overline{M_0M_{0'}}] = (2; -5; -4)$$

Mặt khác (α) qua $M_0(-1;2;-1) \Rightarrow (\alpha): 2(x+1) - 5(y-2) - 4(z+1) = 0$

$$\Leftrightarrow (\alpha): 2x - 5y - 4z + 8 = 0$$

Câu 31: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng $d: \frac{x+1}{-1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-1}{3}$?

- A.** $P(-1;2;1)$ **B.** $Q(1;-2;-1)$ **C.** $N(-1;3;2)$ **D.** $R(1;2;1)$

Lời giải

Thay tọa độ các điểm vào phương trình đường thẳng ta thấy điểm $P(-1;2;1)$ thỏa $\frac{-1+1}{-1} = \frac{2-2}{3} = \frac{1-1}{3} = 0$. Vậy điểm $P(-1;2;1)$ thuộc đường thẳng d .

$$d: \begin{cases} x = t \\ y = 1 - t, (t \in \mathbb{R}) \\ z = 2 + t \end{cases}$$

Câu 32: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm nào sau đây?

- A.** $K(1;-1;1)$ **B.** $E(1;1;2)$ **C.** $H(1;2;0)$ **D.** $F(0;1;2)$

Lời giải

Thay tọa độ của $K(1;-1;1)$ vào PTTS của d ta được $\begin{cases} 1 = t \\ -1 = 1 - t \\ 1 = 2 + t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = 2 \\ t = -1 \end{cases}$ không tồn tại t .

Do đó, $K \notin d$.

Thay tọa độ của $E(1;1;2)$ vào PTTS của d ta được $\begin{cases} 1 = t \\ 1 = 1 - t \\ 2 = 2 + t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = 0 \\ t = 0 \end{cases}$ không tồn tại t .

Do đó, $E \notin d$.

Thay tọa độ của $H(1;2;0)$ vào PTTS của d ta được $\begin{cases} 1 = t \\ 2 = 1 - t \\ 0 = 2 + t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = -1 \\ t = -2 \end{cases}$ không tồn tại t .

Do đó, $H \notin d$.

$$\begin{cases} 0 = t \\ 1 = 1 - t \\ 2 = 2 + t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = 0 \\ t = 0 \end{cases} \Leftrightarrow t = 0.$$

Thay tọa độ của $F(0;1;2)$ vào PTTS của d ta được

Câu 33: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng d có phương trình $\frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{-4}$. Điểm nào sau đây **không** thuộc đường thẳng d ?

- A.** $P(7;2;1)$. **B.** $Q(-2;-4;7)$. **C.** $N(4;0;-1)$. **D.** $M(1;-2;3)$.

Lời giải

Thay tọa độ điểm $P(7;2;1)$ vào phương trình đường thẳng d ta có $\frac{7-1}{3} = \frac{2+2}{2} \neq \frac{1-3}{-4}$ nên điểm $P(7;2;1) \notin d$.

Câu 34: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - \sqrt{3}y + 1 = 0$. Tính góc tạo bởi (P) với trục Oy .

- A.** 60° . **B.** 30° . **C.** 120° . **D.** 150° .

Lời giải

Mặt phẳng (P) có véc tơ pháp tuyến là $\vec{n} = (1; -\sqrt{3}; 0)$; trục Oy có véc tơ chỉ phương $\vec{j} = (0; 1; 0)$.

$$\sin((P); Oy) = \left| \cos(\vec{n}; \vec{j}) \right| = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{j}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{j}|} = \frac{|-\sqrt{3}|}{\sqrt{4} \cdot \sqrt{1}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow ((P); Oy) = 60^\circ.$$

Ta có:

Câu 35: Góc giữa hai mặt phẳng $(P) x - 2y + z + 3 = 0$ và $(Q) x + y - 2z - 2 = 0$ bằng

- A.** 30° . **B.** 90° . **C.** 45° . **D.** 60° .

Lời giải

Mặt phẳng $x - 2y + z + 3 = 0$ có một vector pháp tuyến $\vec{n}_1 = (1; -2; 1)$.

Mặt phẳng $x + y - 2z - 2 = 0$ có một vector pháp tuyến $\vec{n}_2 = (1; 1; -2)$.

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{|1 - 2 - 2|}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{6}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = 60^\circ$$

Gọi α là góc giữa hai mặt phẳng. Khi đó

$$(d): \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 \\ z = 3 - t \end{cases}, (t \in \mathbb{R}) \quad \text{và} \quad (d'): \begin{cases} x = 1 + 2t' \\ y = -1 \\ z = 2 - 2t' \end{cases}, (t' \in \mathbb{R})$$

Câu 36: Góc giữa hai đường thẳng (d) và (d') bằng

A. 0° .B. 45° .C. 30° .D. 60° .

Lời giải

Đường thẳng (d) có một vector chỉ phương là $\vec{a}_d = (1; 0; -1)$.

Đường thẳng (d') có một vector chỉ phương $\vec{a}_{d'} = (2; 0; -2)$.

Ta thấy $\vec{a}_{d'} = 2\vec{a}_d$ nên 2 vector $\vec{a}_{d'}, \vec{a}_d$ cùng phương $\Rightarrow d \parallel d'$ hoặc $d \equiv d'$.

Do đó góc giữa d và d' bằng 0° .