

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6,0 điểm)

Hãy chọn phương án trả lời đúng rồi ghi vào bài làm.

Câu 1. Cho số hữu tỉ x thỏa mãn $(x+1)^3 = 125$ giá trị của $\sqrt{x}$ là

- A. 16. B. 2. C. 8. D. 4.

Câu 2. Số các giá trị nguyên của x thỏa mãn $(2x-1)^6 = (2x-1)^8$ là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 3. Cho $5x = 3y$. Giá trị của biểu thức $A = \frac{8x^2 + 3y^2 - 2xy}{10x^2 - 3y^2}$ là

- A. $\frac{9}{7}$. B. $\frac{39}{25}$. C. $\frac{197}{223}$. D. $\frac{39}{5}$.

Câu 4. Cho $\triangle ABC$ có độ dài các cạnh là a, b, c tỉ lệ thuận với ba số 6; 8; 11 và $c^2 - a^2 = 340$. Chu vi của tam giác ABC là

- A. 20cm. B. 25cm. C. 40cm. D. 50cm.

Câu 5. Cho đa thức $f(x) = x^2 + ax + b$. Biết $f(x)$ chia hết cho $x+3$ và $f(x)$ chia hết cho $x-4$. Khi đó $2a-3b$ có giá trị là


- A. 38. B. 34. C. 21. D. -27.

Câu 6. Cho biết $x^3 - 2x + 3 = 0$. Giá trị của biểu thức $P(x) = -5x^4 + 10x^2 - 15x + 1$ là

- A. $P(x) = 0$. B. $P(x) = 1$. C. $P(x) = -5$. D. $P(x) = -6$.

 $a \parallel b$ **Câu 7.** Cho $a \parallel b$ như hình vẽ bên. Số đo góc x bằng:

- A. 150° . B. 90° .
C. 60° . D. 30° .

**Câu 8.** Tam giác ABC có $\angle A = 40^\circ; \angle B - \angle C = 20^\circ$. Trên tia đối của tia AC lấy điểm E sao cho $AE = AB$. Số đo $\angle EBE$ là

- A. 80° . B. 100° . C. 90° . D. 120° .

Câu 9. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A . Trên cạnh BC lấy 2 điểm D và E sao cho $BD = BA; CE = CA$. Khi đó $\angle DAE$ có số đo là

- A. 20° . B. 30° . C. 45° . D. 60° .

Câu 10. Cho $\triangle ABC$ có $\angle ABC = 70^\circ; \angle ACB = 50^\circ$. Gọi H là chân đường vuông góc hạ từ B . Khẳng định nào sau đây đúng
A. $HB < HC$. **B.** $HB > HC$. **C.** $HB = HC$. **D.** $\angle BAC = 70^\circ$.

Câu 11. Cho tam giác ABC ($AB < AC$). Vẽ AD là tia phân giác góc A ($D \in BC$). Gọi E và I lần lượt là các hình chiếu của D trên cạnh AB, AC . Khẳng định nào sau đây đúng

A. $\triangle AED = \triangle AID$. **B.** $\triangle BED = \triangle CID$. **C.** $\triangle ADB = \triangle ADC$. **D.** $\triangle AED = \triangle BED$.

Câu 12. Trong thư viện có 9 quyển sách gồm 3 quyển Toán giống nhau, 3 quyển Ngữ Văn giống nhau, 3 quyển Tiếng Anh giống nhau. Xác suất để chọn được một quyển sách không phải Toán là

A. $\frac{1}{9}$. **B.** $\frac{1}{3}$. **C.** $\frac{1}{2}$. **D.** $\frac{2}{3}$.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (14,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm)

- Tìm các số nguyên dương x, y sao cho $2x - xy + 3y = 9$.
- Tìm các số nguyên m để $(m+1)(m^2+2m)$ là một số chính phương.

Câu 2 (4,0 điểm)

- Cho 3 số $a; b; c$ thỏa mãn $\frac{a}{2021} = \frac{b}{2022} = \frac{c}{2023}$. Chứng minh rằng $(a-c)^3 = 8(a-b)^2 \cdot (b-c)$.
- Cho đa thức $A(x) = x^3 - x^2 + ax + b - 2$ và $B(x) = x^2 - 2x + 3$ (với $a; b \in \mathbb{R}$).

Xác định hệ số $a; b$ để $A(x)$ chia cho $B(x)$ có số dư bằng 6.

Câu 3 (5,0 điểm)

Cho tam giác ABC cân tại A ($\angle A < 90^\circ$). Gọi I là trung điểm của AB , các điểm N, M lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ A, B đến đường thẳng CI . Trên đoạn thẳng CI lấy điểm E sao cho $\angle EAB = \angle ECA$. Kẻ $BH \perp AE$ (H thuộc đường thẳng AE).

a) Chứng minh rằng $\triangle ANI = \triangle BMI$, rồi từ đó suy ra $AM \parallel BN$.

b) Chứng minh rằng BE là phân giác của góc $\angle MBH$.

$$\widehat{ECA} = \widehat{EBC}.$$

c) Chứng minh rằng

Câu 4 (2,0 điểm)

$$P = \frac{|x - 2022| - |x - 2023| + |x - 2024| + 2022}{|x - 2022| + |x - 2023| + |x - 2024|}.$$

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

----- Hết -----

- Họ và tên thí sinh : Số báo danh

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

LỚP 7 THCS NĂM HỌC 2022 – 2023

Môn: Toán

HƯỚNG DẪN CHẤM CHÍNH THỨC

(Hướng dẫn chấm có 06 trang)

I. Một số chú ý khi chấm bài tự luận

- Hướng dẫn chấm thi dưới đây dựa vào lời giải sơ lược của một cách. Khi chấm thi giám khảo cần bám sát yêu cầu trình bày lời giải đầy đủ, chi tiết, hợp logic và có thể chia nhỏ đến 0,25 điểm.
- Thí sinh làm bài theo cách khác với hướng dẫn chấm mà đúng thì tổ chấm cần thông nhất cho điểm tương ứng với thang điểm của hướng dẫn chấm.
- Điểm bài thi là tổng điểm các câu không làm tròn số.

II. Đáp án – Thang điểm

1. Phần trắc nghiệm khách quan: Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.


Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	B	B	D	D	B	B	C	B	C	B	A	D

II. Tự luận (14,0 điểm)

Nội dung	Điểm
Câu 1 (3,0 điểm)	
1) Tìm các số nguyên dương x, y sao cho : $2x - xy + 3y = 9$.	1,5
Từ : $2x - xy + 3y = 9$ $\Rightarrow (2 - y)x + 3(y - 2) = 3 \Leftrightarrow (2 - y)(x - 3) = 3$	0,5
Suy ra $3 \mid (x - 3) \Rightarrow (x - 3)$ là ước của 3. $(x - 3) \in \{-3; -1; 1; 3\}$	0,25

Ta có bảng					0,5
$x-3$	-3	-1	1	3	
$2-y$	-1	-3	3	1	
x	0	2	4	6	
y	3	5	-1	1	
	Loại	T/m	Loại	T/m	
Vậy cặp số $(x=2; y=5)$ hoặc $(x=6; y=1)$ như trên thoả mãn điều kiện đề bài.					0,25
2. Tìm các số nguyên m để $(m+1)(m^2+2m)$ là một số chính phương.					1,5
<p>Ta có $(m+1)(m^2+2m)$ là một số chính phương.</p> <p>$(m+1)(m^2+2m) = k^2 \ (k \in \mathbb{Z})$</p> <p>Suy ra</p> <p>$k^2 \geq 0 \Rightarrow (m+1)(m^2+2m) \geq 0$</p> <p>Vì</p> <p>$m < -2 \Rightarrow (m+1)(m^2+2m) < 0$</p> <p>Với (loại)</p> <p>$m \in \{-2; -1; 0\}$</p> <p>Với $k^2 = 0$ ta đều có (thoả mãn)</p>					0,5
<p>Với $m > 0$ ta có $k^2 = (m+1)(m^2+2m)$</p> <p>Gọi d là một ước chung nguyên tố của $m+1$ và m^2+2m</p> <p>$\begin{cases} m+1 : d \\ m^2+2m : d \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m+1 : d \\ m : d \end{cases} \Rightarrow 1 : d \Rightarrow d = 1$</p> <p>Suy ra</p>					0,5
Nên $(m+1)(m^2+2m)$ là một số chính phương khi $m+1$ và m^2+2m đều là số chính phương.					0,25
<p>Để m^2+2m là số chính phương thì $m^2+2m = a^2 \ (a \in \mathbb{Z})$.</p> <p>$(m+1)^2 - 1 = a^2 \Rightarrow (m+1+a)(m+1-a) = 1 \Rightarrow m+1+a = m+1-a \Rightarrow a = 0$</p> <p>Suy ra</p> <p>$\Rightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = -2 \end{cases}$ (không thoả mãn)</p>					0,25

<p>$m \in \{-2; -1; 0\}$ thì $(m+1)(m^2+2m)$ là một số chính phương.</p>											
<p>Câu 2: (4 điểm)</p> <p>1. Cho 3 số $a; b; c$ thỏa mãn: $\frac{a}{2021} = \frac{b}{2022} = \frac{c}{2023}$.</p> <p>Chứng minh rằng: $(a-c)^3 = 8(a-b)^2 \cdot (b-c)$</p>	2,0										
<p>Ta có $\frac{a}{2021} = \frac{b}{2022} = \frac{c}{2023} \Rightarrow \frac{a-c}{2021-2023} = \frac{a-b}{2021-2022} = \frac{b-c}{2022-2023}$</p>	0,5										
<p>$\Rightarrow \frac{a-c}{-2} = \frac{a-b}{-1} = \frac{b-c}{-1}$</p>	0,5										
<p>$\Rightarrow \left(\frac{a-c}{-2}\right)^3 = \left(\frac{a-b}{-1}\right)^2 \cdot \left(\frac{b-c}{-1}\right) \Rightarrow \frac{(a-c)^3}{(-2)^3} = \frac{(a-b)^2}{(-1)^2} \cdot \left(\frac{b-c}{-1}\right)$</p>	0,5										
<p>$\Rightarrow (a-c)^3 = 8(a-b)^2(b-c)$</p>	0,5										
<p>2. Cho đa thức $A(x) = x^3 - ax^2 + x + b - 2$ và $B(x) = x^2 - 2x + 3$ (với $a; b \in R$).</p> <p>Xác định hệ số $a; b$ để $A(x)$ chia cho $B(x)$ có số dư bằng 6.</p>	2,0										
<p>Ta có</p>											
<table border="1"> <tr> <td>$x^3 - x^2 + ax + b - 2$</td><td>$x^2 - 2x + 3$</td></tr> <tr> <td>$x^3 - 2x^2 + 3x$</td><td>$x + 1$</td></tr> <tr> <td>$x^2 + (a-3)x + b-2$</td><td></td></tr> <tr> <td>$x^2 - 2x + 3$</td><td></td></tr> <tr> <td>$(a-1)x + b-5$</td><td></td></tr> </table>	$x^3 - x^2 + ax + b - 2$	$x^2 - 2x + 3$	$x^3 - 2x^2 + 3x$	$x + 1$	$x^2 + (a-3)x + b-2$		$x^2 - 2x + 3$		$(a-1)x + b-5$		1,0
$x^3 - x^2 + ax + b - 2$	$x^2 - 2x + 3$										
$x^3 - 2x^2 + 3x$	$x + 1$										
$x^2 + (a-3)x + b-2$											
$x^2 - 2x + 3$											
$(a-1)x + b-5$											
<p>Để $A(x)$ chia cho $B(x)$ có số dư bằng 6 thì $\begin{cases} a-1=0 \\ b-5=6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=11 \end{cases}$</p>	0,75										
<p>Vậy $a=1; b=11$</p>	0,25										
<p>Câu 3: (5,0 điểm)</p> <p>Cho tam giác ABC cân tại A ($\angle A < 90^\circ$). Gọi I là trung điểm của AB. Các điểm $N; M$ lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ I đến đường thẳng BC.</p> <p>Trên đoạn thẳng CI lấy điểm E sao cho $\angle EAB = \angle ECA$. Kẻ $BH \perp AE$ ($H \in AE$).</p> <p>a) Chứng minh rằng $\triangle ANI = \triangle BMI$, rồi từ đó suy ra $AM \parallel BN$.</p>											

<p>b) Chứng minh rằng $\angle BE$ là phân giác của góc $\angle MBH$.</p> <p>c) Chứng minh rằng $\angle ECA = \angle EBC$.</p>	
	
<p>a) *) Xét $\triangle ANI$ và $\triangle BMI$ có</p> <p>$\angle ANI = \angle BMI (= 90^\circ)$</p> <p>$AI = BI$ (I là trung điểm của AB)</p> <p>$\angle AIN = \angle BIM$ (đối đỉnh)</p> <p>$\Rightarrow \triangle ANI = \triangle BMI$ (ch - gn)</p> <p>Suy ra $IN = IM$ (hai cạnh tương ứng).</p> <p>*) Xét $\triangle AMI$ và $\triangle BNI$ có</p> <p>$IN = IM$ (cm trên)</p> <p>$\angle AIM = \angle BIN$ (đối đỉnh)</p> <p>$AI = BI$ (I là trung điểm của AB)</p> <p>$\Rightarrow \triangle AMI = \triangle BNI$ (c - g - c)</p> <p>$\Rightarrow \angle AMI = \angle BNI$</p> <p>Mà hai góc ở vị trí so le trong</p> <p>Vậy $AM \parallel BN$.</p>	<p>2,0</p> <p>0,75</p> <p>0,25</p> <p>0,25</p> <p>0,25</p> <p>0,25</p> <p>0,25</p>
<p>b) Xét $\triangle NAC$ và $\triangle HBA$ có</p> <p>$\angle ANC = \angle BHA (= 90^\circ)$</p>	<p>0,25</p>

$AC = AB$ ($\triangle ABC$ cân tại A)	
$\widehat{ACN} = \widehat{BAH}$ (gt)	0,25
Suy ra $AN = BH$ (Hai cạnh tương ứng)	0,25
Mà $AN = BM$ ($\triangle ANI = \triangle BMI$)	0,25
Suy ra $BH = BM$.	0,25
*) Xét $\triangle MBE$ và $\triangle HBE$ có	0,25
$\widehat{BME} = \widehat{BHE} (= 90^\circ)$	0,25
BE là cạnh chung	
$BH = BM$ (cm trên)	0,25
$\Rightarrow \triangle MBE = \triangle HBE$ (ch - cvg)	
$\Rightarrow \widehat{MBE} = \widehat{HBE}$	0,25
Vậy BE là phân giác của $\widehat{MBH}$.	
$\widehat{ECA} = \widehat{EAB}$ (gt); c) Ta có	0,25
Nên $\widehat{IEA} = \widehat{EAC} + \widehat{ECA} = \widehat{EAC} + \widehat{EAB} = \widehat{BAC}$	0,25
Mặt khác $\widehat{BEH} = \widehat{BEM}$ ($\triangle MBE = \triangle HBE$)	0,25
Mà $\widehat{BEM} + \widehat{BEH} + \widehat{IEA} = 180^\circ; \widehat{BAC} + \widehat{ABC} + \widehat{ACB} = 180^\circ; \widehat{ABC} = \widehat{ACB}$	0,25
Suy ra $\widehat{BEM} = \widehat{ABC}$	0,25
Ta lại có $\widehat{BEM} = \widehat{EBC} + \widehat{ECB}; \widehat{ABC} = \widehat{ACE} + \widehat{ECB}$	
Suy ra $\widehat{ECA} = \widehat{EBC}$.	
Câu 3 (2,0 điểm)	
$P = \frac{ x-2022 - x-2023 + x-2024 + 2022}{ x-2022 + x-2023 + x-2024 }$	
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:	
$P = \frac{ x-2022 + x-2023 + x-2024 + 2022 - 2 x-2023 }{ x-2022 + x-2023 + x-2024 }$	0,25

$P = 1 + \frac{2022 - 2 x - 2023 }{ x - 2022 + x - 2023 + x - 2024 }$	0,25
$ x - 2023 \geq 0 \Rightarrow 2022 - 2 x - 2023 \leq 2022$	0,25
$ x - 2022 + x - 2023 + x - 2024 = x - 2022 + 2024 - x + x - 2023 $	
$\geq x - 2022 + 2024 - x + x - 2023 = 2 + x - 2023 \geq 2$	0,5
$\Rightarrow \frac{1}{ x - 2022 + x - 2023 + x - 2024 } \leq \frac{1}{2}$	
$\Rightarrow \frac{2022 - 2 x - 2023 }{ x - 2022 + x - 2023 + x - 2024 } \leq \frac{2022}{2}$	0,25
$P = 1 + \frac{2022 - 2 x - 2023 }{ x - 2022 + x - 2023 + x - 2024 } \leq 1 + \frac{2022}{2} = 1012$	0,25
Dấu “=” xảy ra khi $\begin{cases} x - 2023 = 0 \\ (x - 2022)(2024 - x) \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = 2023$	0,25

.....Hết.....

2.2) Chứng minh rằng không tồn tại đa thức $f(x)$ có các hệ số nguyên mà	2,0
--	-----

$f(8!) = 2020$ và $f(9!) = 2080$. (Với $n! = 1.2.3.4...n; n \in N^*$).	
Giả sử $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + + a_1 x + a_0$ (Với $a_n; a_{n-1};; a_1; a_0$ là các hệ số nguyên) thỏa mãn $f(8!) = 2020$ và $f(9!) = 2080$.	0,5
Ta có $f(9!) - f(8!) = a_n [(9!)^n - (8!)^n] + a_{n-1} [(9!)^{n-1} - (8!)^{n-1}] + ... + a_1 (9! - 8!)$ $= 2080 - 2020 = 60$	0,5
Mặt khác $9! = 1.2.3.4.5.6.7.8.9$ và $8! = 1.2.3.4.5.6.7.8$ đều chia hết cho 7 nên vế trái chia hết cho 7 mà 60 không chia hết cho 7.	0,5
Vậy không tồn tại đa thức $f(x)$ có các hệ số nguyên mà $f(8!) = 2020$ và $f(9!) = 2080$. (Với $n! = 1.2.3.4...n; n \in N^*$).	0,5

Câu 12. Trong túi có một số viên bi màu đen và một số viên bi màu đỏ. Thực hiện lấy ngẫu nhiên một viên bi từ túi, xem viên bi màu gì rồi trả lại viên bi vào túi. Khoa thực hiện thí nghiệm 32 lần. Số lần lấy được viên bi màu đỏ là 18. Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện Khoa lấy được viên bi màu đỏ.

- A. 56% B. 56,25% C. 57% D. 50%.

2.2) Chứng minh rằng không tồn tại đa thức $f(x)$ có các hệ số nguyên mà $f(8!) = 2020$ và $f(9!) = 2080$. (Với $n! = 1.2.3.4...n; n \in N^*$).

Ta có $f(9!) - f(8!) = a_n [(9!)^n - (8!)^n] + a_{n-1} [(9!)^{n-1} - (8!)^{n-1}] + ... + a_1 (9! - 8!)$
 $= 2080 - 2020 = 60$

Mặt khác $9! = 1.2.3.4.5.6.7.8.9$ và $8! = 1.2.3.4.5.6.7.8$ đều chia hết cho 7 nên vế trái chia hết cho 7 mà 60 không chia hết cho 7.

Vậy không tồn tại đa thức $f(x)$ có các hệ số nguyên mà $f(8!) = 2020$ và $f(9!) = 2080$.
(Với $n! = 1.2.3.4...n; n \in N^*$).