

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN ĐỀ THI CHÍNH THỨC	KỶ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2025 – 2026 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề
---	--

Câu 1 (1,5 điểm).

a) Bảng sau thống kê tiền lương 50 công nhân của một công ty trong tháng 5 năm 2025:

Tiền lương (triệu đồng)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)	[10; 11)	[11; 12)	[12; 13)
Tần số	10	7	10	8	9	6

Hỏi nhóm nào có tần số nhỏ nhất? Tính tần số tương đối của nhóm đó.

b) Một tổ học sinh có 3 bạn nữ là Hoa, Hồng, Hà và 4 bạn nam là An, Bình, Dũng, Cường. Xét phép thử: “Chọn ngẫu nhiên một bạn từ tổ học sinh đã cho”. Tính xác suất của biến cố A: “Bạn học sinh được chọn là nam”.

Câu 2 (2,0 điểm).

a) Tính $A = \sqrt{2} \cdot \sqrt{8} + \sqrt{25}$

b) Rút gọn biểu thức $B = \left(\frac{1}{\sqrt{x} + 3} + \frac{6}{x - 9} \right) : \frac{x + 1}{x - 3\sqrt{x}}$ với $x > 0, x \neq 9$

c) Tìm b để đường thẳng $y = x + b$ cắt đồ thị hàm số $y = 2x^2$ tại điểm có hoành độ bằng 1.

Câu 3 (2,5 điểm).

a) Đầu năm học mới, hai bạn Nam và Hùng cùng đi mua bút và vở. Nam mua 10 cái bút và 15 quyển vở hết 200 nghìn đồng, Hùng mua 7 cái bút và 14 quyển vở hết 175 nghìn đồng. Tính giá của mỗi chiếc bút và giá của mỗi quyển vở (biết giá của mỗi chiếc bút là như nhau và giá của mỗi quyển vở là như nhau).

b) Tháng 1 năm 2025, tập đoàn ô tô X sản xuất được 100 xe ô tô. Nhận thấy nhu cầu thị trường tăng lên, tháng 2 tập đoàn đã tăng số lượng sản xuất ô tô lên $x\%$ so với tháng 1. Tháng 3, tập đoàn tiếp tục tăng số lượng sản xuất ô tô lên $2x\%$ so với tháng 2. Biết số lượng ô tô sản xuất trong tháng 3 là 132 xe. Tính x .

c) Cho phương trình $x^2 - 3x + 1 = 0$ có hai nghiệm dương x_1, x_2 . Không giải

$$P = \frac{|7x_2 - 3x_1^2|}{x_1^2 + x_2^2 + x_1x_2}$$

phương trình, tính giá trị của biểu thức

Câu 4 (3,0 điểm). Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$), đường cao AH. Kẻ HD, HE lần lượt vuông góc với AB, AC ($D \in AB, E \in AC$).


a) Chứng minh ADHE là tứ giác nội tiếp.

b) Trên tia đối của tia DH lấy điểm F ($F \neq D$). Đường thẳng qua F vuông góc với FB cắt đường thẳng AH tại G. Kẻ GI vuông góc với HF ($I \in HF$). Chứng minh tam giác IFG đồng dạng với tam giác HBG và $IF = DH$.


c) Tia phân giác của góc HEC cắt CH tại K. Kẻ KM, KN lần lượt vuông góc với EH, EC ($M \in EH, N \in EC$). Hai đoạn thẳng CM và HN cắt nhau tại T. Gọi P là giao điểm của HN và KM, Q là giao điểm của CM và KN. Chứng minh ET vuông góc với PQ.

Câu 5 (1,0 điểm).

a) Một bác nông dân có một bình đựng nước chè xanh, phần chứa nước là dạng hình trụ có bán kính đáy bằng 4 cm, mực nước trong bình có chiều cao bằng 10 cm. Bác muốn đổ hết nước từ bình sang một cái bát uống nước, phần chứa nước là dạng nửa hình cầu có bán kính bằng 6 cm (hình vẽ bên). Hỏi nếu đổ như vậy thì nước có bị tràn ra ngoài hay không? Vì sao?



b) Một công ty bánh kẹo muốn sản xuất một loại kẹo có dạng hình nón. Nhân của kẹo làm bằng sô cô la là một hình trụ có bán kính đáy và chiều cao cùng bằng 1 cm, một đáy của nhân kẹo nằm trên mặt đáy của hình nón và có tâm trùng với tâm đáy hình nón, đường tròn đáy còn lại của hình trụ nằm trên mặt xung quanh của hình nón. Phần còn lại của kẹo được phủ đầy bằng sữa khô (hình vẽ bên). Biết rằng công ty đã thiết kế viên kẹo có thể tích nhỏ nhất để tiết kiệm tối đa nguyên liệu sữa khô. Tính chiều cao của viên kẹo.



ĐÁP ÁN

Câu 1:

a) Nhóm có tần số nhỏ nhất là $[12;13)$ với tần số là 6.

$$\frac{6}{50} \cdot 100\% = 12\%$$

Tần số tương đối của nhóm $[12;13)$ là:

b) Không gian mẫu của phép thử “Chọn ngẫu nhiên một bạn từ tổ học sinh đã chọn” là: $\Omega = \{\text{Hoa, Hồng, Hà, An, Bình, Dũng, Cường}\}$.

Số phần tử của không gian mẫu là: 7.

Số kết quả thuận lợi cho biến cố A: “Bạn học sinh được chọn là nam” là 4, đó là: An, Bình, Dũng, Cường.

Xác suất của biến cố A: “Bạn học sinh được chọn là nam” là $\frac{4}{7}$

Vậy xác suất của biến cố A: “Bạn học sinh được chọn là nam” là $\frac{4}{7}$

Câu 2.

a) $A = \sqrt{2} \cdot \sqrt{8} + \sqrt{25} = \sqrt{2 \cdot 8} + \sqrt{25} = \sqrt{16} + \sqrt{25} = 4 + 5 = 9$

b) ĐK: $x > 0, x \neq 9$

$$B = \left(\frac{1}{\sqrt{x} + 3} + \frac{6}{x - 9} \right) : \frac{x + 1}{x - 3\sqrt{x}}$$

$$B = \left(\frac{\sqrt{x} - 3}{(\sqrt{x} + 3)(\sqrt{x} - 3)} + \frac{6}{x - 9} \right) \cdot \frac{x - 3\sqrt{x}}{x + 1}$$

$$B = \frac{\sqrt{x} - 3 + 6}{x - 9} \cdot \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x} - 3)}{x + 1}$$

$$B = \frac{\sqrt{x} + 3}{(\sqrt{x} - 3)(\sqrt{x} + 3)} \cdot \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x} - 3)}{x + 1}$$

$$B = \frac{\sqrt{x}}{x + 1}$$

Vậy $B = \frac{\sqrt{x}}{x + 1}$ với $x > 0, x \neq 9$

c) Với $x = 1$, ta có $y = 2$

Điểm đó có toạ độ là $(1, 2)$.

Thay vào phương trình đường thẳng $y = x + b$, ta được

$$2 = 1 + b \text{ suy ra } b = 1$$

Vậy $b = 1$

Câu 3.

a) Gọi x, y (nghìn đồng) lần lượt là giá 1 cái bút và 1 quyển vở ($x, y > 0$).

Nam mua 10 cái bút và 15 quyển vở hết 200 nghìn đồng nên ta có:

$$10x + 15y = 200 \quad (1)$$

Hùng mua 7 cái bút và 14 quyển vở hết 175 nghìn đồng nên ta có:

$$7x + 14y = 175 \quad (2)$$

$$\begin{cases} 10x + 15y = 200 \\ 7x + 14y = 175 \end{cases}$$

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 40 \\ x + 2y = 25 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x + 3y = 40 \\ 2x + 4y = 50 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 5 \\ y = 10 \end{cases} \text{ (tmdk)}$$

Vậy giá một chiếc bút là 5 nghìn đồng, một quyển vở là 10 nghìn đồng.

b) Tháng 2, tập đoàn đã tăng số lượng sản xuất ô tô lên $x\%$ so với tháng 1, nên số

lượng xe sản xuất ở tháng 2 là: $100 + 100.x\% = 100 + 100 \cdot \frac{x}{100} = 100 + x$ (xe)

Tháng 3, tập đoàn tiếp tục tăng số lượng sản xuất ô tô lên $2x\%$ so với tháng 2, nên số lượng xe sản xuất ở tháng 3 là:

$$\begin{aligned} & 100 + x + (100 + x).2.x\% \\ &= 100 + x + (100 + x) \cdot \frac{2x}{100} \\ &= 100 + x + 2x + \frac{2x^2}{100} \\ &= 100 + 3x + \frac{2x^2}{100} \end{aligned}$$

Biết số lượng ô tô sản xuất trong tháng 3 là 132 xe, nên ta có:

$$\begin{aligned} 100 + 3x + \frac{2x^2}{100} &= 132 \\ 100 + 3x + \frac{2x^2}{100} - 132 &= 0 \\ 2x^2 + 300x - 3200 &= 0 \end{aligned}$$

Giải phương trình ta được $x = 10$ (tm) và $x = -160$ (ktm)

Vậy $x=10$.

c) Ta có: $A = (-3)^2 - 4.1.1 = 9 - 4 = 5 > 0$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = 3 \\ x_1 x_2 = \frac{c}{a} = 1 \end{cases}$$

Áp dụng định lí Viète ta có:

Khi đó ta có:

$$A = 7x_2 - 3x_1^2; B = 7x_1 - 3x_2^2$$

Đặt

$$A + B = 7(x_1 + x_2) - 3(x_1^2 + x_2^2) = 7.3 - 3.7 = 0$$

Ta có:

Nên $A = -B$ suy ra $|A| = |B|$

Suy ra:

$$A^2 = |A.B| = |(7x_2 - 3x_1^2)(7x_1 - 3x_2^2)|$$

$$A^2 = |49x_1x_2 - 21(x_1^3 + x_2^3) + 9x_1^2x_2^2|$$

$$A^2 = |49 + 9 - 21.(x_1 + x_2)(x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2)|$$


$$A^2 = |58 - 63.[3^2 - 3.1]| = 320$$

Do đó: $|A| = 8\sqrt{5}$

$$P = \frac{8\sqrt{5}}{8} = \sqrt{5}$$

Vậy

Câu 4.



a) Do $HD \perp AB$, $HE \perp AC$ suy ra $\triangle AHD$ vuông tại D nên A, H, D cùng thuộc

đường tròn đường kính AH

ΔAEH vuông tại E nên A, E, H cùng thuộc đường tròn đường kính AH

Suy ra A, D, H, E cùng thuộc đường tròn đường kính AH hay ADHE là tứ giác nội tiếp.

b) Do $GF \perp BF$ tại F nên ΔGBF vuông tại F nên G, B, F cùng thuộc đường tròn đường kính GB

Mà ΔGHB vuông tại H nên G, H, B cùng thuộc đường tròn đường kính GB

Vậy G, H, B, F cùng thuộc đường tròn đường kính GB

Suy ra $\widehat{GFI} = \widehat{GBH}$ (cùng chắn cung GH) (1)

Do $GI \parallel AB$ mà $AB \perp HF$ nên $GI \perp HF$ suy ra (2)

Từ (1) và (2) suy ra $\Delta GFI \sim \Delta GBH$ (gg)

$$\frac{FI}{HB} = \frac{GI}{GH}$$

Khi đó

Do $\widehat{BAH} = \widehat{BHD}$ (cùng cộng với $\widehat{AHD}$ bằng 90°) và $\widehat{HDB} = \widehat{HDA} = 90^\circ$ nên


$\Delta HBD \sim \Delta AHD$ (g.g)

$$\frac{HD}{AD} = \frac{HB}{AH} \quad \text{hay} \quad \frac{HD}{HB} = \frac{AD}{AH}$$

$$\text{Lại có } AD \parallel GI \text{ nên } \frac{AD}{GI} = \frac{AH}{HG} \quad \text{hay} \quad \frac{AD}{AH} = \frac{GI}{HG} \quad \text{nên suy ra } \frac{FI}{HB} = \frac{HD}{HB}$$

Suy ra $FI = HD$

c)



Gọi L là giao điểm của EQ và PN, J là giao điểm của CM và EP

Do EMKN là hình chữ nhật có EK là phân giác nên EMKN là hình vuông

$$\frac{CN}{CE} = \frac{NQ}{EM} = \frac{KN}{HE}$$

Ta có KN // EH nên

$$\frac{NQ}{EM} = \frac{NQ}{NE} = \frac{KN}{HE} = \frac{EN}{HE} \quad \text{hay} \quad \frac{NQ}{NE} = \frac{NE}{HE}$$

Mà ME = NE nên

$$\widehat{ENQ} = \widehat{NEH} = 90^\circ \quad \text{nên} \quad \Delta NEQ \sim \Delta EHN(\text{c.g.c})$$

$$\text{Khi đó} \quad \widehat{NEQ} = \widehat{EHN} \quad \text{nên} \quad \widehat{NEQ} + \widehat{ENH} = \widehat{EHN} + \widehat{ENH} = 90^\circ$$

Suy ra ΔELN vuông tại L hay $EQ \perp HN$ tại L

Chứng minh tương tự ta có $EP \perp CM$ tại J

Xét ΔEPQ có QJ và PL là đường cao cắt nhau tại T nên T là trực tâm

Suy ra $ET \perp PQ$ (đpcm)

Câu 5.



a) Thể tích nước trong bình là: $V = \pi R^2 h = \pi \cdot 4^2 \cdot 10 = 160\pi(\text{cm}^3)$

$$V' = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 6^3 = 144\pi(\text{cm}^3)$$

Thể tích cái bát là:

Vì $V > V'$ nên nếu đổ như vậy thì nước có bị tràn ra ngoài.

b)



Đặt $AM = x$ (cm, $x > 0$)

Khi đó chiều cao viên kẹo là $h = OA = x + 1$

Áp dụng định lý Thales ta có:

$$\frac{AM}{OA} = \frac{EM}{OB} \quad \text{hay} \quad \frac{x}{x+1} = \frac{1}{R} \quad \text{suy ra} \quad R = \frac{x+1}{x}$$

Thể tích viên kẹo là:

$$V = \frac{1}{3} \pi R^2 h = \frac{1}{3} \pi \left(\frac{x+1}{x} \right)^2 (x+1) = \pi \left(\frac{x}{4} + \frac{1}{x} + \frac{x}{24} + \frac{x}{24} + \frac{1}{3x^2} + 1 \right)$$

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta có:

$$\frac{x}{4} + \frac{1}{x} \geq 2 \sqrt{\frac{x}{4} \cdot \frac{1}{x}} = 1$$

$$\frac{x}{24} + \frac{x}{24} + \frac{1}{3x^2} \geq 3 \sqrt{\frac{x}{24} \cdot \frac{x}{24} \cdot \frac{1}{3x^2}} = 3 \cdot \frac{1}{12} = \frac{1}{4}$$

$$V \geq \pi \left(1 + \frac{1}{4} + 1 \right) = \frac{9\pi}{4}$$

Suy ra:

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $x = 2$ (tm)

Vậy chiều cao của viên kẹo là $h = 3$ (cm).