

ÔN TẬP CHƯƠNG I

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Xem lại phần kiến thức trọng tâm của các bài đã học

- Hệ thức liên hệ giữa cạnh và đường cao trong tam giác.
- Tỷ số lượng giác của góc nhọn.
- Hệ thức liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác.

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Dạng 1: So sánh các tỉ số lượng giác

Ví dụ 1. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần $\cos 72^\circ$, $\sin 65^\circ$, $\sin 10^\circ$, $\cot 25^\circ$, $\sin 40^\circ$.

Lời giải

Ta có $\sin 65^\circ = \cos 25^\circ$; $\sin 10^\circ = \cos 80^\circ$; $\sin 40^\circ = \cos 50^\circ$.

Vì $\cos 80^\circ < \cos 72^\circ < \cos 50^\circ < \cos 25^\circ < \cot 25^\circ$ nên

$$\sin 10^\circ < \cos 72^\circ < \sin 40^\circ < \sin 75^\circ < \cot 25^\circ.$$

Ví dụ 2. So sánh

a) $\sin 55^\circ$; $\cos 55^\circ$; $\tan 55^\circ$.

b) $\cot 20^\circ$; $\sin 20^\circ$; $\cos 20^\circ$.

Lời giải

So sánh tương tự Ví dụ 1.

a) $\cos 55^\circ < \sin 55^\circ < \tan 55^\circ$;

b) $\sin 20^\circ < \cos 20^\circ < \cot 20^\circ$.

Ví dụ 3. Cho $0^\circ < \alpha < 45^\circ$. Chứng minh rằng

a) $\sin \alpha < \cos \alpha$.

b) $\tan \alpha < \cot \alpha$.

Lời giải

a) Do $0^\circ < \alpha < 45^\circ$ nên $90^\circ - \alpha > 45^\circ$ suy ra $\alpha < 90^\circ - \alpha$. Do đó

$$\sin \alpha < \sin (90^\circ - \alpha) = \cos \alpha.$$

b) Tương tự câu a) $\alpha < 90^\circ - \alpha$ nên $\tan \alpha < \tan (90^\circ - \alpha) = \cot \alpha$.

Ví dụ 4. Cho tam giác ABC vuông tại A có $\hat{B} > \hat{C}$. Hãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần $\sin B$, $\cos B$, $\tan B$, $\sin C$, $\cos C$, $\cot C$.

Lời giải

Ta có $\hat{B} + \hat{C} = 90^\circ$ nên $\sin C = \cos B$; $\cos C = \sin B$; $\tan B = \cot C$

Lại có $\hat{B} > \hat{C}$ nên $\cos B < \cos C$.

$$\text{Mà } \tan B = \frac{\sin B}{\cos B} > \sin B$$

$$\text{Vậy } \sin C = \cos B < \cos C = \sin B < \tan B = \cot C$$

Dạng 2: Rút gọn và tính giá trị của biểu thức lượng giác

Ví dụ 5. Rút gọn các biểu thức

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \sin^2 \alpha \cdot \cot^2 \alpha - \cos^2 \alpha + 1 & \text{b) } (\tan \alpha - \cot \alpha)^2 - (\tan \alpha + \cot \alpha)^2 \\ \text{c) } \sin^4 \alpha - \cos^4 \alpha - \cos^2 \alpha - 3 \sin^2 \alpha \end{array}$$

Lời giải

$$\text{a) } \sin^2 \alpha \cdot \cot^2 \alpha - \cos^2 \alpha + 1 = \sin^2 \alpha \cdot \frac{\cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha} - \cos^2 \alpha + 1 = \cos^2 \alpha - \cos^2 \alpha + 1 = 1$$

$$\begin{aligned} \text{b) } & (\tan \alpha - \cot \alpha)^2 - (\tan \alpha + \cot \alpha)^2 \\ &= \tan^2 \alpha - 2 \cdot \tan \alpha \cdot \cot \alpha + \cot^2 \alpha - (\tan^2 \alpha + 2 \cdot \tan \alpha \cdot \cot \alpha + \cot^2 \alpha) = -4 \cdot \tan \alpha \cdot \cot \alpha = -4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } & \sin^4 \alpha - \cos^4 \alpha - \cos^2 \alpha - 3 \sin^2 \alpha = (\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha) \cdot (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) - \cos^2 \alpha - 3 \sin^2 \alpha \\ &= 1 \cdot (\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha) - \cos^2 \alpha - 3 \sin^2 \alpha = -2 \cdot (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) = -2 \end{aligned}$$

Ví dụ 6. Tính giá trị của biểu thức

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \sin 30^\circ + \cos 60^\circ - \tan 45^\circ + 4 \cos^2 30^\circ & \text{b) } \cos^2 30^\circ - \cot^2 60^\circ + \tan^2 30^\circ - 1 \\ \text{c) } \frac{\cot^2 45^\circ - \cos^2 45^\circ}{2 \sin^2 60^\circ} \end{array}$$

Lời giải

$$\text{a) } \sin 30^\circ + \cos 60^\circ - \tan 45^\circ + 4 \cos^2 30^\circ = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - 1 + 4 \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 = 3$$

$$\text{b) } \cos^2 30^\circ - \cot^2 60^\circ + \tan^2 30^\circ - 1 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{3} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{3} \right)^2 - 1 = \frac{3}{4} - 1 = -\frac{1}{4}$$

$$\text{c) } \frac{\cot^2 45^\circ - \cos^2 45^\circ}{2 \sin^2 60^\circ} = \frac{1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2}{2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2} = \frac{1}{3}$$

Ví dụ 7. Tính giá trị của biểu thức

a) $\cos^2 33^\circ + \cos^2 41^\circ + \cos^2 49^\circ + \cos^2 57^\circ$.

b) $\sin^2 35^\circ + \sin^2 39^\circ + \sin^2 43^\circ + \sin^2 47^\circ + \sin^2 51^\circ + \sin^2 55^\circ$.

Lời giải

a) $\cos^2 33^\circ + \cos^2 41^\circ + \cos^2 49^\circ + \cos^2 57^\circ = (\cos^2 33^\circ + \cos^2 57^\circ) + (\cos^2 41^\circ + \cos^2 49^\circ)$
 $= (\cos^2 33^\circ + \sin^2 33^\circ) + (\cos^2 41^\circ + \sin^2 41^\circ) = 1 + 1 = 2$.

b) $\sin^2 35^\circ + \sin^2 39^\circ + \sin^2 43^\circ + \sin^2 47^\circ + \sin^2 51^\circ + \sin^2 55^\circ$
 $= (\sin^2 35^\circ + \sin^2 55^\circ) + (\sin^2 39^\circ + \sin^2 51^\circ) + (\sin^2 43^\circ + \sin^2 47^\circ)$
 $= (\sin^2 35^\circ + \cos^2 35^\circ) + (\sin^2 39^\circ + \cos^2 39^\circ) + (\sin^2 43^\circ + \cos^2 43^\circ) = 1 + 1 + 1 = 3$

Dạng 3: Tính độ dài đoạn thẳng, tính số đo góc

Ví dụ 8. Cho tam giác ABC cân tại A , đường cao AH . Biết $\hat{A} = 44^\circ$; $AH = 9\text{cm}$. Tính chu vi tam giác ABC .

Lời giải


Do tam giác ABC cân đỉnh A , AH là đường cao nên AH cũng là đường phân giác, đường trung tuyến.

Do đó $\angle BAH = \angle CAH = 22^\circ$ và $HB = HC = \frac{BC}{2}$.

Xét $\triangle AHC$ vuông tại H , ta có $AC = \frac{AH}{\cos \angle HAC} = \frac{9}{\cos 22^\circ} \approx 9,7(\text{cm})$


và $HC = AH \cdot \cot \angle HAC = 9 \cdot \cot 22^\circ \approx 3,6(\text{cm})$.

Do đó chu vi tam giác ABC là $2 \cdot (9,7 + 3,6) \approx 26,6(\text{cm})$.



Ví dụ 9. Cho hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$), $\hat{C} = 36^\circ$; $\hat{D} = 50^\circ$. Biết $AB = 4\text{cm}$, $AD = 6\text{cm}$. Tính chu vi hình thang.

Lời giải



Vẽ $AH \perp CD$ và $BK \perp CD$, dễ thấy $AHKB$ là hình chữ nhật.

Do đó $AH = BK$ và $AB = HK$.

Xét $\triangle ADH$ vuông tại H , ta có

$$DH = AD \cdot \cos \angle ADH = 6 \cdot \cos 50^\circ \approx 4,6(\text{cm})$$

Tương tự, xét $\triangle BKC$ vuông tại K , ta có $KC = BK \cdot \cot \angle BCK = 4,6 \cdot \cot 36^\circ \approx 6,3(\text{cm})$

$$\text{và } BC = \frac{BK}{\sin \angle KCB} = \frac{4,6}{\sin 36^\circ} \approx 7,8(\text{cm})$$

Ta có $DC = DH + HK + KC = 3,9 + 4 + 6,3 \approx 14,2(\text{cm})$

Do đó chu vi của hình thang là $4 + 7,8 + 14,2 + 614,2 \approx 32(\text{cm})$.

Ví dụ 10. Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Vẽ $HM \perp AB$; $HN \perp AC$. Biết $AB = 3\text{cm}$, $AC = 4\text{cm}$.

a) Tính độ dài MN .

b) Tính số đo các góc của tam giác AMN .

c) Tính diện tích tứ giác $BMNC$.

Lời giải

a) Áp dụng định lý Py-ta-go trong tam giác vuông ABC , ta có

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 = 3^2 + 4^2 = 25 \text{ suy ra } BC = 5(\text{cm}).$$

Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông ABC , ta có


$$AH \cdot BC = AB \cdot AC \Leftrightarrow AH = \frac{AB \cdot AC}{BC}$$

$$\text{suy ra } AH = \frac{3 \cdot 4}{5} = 2,4(\text{cm})$$

Dễ thấy $AMHN$ là hình chữ nhật nên $MN = AH$ nên $MN = 2,4\text{cm}$.

b) Xét $\triangle ABH$ vuông tại H , ta có $AH^2 = AM \cdot AB \Leftrightarrow AM = \frac{AH^2}{AB} = \frac{2,4^2}{4} = 1,44(\text{cm})$

Ta xét $\triangle AMN$ vuông tại A , ta có $\tan \angle AMN = \frac{AN}{AM} = \frac{1,44}{1,92} \approx \tan 36^\circ 52'$. Do đó $\angle AMN = 36^\circ 52'$.



Mà $\angle ANM = 90^\circ = \angle AMN = 90^\circ - 36^\circ 52' = 53^\circ 8'$.

c) Gọi S là diện tích tứ giác $BMNC$.

Ta có
$$S = S_{\triangle ABC} - S_{\triangle AMN} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC - \frac{1}{2} \cdot AM \cdot AN = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 - \frac{1}{2} \cdot 1,92 \cdot 1,44 \approx 4,6 (\text{cm}^2)$$

Vậy diện tích tứ giác $BMNC$ là $4,6 \text{cm}^2$.

Ví dụ 11. Cho tam giác ABC vuông tại A , $BC = 4 \text{cm}$. Vẽ đường cao AH ; vẽ $HI \perp AB$, $HK \perp AC$. Tìm giá trị lớn nhất của diện tích tứ giác $AIHK$.

Lời giải

Xét $\triangle ABH$ vuông tại H , ta có $AH^2 = AI \cdot AB$ suy ra $AI = \frac{AH^2}{AB}$.


Tương tự, ta xét $\triangle ACH$ vuông tại H , ta có

$$AH^2 = AK \cdot AC \text{ suy ra } AK = \frac{AH^2}{AC}.$$

Gọi S là diện tích của tứ giác $AIHK$.

Do tứ giác $AIHK$ là hình chữ nhật nên

$$S = AI \cdot AK = \frac{AH^2}{AB} \cdot \frac{AH^2}{AC} = \frac{AH^4}{AB \cdot AC}.$$



Mặt khác theo hệ thức lượng trong tam giác vuông ABC ta có $AB \cdot AC = AH \cdot BC$.

Khi đó
$$S = \frac{AH^4}{AH \cdot BC} = \frac{AH^3}{BC}.$$

Gọi M là trung điểm của BC , ta có $AM = \frac{BC}{2} = 2 (\text{cm})$.

Mà $AH \leq AM$ nên
$$S = \frac{AH^3}{BC} \leq \frac{AM^3}{BC} \leq \frac{2^3}{4} = 2 (\text{cm}^2)$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi $AH = AM$ hay tam giác ABC vuông cân tại A .

Vậy $\max S = 2 \text{cm}^2$ khi $\triangle ABC$ là tam giác vuông cân đỉnh A .

Dạng 4: Chứng minh hệ thức giữa các tỉ số lượng giác

Ví dụ 12. Chứng minh hệ thức
$$\frac{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha + \sin^4 \alpha}{\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha + \cos^4 \alpha} = \cot^4 \alpha.$$

Lời giải

$$\frac{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha + \sin^4 \alpha}{\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha + \cos^4 \alpha} = \frac{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha (1 - \sin^2 \alpha)}{\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha (1 - \cos^2 \alpha)} = \frac{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha \sin^2 \alpha} = \frac{\cos^2 \alpha (1 - \sin^2 \alpha)}{\sin^2 \alpha (-\cos^2 \alpha)}$$

$$= \frac{\cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha} \cdot \frac{\cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha} = \frac{\cos^4 \alpha}{\sin^4 \alpha} = \cot^4 \alpha$$

Ví dụ 13. Chứng minh các đẳng thức sau

- a) $(1 - \cos \alpha)(1 + \cos \alpha) = \sin^2 \alpha$; b) $\sin^2 \alpha + 1 + \cos^2 \alpha = 2$;
 c) $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha + 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha = 1$; d) $\sin \alpha - \sin \alpha \cos^2 \alpha = \sin^3 \alpha$.

Lời giải

- a) $(1 - \cos \alpha)(1 + \cos \alpha) = 1 - \cos^2 \alpha = \sin^2 \alpha$;
 b) $\sin^2 \alpha + 1 + \cos^2 \alpha = \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha + 1 = 1 + 1 = 2$;
 c) $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha + 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha = (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^2 = 1^2 = 1$;
 d) $\sin \alpha - \sin \alpha \cos^2 \alpha = \sin \alpha (1 - \cos^2 \alpha) = \sin \alpha \cdot \sin^2 \alpha = \sin^3 \alpha$.

C. BÀI TẬP VẬN DỤNG

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 5$ cm, $AC = 12$ cm và $BC = 13$ cm. Giá trị của $\sin C$ bằng

- A. $\frac{5}{12}$. B. $\frac{1}{13}$. C. $\frac{12}{13}$. D. $\frac{5}{13}$.

Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\cos B = \frac{AB}{BC}$. B. $\cos B = \frac{AC}{AB}$. C. $\cos B = \frac{AB}{AC}$. D. $\cos B = \frac{AC}{BC}$.

Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A . Hệ thức nào sau đây đúng?

- A. $\sin B = \frac{AB}{BC}$. B. $\sin B = \frac{AB}{AC}$. C. $\tan B = \frac{AB}{AC}$. D. $\cos B = \frac{AB}{AC}$.

Câu 4: Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A. $\cos 35^\circ > \sin 40^\circ$. B. $\sin 35^\circ > \cos 40^\circ$.
 C. $\sin 35^\circ < \sin 40^\circ$. D. $\cos 35^\circ > \cos 40^\circ$.

Câu 5: Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Hệ thức nào đây **sai**?

- A. $AC^2 = BC \cdot HC$. B. $AH^2 = AB \cdot AC$.
 C. $\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2}$. D. $AH^2 = HB \cdot HC$.

Câu 6: Cho $\triangle ABC$ vuông tại A , đường cao AH . Biết $BH = 3,2\text{ cm}; BC = 5\text{ cm}$ thì độ dài AB bằng

- A. 8 cm . B. 16 cm . C. $1,8\text{ cm}$. D. 4 cm .

Câu 7: Cho tam giác ABC vuông tại A , $\angle C = 30^\circ$, cạnh $AB = 5\text{ cm}$. Độ dài cạnh AC là

- A. 10 cm . B. $\frac{5}{\sqrt{3}}\text{ cm}$. C. $5\sqrt{3}\text{ cm}$. D. $\frac{5\sqrt{2}}{2}\text{ cm}$.

Câu 8: Cho tam giác ABC vuông tại C . Biết $\sin B = \frac{1}{3}$, khi đó $\tan A$ bằng


- A. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$. B. 3 . C. $2\sqrt{2}$. D. $\frac{1}{2\sqrt{2}}$.

Câu 9: Cho $\triangle ABC$ cân tại A , $\angle BAC = 120^\circ$, $BC = 12\text{ cm}$. Tính độ dài đường cao AH .

- A. $AH = 3\text{ cm}$. B. $AH = 2\sqrt{3}\text{ cm}$. C. $AH = 4\sqrt{3}\text{ cm}$. D. $AH = 6\text{ cm}$.


Câu 10: Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH (hình bên). Đẳng thức nào sau đây là **sai**?

- A. $\sin B = \frac{AH}{AB}$. B. $\tan \angle BAH = \frac{BH}{AH}$.
C. $\cos C = \frac{HC}{AC}$. D. $\cot \angle HAC = \frac{AH}{AC}$.



Câu 11: Một cái thang dài 4 m đặt dựa vào tường, biết góc giữa thang và mặt đất là 60° . Khoảng cách d từ chân thang đến tường bằng bao nhiêu?

- A. $d = \frac{\sqrt{3}}{2}\text{ m}$. B. $d = 2\sqrt{3}\text{ m}$.
C. $d = 2\sqrt{2}\text{ m}$. D. $d = 2\text{ m}$.




Câu 12: Cho tam giác ABC vuông tại A và $AB = 2\sqrt{5}a$, $AC = 5\sqrt{3}a$. Kẻ AK vuông góc với BC , với K nằm trên cạnh BC . Tính AK theo a .

- A. $AK = \frac{19\sqrt{57}}{10}a$. B. $AK = \frac{\sqrt{95}}{2}a$.
C. $AK = \frac{10\sqrt{57}}{19}a$. D. $AK = \frac{5\sqrt{57}}{19}a$.

Câu 13: Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Biết $AH = 2$, $HC = 4$. Đặt $BH = x$ (hình bên). Tính x .

- A. $x = \frac{1}{2}$. B. $x = 1$.
C. $x = \frac{16}{3}$. D. $x = 4$.



Câu 14: Cho $\angle xOy = 45^\circ$. Trên tia Oy lấy hai điểm A, B sao cho $AB = \sqrt{2}$ cm. Tính độ dài hình chiếu vuông góc của đoạn thẳng AB trên Ox .

- A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ cm. B. $\frac{\sqrt{2}}{4}$ cm. C. 1 cm. D. $\frac{1}{2}$ cm.

Câu 15: Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH và đường trung tuyến AM ($H, M \in BC$). Biết chu vi của tam giác là 72 cm và $AM - AH = 7$ cm. Tính diện tích S của tam giác ABC .

- A. $S = 48 \text{ cm}^2$. B. $S = 108 \text{ cm}^2$. C. $S = 148 \text{ cm}^2$. D. $S = 144 \text{ cm}^2$.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1. Cho biết $\cos \alpha = \frac{1}{4}$.

a) Tính $\sin \alpha$.


b) Chứng minh rằng $\tan \alpha = 4 \sin \alpha$.

Lời giải

a) $\sin \alpha = \frac{\sqrt{15}}{4}$.

b) $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\sin \alpha}{\frac{1}{4}} = 4 \sin \alpha$.

Bài 2. Xem hình bên và tính góc tạo bởi hai mái nhà AB và AC , biết rằng mỗi mái nhà dài 2,34m và cao 0,8m.




Lời giải

$$\cos \angle BAH = \frac{AH}{AB} = \frac{0,8}{2,34} = \frac{40}{117} \Rightarrow \angle BAH \approx 70^\circ \Rightarrow \angle BAC = 2\angle BAH = 2 \cdot 70^\circ = 140^\circ$$

Bài 3. Tam giác ABC có $\hat{A} = 20^\circ$, $\hat{B} = 30^\circ$, $AB = 6$ cm. Đường vuông góc kẻ từ C đến AB cắt AB tại P (hình vẽ bên). Hãy tìm

a) AP, BP ;

b) CP .




Lời giải

a) Ta có $CP = AP \cdot \tan 20^\circ = PB \cdot \tan 30^\circ \Rightarrow \frac{PA}{\tan 30^\circ} = \frac{PB}{\tan 20^\circ} = \frac{PA + PB}{\tan 30^\circ + \tan 20^\circ} = \frac{6}{\tan 30^\circ + \tan 20^\circ}$.

Do đó $PA = 6 \cdot \tan 30^\circ = 2\sqrt{3} \text{ (cm)}$; $PB = 6 \cdot \tan 20^\circ \approx 2,18 \text{ (cm)}$.

b) $CP = 2\sqrt{3} \cdot \tan 20^\circ \approx 1,26 \text{ (cm)}$.

Bài 4. Tính độ dài các cạnh và số đo các góc nhọn của tam giác ABC vuông tại A trong hình bên



Lời giải

- $HC = \frac{AH^2}{HB} = \frac{3^2}{2} = 4,5$
- $BC = BH + HC = 2 + 4,5 = 6,5$
- $BA^2 = BH \cdot BC = 2 \cdot 6,5 = 13 \Rightarrow BA = \sqrt{13}$
- $CA^2 = CH \cdot CB = 4,5 \cdot 6,5 = \frac{117}{4} \Rightarrow AC = \frac{3\sqrt{13}}{2}$
- $\tan B = \frac{AH}{BH} = \frac{3}{2} \Rightarrow B \approx 59^\circ 19'$
- $C = 90^\circ - 59^\circ 19' = 30^\circ 41'$

Bài 5. Cho hình thang cân $ABCD$ ($AB \parallel CD$). Biết $AD = 2,1 \text{ cm}$; $CD = 6,0 \text{ cm}$ và $\hat{D} = 48^\circ$.

a) Tính độ dài AB .

b) Tính diện tích hình thang $ABCD$.

Lời giải


a) Kẻ các đường cao $AH \perp CD$ và $BK \perp CD$.

Dễ thấy $ABKH$ là hình chữ nhật nên $AB = HK$.

Xét $\triangle AHD$ và $\triangle BKC$, do giả thiết suy ra

$$AD = BC \text{ và } \angle ADH = \angle BCK \text{ nên } \triangle AHD = \triangle BKC.$$

Do đó $DH = KC$ và $HK = DC - 2DH$.



Xét tam giác vuông AHD ta có $DH = AD \cdot \cos \angle ADH = 2,1 \cdot \cos 48^\circ \approx 1,4 \text{ (cm)}$.

Suy ra $AB = 6,0 - 2 \cdot 1,4 \approx 3,2 \text{ (cm)}$.

b) Gọi S là diện tích hình thang $ABCD$. Khi đó
$$S = \frac{(AB + CD) \cdot AH}{2}$$
.

Xét tam giác vuông ADH ta có $AH = AD \cdot \sin \angle ADH = 2,1 \cdot \sin 48^\circ \approx 1,56(\text{cm})$.

$$S = \frac{(3,2 + 6,0) \cdot 1,56}{2} \approx 7,88(\text{cm}^2)$$

Nên

Bài 6. Cho tam giác ABC vuông tại A , $AB = 6\text{cm}$, $AC = 8\text{cm}$.

a) Tính BC , $\hat{B}$, $\hat{C}$;

b) Phân giác của $\hat{A}$ cắt BC tại D . Tính BD , CD .

c) Từ D kẻ DE và DF lần lượt vuông góc với AB , AC . Tứ giác $AEDF$ là hình gì? Tính chu vi và diện tích của tứ giác $AEDF$?

Lời giải

a) Theo định lý Py-ta-go, ta có

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 = 6^2 + 8^2 = 100 \Rightarrow BC = \sqrt{100} = 10(\text{cm})$$

Theo tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác ABC vuông tại A

$$\tan B = \frac{AC}{AB} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3} \Rightarrow \hat{B} \approx 53^\circ$$

$$\text{Do đó } \hat{C} = 90^\circ - \hat{B} = 90^\circ - 53^\circ = 37^\circ.$$

b) Theo tính chất đường phân giác trong tam giác ta có

$$\frac{DB}{DC} = \frac{AB}{AC} \Rightarrow \frac{DB}{AB} = \frac{DC}{AC} = \frac{DB + DC}{AB + AC} = \frac{BC}{6 + 8} = \frac{10}{14} = \frac{5}{7}$$


$$\Rightarrow DB = \frac{5}{7} AB = \frac{5}{7} \cdot 6 \approx 4,3(\text{cm}); DC = \frac{5}{7} AC = \frac{5}{7} \cdot 8 = 5,7(\text{cm})$$

c) Tứ giác $AEDF$ có $\hat{A} = \hat{E} = \hat{F} = 90^\circ$ nên là hình chữ nhật. Mặt khác $DE = DF$ (tính chất tia phân giác của một góc) nên $AEDF$ là hình vuông.

Theo hệ thức liên hệ giữa cạnh và góc trong $\triangle BED$ vuông tại E , ta có

$$DE = DB \cdot \sin B = 4,3 \cdot \sin 53^\circ \approx 3,43(\text{cm})$$

$$\text{Chu vi của hình vuông } AEDF : 4 \cdot 3,43 = 13,72(\text{cm})$$



Diện tích hình vuông $AEDF$: $S = (3,43)^2 = 11,7649(\text{cm}^2)$.

Bài 8. Cho tam giác ABC vuông tại A . Chứng minh rằng $\tan \frac{B}{2} = \frac{AC}{AB + BC}$.


Lời giải

Vẽ đường phân giác BD . Xét $\triangle ABD$ vuông tại A , ta

có $\tan \angle ABD = \frac{AD}{AB}$.

Mặt khác $\frac{AD}{DC} = \frac{AB}{BC} = \frac{AB}{AB + BC}$ suy ra $\frac{AD}{AB} = \frac{CD}{BC} = \frac{AD + CD}{AB + BC}$.

Do đó $\tan \angle ABD = \frac{AC}{AB + BC}$ hay $\tan \frac{B}{2} = \frac{AC}{AB + BC}$.



--- HẾT ---