


ĐỊNH LUẬT BOYLE**Dạng 1 - XÁC ĐỊNH ÁP SUẤT VÀ THỂ TÍCH TRONG QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT****I – TÓM TẮT LÝ THUYẾT****1. Các thông số trạng thái của một lượng khí**



- Trạng thái của một lượng khí được xác định bằng 3 thông số trạng thái: Áp suất (p); Thể tích (V); Nhiệt độ (T)

T là nhiệt độ tuyệt đối (K): $T (K) = t^{\circ}C + 273$

- Lượng khí có thể chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác bằng các quá trình biến đổi trạng thái. Khi biến đổi trạng thái mà còn một thông số không đổi thì các quá trình này gọi là đẳng quá trình.



Hình 9.2. Trạng thái và quá trình

**2. Định luật Boyle**

- **Quá trình đẳng nhiệt:** là quá trình biến đổi trạng thái của một khối lượng khí xác định trong đó nhiệt độ được giữ không đổi.
- **Định luật Boyle:**



Khi nhiệt độ của một khối lượng khí xác định giữ không đổi thì áp suất gây ra bởi khí tỉ lệ nghịch với thể tích của nó

Biểu thức: $pV = \text{hằng số}$

Trong đó : p là áp suất (mmHg, bar, atm, Pa, N/m²)

V là thể tích (lít = dm³, m³, cm³, mm³)

Chú ý :

- Nếu gọi p_1, V_1 là áp suất và thể tích của một lượng khí ở trạng thái 1
- p_2, V_2 là áp suất và thể tích của một lượng khí ở trạng thái 2

Thì theo định luật Boyle ta có: $p_1V_1 = p_2V_2$.

Đơn vị đổi:

$$1\text{atm} = 1\text{bar} = 760\text{mmHg} = 10^5\text{Pa} = 10^5\text{N/m}^2$$


$$1\text{m}^3 = 10^3\text{dm}^3 = 10^3\text{lít} = 10^6\text{cm}^3 = 10^9\text{mm}^3$$

Một số ví dụ về quá trình đẳng nhiệt trong đời sống:




3. Đường đẳng nhiệt



- Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo thể tích khi nhiệt độ không đổi gọi là đường đẳng nhiệt.
- Trong hệ tọa độ (p, V) đường đẳng nhiệt là một nhánh của đường hyperbol.



- Đường đẳng nhiệt của cùng một lượng khí ứng với các nhiệt độ khác nhau thì khác nhau.



- Đường đẳng nhiệt trong các hệ tọa độ khác, có dạng là một đường thẳng.



II – BÀI TẬP LUYỆN TẬP

1. Câu trắc nhiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.


(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25điểm)

Câu	Đáp án	Câu	Đáp án
1	A	10	C
2	D	11	A
3	C	12	B
4	D	13	A
5	B	14	C
6	A	15	D
7	C	16	A
8	B	17	C
9	C	18	C

Câu 1. Quá trình đẳng nhiệt là:

- A. quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi
- B. quá trình biến đổi trạng thái trong đó áp suất được giữ không đổi.
- C. quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ và thể tích được giữ không đổi.
- D. quá trình biến đổi trạng thái trong đó thể tích được giữ không đổi.

Câu 2. Đồ thị biểu diễn hai đường đẳng nhiệt của cùng một lượng khí lí tưởng biểu diễn như hình vẽ. Mối quan hệ về nhiệt độ của hai đường đẳng nhiệt này là:



A. $T_2 = T_1$

B. $T_2 < T_1$

C. $T_2 \leq T_1$

D. $T_2 > T_1$

Câu 3. Đẩy pit-tông của một xilanh đủ chậm để nén lượng khí chứa trong xilanh sao cho thể tích của lượng khí này giảm đi 2 lần ở nhiệt độ không đổi. Khi đó áp suất của khí trong xi lanh

- A. giảm đi 2 lần. B. tăng thêm 4 lần.
C. tăng lên 2 lần. D. không thay đổi.

Giải thích :

Theo định luật Boyle, áp suất của lượng khí ở nhiệt độ không đổi tỉ lệ nghịch với thể tích của lượng khí đó nên khi nén lượng khí ở nhiệt độ không đổi sao cho thể tích lượng khí giảm 2 lần thì áp suất của lượng khí tăng lên 2 lần.

Câu 4. Khi giãn nở khí đẳng nhiệt thì:

- A. Áp suất khí tăng lên.
B. Số phân tử khí trong một đơn vị thể tích tăng.
C. Khối lượng riêng của khí tăng lên
D. Số phân tử khí trong một đơn vị thể tích giảm.

Câu 5. Tập hợp ba thông số nào sau đây xác định trạng thái của một lượng khí xác định?

- A. Áp suất, thể tích, khối lượng.
B. Áp suất, nhiệt độ, thể tích.
C. Thể tích, trọng lượng, áp suất.
D. Áp suất, nhiệt độ, khối lượng.

Câu 6. Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình?

- A. Đun nóng khí trong 1 bình đầy kín
B. Không khí trong quả bóng bay bị phơi nắng, nắng lên, nở ra làm căng bóng
C. Cả 3 quá trình trên đều không phải là đẳng quá trình
D. Đun nóng khí trong 1 xilanh, khí nở ra đẩy pit-tông chuyển động

Câu 7. Một khối khí lý tưởng chuyển từ trạng thái 1 (6 atm, 4l, 270K) sang trạng thái 2 (p, 3l, 270K). Giá trị của p là:

- A. 2,5 atm. B. 4,5 atm. C. 8 atm. D. 6 atm.

Giải thích :

Trạng thái 1 : $V_1 = 4 \text{ lít}$, $p_1 = 6 \text{ atm}$, $T_1 = 270 \text{ K}$

Trạng thái 2 : $V_2 = 3 \text{ lít}$, $p_2 = p \text{ atm}$, $T_2 = 270 \text{ K}$

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2 \Rightarrow p_2 = \frac{p_1 \cdot V_1}{V_2} = \frac{4 \cdot 6}{3} = 8 \text{ atm}$$

Câu 8. Đối với một lượng khí lý tưởng xác định, khi nhiệt độ không đổi thì áp suất

- A. tỉ lệ thuận với thể tích. B. tỉ lệ nghịch với thể tích.
C. tỉ lệ nghịch với bình phương thể tích. D. tỉ lệ thuận với bình phương thể tích.

Câu 9. Trong hệ tọa độ (p,V), đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng nhiệt ?

- A. Đường thẳng không đi qua gốc tọa độ.
B. Đường thẳng kéo dài qua gốc tọa độ.
C. Đường hypebol
D. Đường thẳng cắt trục p tại điểm $p = p_0$.

Câu 10. Một bình có dung tích 5 lít chứa một chất khí dưới áp suất 30atm. Coi nhiệt độ của khí không đổi và áp suất của khí quyển là 1 atm. Nếu mở nút bình thì thể tích của chất khí là bao nhiêu?

- A. 200 lít B. 180 lít C. 150 lít D. 250 lít

Giải thích :

Trạng thái 1 : $V_1 = 5 \text{ lít}$, $p_1 = 30 \text{ atm}$

Trạng thái 2 : $V_2 = ?$, $p_2 = 1 \text{ atm}$

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2 \Rightarrow V_2 = \frac{p_1 \cdot V_1}{p_2} = \frac{5 \cdot 30}{1} = 150 \text{ lít.}$$

Câu 11. Nén một lượng khí lý tưởng trong bình kín thì quá trình đẳng nhiệt xảy ra như sau:

- A. Áp suất tăng, nhiệt độ không đổi.
- B. Áp suất tăng, nhiệt độ tỉ lệ thuận với áp suất.
- C. Áp suất giảm, nhiệt độ tỉ lệ nghịch với áp suất.
- D. Áp suất giảm, nhiệt độ không đổi.

Câu 12. Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít đến thể tích 6 lít thì áp suất tăng một lượng $\Delta p = 50 \text{ kPa}$. Áp suất ban đầu của khí đó là:

- A. 25kPa
- B. 75kPa
- C. 10kPa
- D. 55kPa

Giải thích :

Trạng thái 1 : $V_1 = 10 \text{ lít}, p_1$

Trạng thái 2 : $V_2 = 6 \text{ lít}, p_2 = p_1 + 50 \text{ kPa}$

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2 \Leftrightarrow 10p_1 = 6(p_1 + 50) \Rightarrow p_1 = 75 \text{ kPa}.$$

Câu 13. Biểu thức sau $p_1 V_1 = p_2 V_2$ biểu diễn quá trình

- A. đẳng nhiệt.
- B. đẳng áp.
- C. đẳng tích.
- D. đẳng áp và đẳng nhiệt.

Câu 14. Một lượng khí có thể tích 15 m^3 và áp suất 1 atm , người ta nén đẳng nhiệt khí tới áp suất $2,5 \text{ atm}$. Thể tích của khí nén là

- A. 5 m^3 .
- B. $4,68 \text{ m}^3$.
- C. 6 m^3 .
- D. $3,35 \text{ m}^3$.





Giải thích :

Trạng thái 1 : $V_1 = 15 \text{ m}^3, p_1 = 1 \text{ atm}$

Trạng thái 2 : $V_2 = ?, p_2 = 2,5 \text{ atm}$

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2 \Rightarrow V_2 = \frac{p_1 \cdot V_1}{p_2} = \frac{1 \cdot 15}{2,5} = 6 \text{ m}^3$$

Câu 15. Đường nào sau đây không biểu diễn quá trình đẳng nhiệt ?



Câu 16. Cho một lượng khí được giãn đẳng nhiệt từ thể tích từ 3 lít đến 4 lít, ban đầu áp suất khí là $8 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ thì áp suất của khí tăng hay giảm bao nhiêu?

- A. Giảm $6 \cdot 10^5 \text{ Pa}$
- B. Tăng $8 \cdot 10^5 \text{ Pa}$
- C. Tăng 10^6 Pa
- D. Giảm 10^6 Pa

Giải thích :

Trạng thái 1 : $V_1 = 3 \text{ lít}, p_1 = 8 \cdot 10^5 \text{ Pa}$

Trạng thái 2 : $V_2 = 4 \text{ lít}, p_2 = ? \text{ Pa}$

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2 \Rightarrow p_2 = \frac{p_1 \cdot V_1}{V_2} = \frac{8 \cdot 10^5 \cdot 3}{4} = 6 \cdot 10^5 \text{ Pa.}$$

Câu 17. Cho ba thông số trạng thái của khối khí lí tưởng xác định: thể tích V, áp suất p và nhiệt độ tuyệt đối T. Hệ thức nào sau đây diễn tả **sai** định luật Boyle?

- A. $pV = \text{hằng số.}$ B. $p_1 V_1 = p_2 V_2.$ C. $\frac{p_1}{V_1} = \frac{p_2}{V_2}.$ D. $\frac{p_1}{V_2} = \frac{p_2}{V_1}.$

Câu 18. Một xilanh chứa 150 cm^3 khí ở áp suất $2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. Pittông nén khí trong xilanh xuống còn 50 cm^3 . Tính áp suất khí trong xilanh lúc này. Coi nhiệt độ không đổi.

- A. $5 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ B. $4 \cdot 10^5 \text{ Pa}$
C. $6 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ D. $9 \cdot 10^5 \text{ Pa}$

Giải thích :

Trạng thái 1 : $V_1 = 150 \text{ cm}^3$, $p_1 = 2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$

Trạng thái 2 : $V_2 = 50 \text{ cm}^3$, $p_2 = ? \text{ Pa}$

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2 \Rightarrow p_2 = \frac{p_1 \cdot V_1}{V_2} = \frac{2 \cdot 10^5 \cdot 150}{50} = 6 \cdot 10^5 \text{ Pa.}$$

2. Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)


Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm

Câu	Lệnh hỏi	Đáp án (Đ/S)	Câu	Lệnh hỏi	Đáp án (Đ/S)
1	a)	Đ	3	a)	Đ
	b)	S		b)	S
	c)	S		c)	Đ
	d)	Đ		d)	Đ
2	a)	Đ	4	a)	Đ
	b)	S		b)	Đ
	c)	Đ		c)	S
	d)	Đ		d)	Đ

Câu 1: Một lượng khí xác định trải qua hai quá trình biến đổi trạng thái được mô tả trên đồ thị (p, V) như hình bên



a) Khối khí chuyển đổi trạng thái bằng quá trình đẳng nhiệt. $\Rightarrow \mathbf{D}$

b) Nhiệt độ khối khí ở trạng thái (1) nhỏ hơn nhiệt độ của khối khí ở trạng thái (2). $\Rightarrow \mathbf{S}$


c) Ở cùng một thể tích V_0 , áp suất của khối khí khi ở nhiệt độ T_1 nhỏ hơn áp suất của khối khí khi ở nhiệt độ T_2 . $\Rightarrow \mathbf{S}$

(Do $T_1 > T_2$ nên $P_1 > P_2$)

d) Áp suất của khối khí dù ở nhiệt độ nào, luôn tỉ lệ nghịch với thể tích của nó. $\Rightarrow \mathbf{D}$

$$\frac{p_1}{V_1} = \frac{p_2}{V_2}$$

Câu 2: Một khối khí khi đặt ở điều kiện nhiệt độ không đổi thì có sự biến thiên của thể tích theo áp suất như hình vẽ



a. Đường biểu diễn sự biến thiên của thể tích theo áp suất khi nhiệt độ không đổi gọi là đường đẳng nhiệt. $\Rightarrow \mathbf{D}$

b. Quá trình biến đổi trạng thái của khối khí này là giãn nở đẳng nhiệt. $\Rightarrow \mathbf{S}$

Quá trình biến đổi trạng thái của khối khí này là nén đẳng nhiệt.


c. Khi áp suất khối khí thay đổi từ 0,5 kN/m² đến 1,5 kN/m² thì thể tích của khối khí tăng một lượng 3,2 m³. $\Rightarrow \mathbf{D}$

$$\Delta V = 4,8 - \frac{1,0 \cdot 2,4}{1,5} = 3,2 \text{ m}^3$$

d. Khi áp suất khối khí có giá trị 0,50 kN/m² thì thể tích khối khí là 4,8 m³. $\Rightarrow \mathbf{D}$

$$V_2 = \frac{p_1 V_1}{p_2} = \frac{1,0 \cdot 2,4}{0,5} = 4,8 \text{ m}^3$$

Câu 3: Một bọt khí có thể tích $1,5 \text{ cm}^3$ được tạo ra bởi một tàu ngầm đang lặn ở độ sâu 100 m dưới mực nước biển. Giả sử nhiệt độ của bọt khí là không đổi. Cho khối lượng riêng của nước biển là $\rho = 1,00 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$. Áp suất khí quyển là $p_0 = 1,00 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$.



a. Vì nhiệt độ của bọt khí là không đổi nên có thể áp dụng định luật Boyle đối với trạng thái ở trên mặt nước và dưới mặt nước 100 m . $\Rightarrow \text{Đ}$

b. Khi bọt khí nổi lên mặt nước, áp suất của bọt khí nhỏ hơn áp suất khí quyển $p_0 = 1,00 \cdot 10^5 \text{ Pa} \Rightarrow \text{S}$
 Khi bọt khí nổi lên mặt nước, áp suất của bọt khí bằng áp suất khí quyển $p_0 = 1,00 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

c. Áp suất của bọt khí ở độ sâu 100 m dưới mực nước biển là $11,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. $\Rightarrow \text{Đ}$


$$p_1 = p_0 + \rho gh = 1,00 \cdot 10^5 + 1,00 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 100 = 11,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

d. Khi bọt khí nổi lên mặt nước thì sẽ có thể tích là $16,5 \text{ cm}^3$. $\Rightarrow \text{Đ}$

Đối với trạng thái ở độ sâu 100 m và trên mặt nước thì ta áp dụng định luật Boyle

$$p_1 \cdot V_1 = p_0 \cdot V_0 \Rightarrow V_0 = \frac{p_1 \cdot V_1}{p_0} = \frac{11,0 \cdot 10^5 \cdot 1,5}{1,00 \cdot 10^5} = 16,5 \text{ cm}^3$$

Câu 4: Một khối khí khi đặt ở điều kiện tiêu chuẩn (trạng thái A). Nén khí và giữ nhiệt độ không đổi đến trạng thái B. Đồ thị áp suất theo thể tích được biểu diễn như hình vẽ:



a. Thể tích khí ở trạng thái B là $1,12$ lít. $\Rightarrow \text{Đ}$

b. Số mol của khối khí ở điều kiện tiêu chuẩn là $0,1 \text{ mol}$. $\Rightarrow \text{Đ}$

Số mol của khối khí ở điều kiện tiêu chuẩn (Trạng thái A) là $V = n \cdot 22,4 = 2,24(l)$
 $\Rightarrow n = 0,1 \text{ mol}$.

c. Khi thể tích của khối khí là $1,4$ lít thì áp suất là $1,9 \text{ atm} \Rightarrow \text{S}$

Khi thể tích của khối khí là $1,4$ lít thì áp suất là

$$p_0 V_0 = p_3 V_3 \Rightarrow p_3 = \frac{p_0 V_0}{V} = \frac{1,2,24}{1,4} = 1,6 atm$$

d. Đường biểu diễn quá trình nén đẳng nhiệt là một cung hypebol AB. $\Rightarrow$ **D**

3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6

Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm

Câu	Đáp án	Câu	Đáp án
1	1,89	4	2,42
2	4,29	5	5
3	0,8	6	3,5

Câu 1. Một bọt khí nổi từ đáy giếng sâu 9 m lên mặt nước. Khi lên tới mặt nước, thể tích của bọt khí tăng lên bao nhiêu lần? Coi áp suất khí quyển là $1,013 \cdot 10^5$ Pa; khối lượng riêng của nước giếng là 1003 kg/m^3 . Nhiệt độ của nước giếng không thay đổi theo độ sâu. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.
(kết quả lấy 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)



Đáp án:

1	,	8	9
---	---	---	---

$$p_1 \cdot V_1 = p_0 \cdot V_0 \Leftrightarrow (p_0 + \rho gh) \cdot V_1 = p_0 \cdot V_0$$

$$V_0 = \frac{(p_0 + \rho gh) \cdot V_1}{p_0} = \frac{(1,013 \cdot 10^5 + 1003 \cdot 10 \cdot 9) \cdot V_1}{1,013 \cdot 10^5} = 1,89 V_1$$

Câu 2. Xét lượng khí ôxi đựng trong một bình thể tích 20 lít dưới áp suất 150 atm ở nhiệt độ 0°C . Biết ở điều kiện chuẩn khối lượng riêng của ôxi là $1,43 \text{ kg/m}^3$. Tính khối lượng khí ôxi trong bình theo đơn vị kg?
(kết quả lấy 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)

Đáp án:

4	,	2	9
---	---	---	---

Xét cùng một lượng khí có khối lượng m ở hai trạng thái.

Áp dụng ĐL Bôi lơ:

$$pV = p_0 V_0 \Leftrightarrow pV = p_0 \frac{m}{\rho} \Leftrightarrow 150 (\text{atm}) \cdot 20 \cdot 10^{-3} (\text{m}^3) = 1 \cdot \frac{m}{1,43} \Rightarrow m = 4,29 \text{ kg}$$

Câu 3. Một bình có dung tích $V_1 = 4$ lít chứa một khối khí lúc đầu ở áp suất $p_1 = 2,5$ atm được thông với một bình thứ 2 có dung tích $V_2 = 8,5$ lít và được rút chân không. Áp suất của khối khí sau khi 2 bình được thông nhau là bao nhiêu atm?
(kết quả lấy 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)



Hình. Một bình chứa khí thông với một bình hút chân không

Đáp án:	0	,	8	
----------------	----------	----------	----------	--

$$p_1 \cdot V_1 = p \cdot (V_1 + V_2) \Rightarrow p = \frac{p_1 V_1}{V_1 + V_2} = \frac{2,5 \cdot 4}{4 + 8,5} = 0,8 \text{ atm}$$

Câu 4. Khi thở ra, dung tích của phổi là 2,400 lít và áp suất của không khí trong phổi là $101,70 \cdot 10^3$ Pa. Cho biết khi hít vào, áp suất này trở thành $101,01 \cdot 10^3$ Pa. Dung tích của phổi khi hít vào là bao nhiêu lít? (kết quả lấy 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)




Đáp án:	2	,	4	2
----------------	----------	----------	----------	----------

Trạng thái 1 : $V_1 = 2,400$ lít , $p_1 = 101,70 \cdot 10^3$ Pa

Trạng thái 2 : $V_2 = ?$, $p_2 = 101,01 \cdot 10^3$ Pa

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2 \Rightarrow V_2 = \frac{p_1 V_1}{p_2} = \frac{101,70 \cdot 10^3 \cdot 2,400}{101,01 \cdot 10^3} = 2,42 \text{ lít}$$

Câu 5. Một xilanh đang chứa một khối khí, khi đó pit-tông cách đáy xilanh một khoảng 10 cm. Hỏi phải đẩy pit-tông một đoạn bằng bao nhiêu cm để áp suất khí trong xilanh tăng gấp 2 lần? Coi nhiệt độ của khí không đổi. (kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)




Đáp án:	5			
----------------	----------	--	--	--

$$p_1 V_1 = p_2 V \Rightarrow p_1 S l = 2 p_1 \cdot S (l - \Delta l) \Rightarrow l = 2 (l - \Delta l) \Rightarrow l = 10 \text{ cm} \Rightarrow \Delta l = 5 \text{ cm}$$

Câu 6. Nén đẳng nhiệt một khối khí từ thể tích ban đầu 7 lít xuống còn 2 lít. Áp suất của khối khí sau khi nén tăng bao nhiêu lần so với ban đầu?

(kết quả lấy 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)



Đáp án:	3	,	5	
---------	---	---	---	--

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2 \Rightarrow \frac{p_2}{p_1} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{7}{2} = 3,5. \text{ Vậy } p_2 = 3,5 p_1$$


III – BÀI TẬP TỰ LUYỆN

1. Câu trắc nhiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)


Câu	Đáp án	Câu	Đáp án
1	A	10	C
2	A	11	A
3	D	12	C
4	A	13	B
5	D	14	A
6	D	15	C
7	C	16	D
8	A	17	A
9	C	18	C

Câu 1. Đồ thị biểu diễn hai đường đẳng nhiệt của cùng một lượng khí lí tưởng biểu diễn như hình vẽ. Mối quan hệ về nhiệt độ của hai đường đẳng nhiệt này là



- A. $T_2 > T_1$.
 B. $T_2 = T_1$.
 C. $T_2 < T_1$.
 D. $T_2 \leq T_1$.

Câu 2. Cho đồ thị biểu diễn sự biến đổi trạng thái của cùng một lượng khí lí tưởng xác định trong hệ trục (pOV) như hình vẽ.



- Tính áp suất của khối khí khi khối khí có thể tích là 8ℓ . (Đơn vị áp suất là atm)
- A. 0,75 atm B. 0,5 atm C. 1,5 atm D. 1,0 atm

Ta có:

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \Leftrightarrow 1.6 = p_2 .8 \Leftrightarrow p_2 = 0,75 \text{ atm.}$$


Câu 3. Trong hệ tọa độ (V,T), đường đẳng nhiệt là:

- A. Đường thẳng có phương qua O. B. Đường hypebol.
C. Đường thẳng vuông góc trục V. D. Đường thẳng vuông góc trục T.


Câu 4. Hệ thức nào sau đây là của định luật Bôi-lơ?

- A. $pV = \text{hằng số}$ B. $p_1 V_2 = p_2 V_1$. C. $\frac{p}{V} = \text{hằng số}$. D. $\frac{V}{p} = \text{hằng số}$.


Câu 5. Đồ thị ở hình nào sau đây biểu diễn **đúng** định luật Boyle:



Hình 1



Hình 2



Hình 3

- A. Hình 1
B. Hình 2
C. Hình 3
D. Cả 3 hình trên

Câu 6. Để đưa thuốc từ lọ vào trong xilanh của ống tiêm, ban đầu nhân viên y tế đẩy pit-tông sát đầu trên của xilanh, sau đó đưa đầu kim tiêm vào trong lọ thuốc. Khi kéo pit-tông, thuốc sẽ vào trong xilanh. Nhận xét nào sau đây là đúng?



- A. Thể tích khí trong xilanh tăng đồng thời áp suất khí tăng.
B. Thể tích khí trong xilanh giảm đồng thời áp suất khí giảm.
C. Thể tích khí trong xilanh và áp suất khí đồng thời không thay đổi.
D. Thể tích khí trong xilanh tăng đồng thời áp suất khí giảm.
- Câu 7.** Phương trình nào sau đây **không** phải là phương trình của định luật Boyle?


A. $p_1 V_1 = p_2 V_2$.

B. $pV = \text{const.}$


C. $\frac{p_1}{V_1} = \frac{p_2}{V_2}$.

D. $\frac{p_1}{p_2} = \frac{V_2}{V_1}$.


Câu 8. Đồ thị nào sau đây biểu diễn **đúng** định luật Boyle




A.



B.



C.



D.

Câu 9. Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, mật độ phân tử khí trong một đơn vị thể tích

A. giảm tỉ lệ nghịch với áp suất.

B. luôn không đổi.

C. tăng tỉ lệ thuận với áp suất.

D. chưa đủ dữ kiện để kết luận.

Câu 10. Khí được nén đẳng nhiệt từ thể tích 25 lít đến thể tích 15 lít, áp suất khí tăng thêm 0,8at. Tìm áp suất ban đầu của khí?

A. 2 at

B. 3,8 at

C. 1,2 at

D. 1,5 at

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \Leftrightarrow 25 \cdot p_1 = (p_1 + 0,8) \cdot 15 \Rightarrow p_1 = 1,2 \text{ at.}$$

Câu 11. Để bơm đầy một khí cầu đến thể tích 100 m³ có áp suất 0,1 atm ở nhiệt độ không đổi người ta dùng các ống khí hêli có thể tích 50 lít ở áp suất 100 atm. Số ống khí hêli cần để bơm khí cầu bằng

A. 2

B. 5

C. 6

D. 1

$$\begin{cases} p_1 V_1 = 0,1 (\text{atm}) \cdot 100 (\text{m}^3) \\ p_2 V_2 = 100 (\text{atm}) \cdot 50 \cdot 10^{-3} (\text{m}^3) \cdot n \end{cases} \xrightarrow{p_1 V_1 = p_2 V_2} n = 2$$

Câu 12. Một khối khí có thể tích 30 lít, ở áp suất 10⁵Pa. Nén khối khí với nhiệt độ không đổi sao cho áp suất tăng lên 3.10⁵Pa thì thể tích của khối khí đó là?

A. 15 lít

B. 12 lít

C. 10 lít

D. 14 lít

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2 \Leftrightarrow 10^5 \cdot 30 = 3 \cdot 10^5 \cdot V_2 \Rightarrow V_2 = 10 \text{ lít.}$$

Câu 13. Dưới áp suất 10⁵Pa một lượng khí có thể tích 10 lít. Nếu nhiệt độ được giữ không đổi và áp suất tăng lên 25% so với ban đầu thì thể tích của lượng khí này là

A. V₂ = 12,5 lít.


B. V₂ = 8 lít.

C. V₂ = 2,5 lít.

D. V₂ = 40 lít.

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow 10^5 (\text{Pa}) \cdot 10 (\text{l}) = (10^5 + 25\% \cdot 10^5) (\text{Pa}) V_2 \Rightarrow V_2 = 8 (\text{l})$$

Câu 14. Cho đồ thị biểu diễn sự biến đổi trạng thái của cùng một lượng khí lí tưởng xác định trong hệ trục (pOV) như hình vẽ.



Tính áp suất của khối khí khi khối khí có thể tích là 8ℓ. (Đơn vị áp suất là atm)

A. 0,75 atm

B. 0,5 atm

C. 1,5 atm

D. 1,0 atm

Ta có:

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \Leftrightarrow 1.6 = p_2 .8 \Leftrightarrow p_2 = 0,75 \text{ atm.}$$

Câu 15. Nén đẳng nhiệt một khối khí xác định từ 10 lít đến 5 lít thì áp suất tăng lên bao nhiêu lần:

A. 5

B. 3

C. 2

D. áp suất không đổi.

Theo định luật Boyle, thể tích của khối khí giảm 2 lần $\Rightarrow$ áp suất tăng 2 lần.**Câu 16.** Người ta điều chế khí hidro và chứa một bình lớn dưới áp suất 1atm ở nhiệt độ 20°C. Tính thể tích khí, lấy từ bình lớn ra để nạp vào bình nhỏ thể tích là 20 lít dưới áp suất 15atm. Coi nhiệt độ không đổi.

A. 100 lít

B. 150 lít

C. 170 lít

D. 300 lít

$$p_1 .V_1 = p_2 .V_2 \Leftrightarrow 1.V_1 = 20.15 \Rightarrow V_1 = 300 \text{ lít.}$$

Câu 17. Định luật Boyle chỉ **đúng**

A. với khí lý tưởng

B. khi áp suất cao.

C. với khí thực.

D. khi nhiệt độ thấp.

Câu 18. Một khối khí lí tưởng xác định có áp suất 2 atm được làm tăng áp suất đến 6 atm ở nhiệt độ không đổi thì thể tích biến đổi một lượng 4 lít. Thể tích ban đầu của khối khí đó là:

A. 3 lít

B. 7 lít

C. 1 lít

D. 2,5 lít

$$p_1 .V_1 = p_2 .V_2 \Leftrightarrow 2.V_1 = 6(V_1 - 4) \Rightarrow V_1 = 1 \text{ lít.}$$

2. Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu	Lệnh hỏi	Đáp án (Đ/S)	Câu	Lệnh hỏi	Đáp án (Đ/S)
1	a)	S	3	a)	S
	b)	Đ		b)	Đ
	c)	S		c)	Đ
	d)	S		d)	S
2	a)	Đ	4	a)	Đ
	b)	Đ		b)	S
	c)	S		c)	S
	d)	Đ		d)	S

Câu 1. Nếu áp suất của một lượng khí lí tưởng xác định tăng 2.10^5 Pa thì thể tích biến đổi 3 lít. Nếu áp suất của lượng khí trên tăng 5.10^5 Pa thì thể tích biến đổi 5 lít. Biết nhiệt độ không đổi trong các quá trình trên.a) Một lượng khí lí tưởng xác định với nhiệt độ không đổi thì thể tích tỉ lệ thuận với áp suất. $\Rightarrow$ S
Một lượng khí lí tưởng xác định với nhiệt độ không đổi thì thể tích tỉ lệ nghịch với áp suấtb) Thể tích và áp suất của khối khí biến đổi thông qua định luật Boyle. $\Rightarrow$ Đc) Áp suất ban đầu của khối khí là 5.10^5 Pa $\Rightarrow$ S**Giải thích :**

$$pV = (p + 2)(V - 3) = (p + 5)(V - 5) \Rightarrow \begin{cases} 2V - 3p = 6 \\ 5V - 5p = 25 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V = 9 \text{ (l)} \\ p = 4.10^5 \text{ (Pa)} \end{cases}$$


Áp dụng ĐL Bôi-lơ:

Áp suất ban đầu của khối khí là 4.10^5 Pa

d) Thể tích ban đầu của khối khí là 8 lít $\Rightarrow$ S

Thể tích ban đầu của khối khí là 9 lít

Câu 2. Một khối khí lý tưởng thực hiện quá trình được biểu diễn trên đồ thị. Biết áp suất của khối khí ở cuối quá trình là 1,2atm.



a) Quá trình biến đổi từ trạng thái 1 đến trạng thái 2 là quá trình đẳng nhiệt. $\Rightarrow$ Đ

b) Thể tích và áp suất của khối khí biến đổi thông qua định luật Boyle $\Rightarrow$ Đ

c) Áp suất của khối khí ở trạng thái 1 là 1,6 atm $\Rightarrow$ S

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2 \Rightarrow 2,4 \cdot p_1 = 7,2 \cdot 1,2 \Rightarrow p_1 = 3,6 \text{ atm}$$

d) Đường đẳng nhiệt biểu diễn trong hệ tọa độ (p,V) có dạng là 1 nhánh parabol $\Rightarrow$ Đ

Câu 3. Dưới áp suất 10^5 Pa một lượng khí có thể tích 10 lít. Nếu nhiệt độ được giữ không đổi và áp suất tăng lên 25% so với ban đầu thì thể tích của lượng khí này là

a) Áp suất của lượng khí ở trạng thái sau có giá trị là $15 \cdot 10^5$ Pa $\Rightarrow$ S

Giải thích :

$$p_2 = p_1 + 0,25 p_1 = 1,25 p_1 = 1,25 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

b) Thể tích ban đầu của lượng khí là $10000 \text{ cm}^3 \Rightarrow$ Đ

c) Giữa áp suất và thể tích của lượng khí có mối liên hệ là $p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow$ Đ

d) Thể tích của lượng khí sau khi áp suất tăng lên 25% so với ban đầu là 12 lít $\Rightarrow$ S

Giải thích :

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow 10^5 \cdot 10 = 1,25 \cdot 10^5 \cdot V_2 \Rightarrow V_2 = 8 \text{ (l)}$$

Câu 4. Nhận định sau là đúng hay sai

a) Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p,V) là một cung hypebol. $\Rightarrow$ Đ

b) Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (V, T) là một đoạn thẳng song song với trục OT. $\Rightarrow$ S

c) Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, T) là một đoạn thẳng vuông góc với trục OT. $\Rightarrow$ S

d) Ứng với các nhiệt độ khác nhau của cùng một lượng khí có các đường đẳng nhiệt là giống nhau. $\Rightarrow$ S

3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm

Câu	Đáp án	Câu	Đáp án
1	24	4	52,5
2	4	5	212

3	70	6	2026
---	----	---	------

Câu 1. Một khối khí có thể tích 12 lít ở áp suất 10^5 Pa. Hỏi khi áp suất giảm còn $1/2$ lần áp suất ban đầu thì thể tích của lượng khí là bao nhiêu lít? (Biết nhiệt độ không đổi).
(kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)

Đáp án:	2	4		
----------------	----------	----------	--	--

Trạng thái 1 : $V_1 = 10 \text{ lít}, p_1 = 10^5 \text{ Pa}$

Trạng thái 2 : $V_2 = ? \text{ lít}, p_2 = \frac{p_1}{3} = \frac{1}{3} \cdot 10^5 \text{ Pa}$

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2 \Rightarrow 12 \cdot 10^5 = \frac{1}{2} \cdot 10^5 \cdot V_2 \Rightarrow V_2 = 24 \text{ lít}$$

Câu 2. Nếu áp suất một lượng khí tăng thêm 2 atm thì thể tích biến đổi 3 lít. Nếu áp suất tăng thêm 5 atm thì thể tích biến đổi 5 lít. Áp suất ban đầu của khí là bao nhiêu atm? Biết nhiệt độ không đổi.
(kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)

Đáp án:	4			
----------------	----------	--	--	--

Trạng thái 1 : V_1, p_1

Trạng thái 2 : $V_2 = (V_1 - 3) \text{ lít}, p_2 = p_1 + 2 \text{ atm}$

Trạng thái 3 : $V_3 = (V_1 - 5) \text{ lít}, p_3 = p_1 + 5 \text{ atm}$

$$\text{Giải hệ phương trình : } \left\{ \begin{array}{l} p_1 \cdot V_1 = (p_1 + 2) \cdot (V_1 - 3) \\ p_1 \cdot V_1 = (p_1 + 5) \cdot (V_1 - 5) \end{array} \right. \text{~~~~}$$

Suy ra : $V_1 = 9 \text{ lít}$ và $p_1 = 4 \text{ atm}$

Câu 3. Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít đến thể tích 7 lít thì thấy áp suất tăng lên một lượng $\Delta p = 30 \text{ kPa}$. Áp suất ban đầu của khí là bao nhiêu kPa?
(kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)

Đáp án:	7	0		
----------------	----------	----------	--	--

Giải thích :

Trạng thái 1 : $V_1 = 10 \text{ lít}, p_1 = ?$

Trạng thái 2 : $V_2 = 7 \text{ lít}, p_2 = p_1 + 30 \text{ kPa}$

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2 \Rightarrow 10 p_1 = 7 \cdot (p_1 + 30) \Rightarrow p_1 = 70 \text{ kPa}$$

Câu 4. Một bọt khí có thể tích $2,5 \text{ cm}^3$ được tạo ra từ khoang tàu ngầm đang lặn ở độ sâu 200m dưới mực nước biển. Giả sử nhiệt độ của bọt khí là không đổi, biết khối lượng riêng của nước biển là 103 kg/m^3 , áp suất khí quyển là $p_0 = 10^5 \text{ Pa}$ và $g = 10 \text{ m/s}^2$. Khi bọt khí này nổi lên mặt nước thì sẽ có thể tích bằng bao nhiêu cm^3 (kết quả lấy 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)



Đ	5	2	,	5
á				
p				

á				
n				
:				

Giải thích :

$$\frac{V_0}{V} = 1 + \frac{\rho gh}{p_0} \Rightarrow V_0 = V \left(1 + \frac{\rho gh}{p_0} \right) = 2,5 \left(1 + \frac{10^3 \cdot 10 \cdot 200}{10^5} \right) = 52,5 \text{ cm}^3$$

Câu 5. Một bơm xe đạp hình trụ có đường kính trong là 3 cm. Người ta dùng ngón tay bịt kín đầu vòi bơm và ấn pit-tông từ từ để nén không khí trong bơm sao cho nhiệt độ không thay đổi. Lấy áp suất khí quyển là $p_0 = 10^5 \text{ Pa}$. Khi thể tích của không khí trong bơm giảm đi 4 lần thì lực tác dụng lên pit-tông bằng bao nhiêu N? (kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)



Đáp án:	2	1	2	
----------------	----------	----------	----------	--

Áp dụng $p = p_0 + \frac{F}{S}$ (Do nén khí).

$$p_0 V_0 = p V \Rightarrow \frac{V_0}{V} = \frac{p}{p_0} = \frac{p_0 + \frac{F}{S}}{p_0} = 4 \Rightarrow \frac{F}{S p_0} = 3 \Rightarrow F = 3 S p_0 = 3 \cdot \frac{\pi d^2}{4} p_0 = 3 \cdot \frac{\pi \cdot 0,03^2}{4} \cdot 10^5 = 212$$

Câu 6. Một bọt khí có thể tích tăng gấp 3 khi nổi từ đáy hồ lên mặt nước. Giả sử nhiệt độ ở đáy hồ và mặt hồ là như nhau, biết trọng lượng riêng của nước là $d = 10^4 \text{ N/m}^3$ và áp suất của khí quyển là $p_0 = 760 \text{ mmHg} = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. Độ sâu của hồ là bao nhiêu m? (Kết quả lấy đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân).

Đáp án:	2	,	0	3
----------------	----------	----------	----------	----------

Áp suất và thể tích của bọt khí khi ở đáy hồ (ở độ cao h so với mặt nước) : V_1

$$p_1 = p_0 + d \cdot g \cdot h = 1,013 \cdot 10^5 + 10^4 \cdot 10 \cdot h = 1,013 \cdot 10^5 + 10^5 \cdot h$$

Áp suất và thể tích của bọt khí khi ở trên mặt nước :

$$V_0 = 3V_1, \quad p_0 = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$\text{Ta có : } p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2 \Leftrightarrow V_1 \cdot (1,013 \cdot 10^5 + 10^5 h) = 1,013 \cdot 10^5 \cdot 3V_1 \Rightarrow h = 2,03 \text{ m}$$

I – TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Phương pháp giải



- Gọi n là số lần bơm, V_0 là thể tích mỗi lần bơm
- Xác định các điều kiện trạng thái ban đầu:
Áp suất p_1 , thể tích V_1
- Xác định các điều kiện trạng thái lúc sau:
Áp suất p_2 , thể tích V_2
- Theo định luật Boyle cho quá trình biến đổi đẳng nhiệt của lượng khí xác định, ta có

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow n = ?$$

II – BÀI TẬP LUYỆN TẬP

1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

Câu 1: Trong hệ tọa độ (p , V) đường đẳng nhiệt là đường:

- A. Elip. B. Parabol. C. Thẳng. D. Hypebol.

Câu 2 : Người ta bơm không khí áp suất 1 atm, vào bình có dung tích 10 lít. Biết mỗi lần bơm, bơm được 250 cm^3 không khí. Trước khi bơm đã có không khí 1 atm trong bình và trong khi bơm nhiệt độ không khí không đổi. Tính áp suất khí trong bình sau 50 lần bơm.

- A. 1,45 atm. B. 4,25 atm. C. 2,85 atm. D. 2,25 atm.

$$V_1 = NV + V_2 = 50.250.10^{-3} + 10 = 22,5 (\text{lít})$$

* Thể tích không khí ở áp suất 1 atm:

$$p_2 = p_1 \frac{V_1}{V_2} = 1. \frac{22,5}{10} = 2,25 (\text{atm})$$

Theo định luật Boyle:

Câu 3: Ba thông số nào sau đây xác định trạng thái của một lượng khí xác định?

- A. Áp suất, nhiệt độ, thể tích. B. Nhiệt độ, khối lượng, áp suất.
C. Áp suất, thể tích, khối lượng. D. Thể tích, nhiệt độ, khối lượng.

Câu 4: Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào **không** phải là thông số trạng thái của 1 lượng khí?

- A. Áp suất. B. Thể tích.
C. Khối lượng. D. Nhiệt độ tuyệt đối.

Câu 5: Khi nén khí đẳng nhiệt thì số phân tử trong một đơn vị thể tích

- A. không đổi.
B. tăng tỉ lệ với bình phương áp suất.
C. tăng tỉ lệ thuận với áp suất.
D. giảm tỉ lệ nghịch với áp suất.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là **đúng** với nội dung định luật Boyle?

- A. Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.
B. Trong quá trình đẳng áp, nhiệt độ không đổi, tích của áp suất và thể tích của một khối lượng khí xác định là một hằng số.
C. Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định áp suất tỉ lệ thuận với thể tích.
D. Trong quá trình đẳng tích, ở nhiệt độ không đổi, tích của áp suất và thể tích của một lượng khí xác định là một hằng số.

Câu 7: Đẩy pit-tông của một xilanh đủ chậm để nén lượng khí chứa trong xilanh sao cho thể tích của lượng khí này giảm đi 4 lần ở nhiệt độ không đổi. Khi đó áp suất của khí trong xi lanh

- A. không thay đổi. B. tăng thêm 4 lần.
C. tăng lên 8 lần. D. giảm đi 8 lần.

Câu 8: Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình?

- B. Đun nóng không khí trong một xi lanh, khí nở ra đẩy pit tông chuyển động.
C. Không khí trong quả bóng bay bị phơi nắng nở ra làm căng bóng.
A. Đun nóng không khí trong một bình kín.
D. Cả ba quá trình trên đều không phải đẳng quá trình.

Câu 9: Định luật Boyle cho biết mối liên hệ giữa các thông số trạng thái của một lượng khí xác định trong điều kiện nào?

- A. Áp suất không đổi. B. Thể tích không đổi.
C. Nhiệt độ không đổi. D. Cả thể tích và nhiệt độ thay đổi.

Câu 10: Một bơm không khí có thể tích 0,125 l và áp suất của bơm không khí trong bơm là 1 atm. Dùng bơm để bơm không khí vào một quả bóng có dung tích không đổi là 2,5 l. Giả sử ban đầu áp suất của khí trong bình là 1 atm và nhiệt độ của quả bóng là không thay đổi trong suốt quá trình bơm. Hãy xác định áp suất của khối khí trong bóng sau 12 lần bơm.

- A. 5 atm B. 1,6 atm C. 0,5 atm D. 3,5 atm

Xét khối khí trong bóng sau 12 lần bơm.

Trước khi bơm vào bóng, khối khí đó có thể tích là: $V_0 = 12 \cdot 0,125 + 2,5 = 4 \text{ l}$ và áp suất của khối khí đó ban đầu là $p_0 = 1 \text{ atm}$.

Sau khi bơm vào bóng thể tích của khối khí đó là $V = 2,5 \text{ l}$ và áp suất của quá trình đó là p

Áp dụng định luật Boyle: $p_0 \cdot V_0 = pV \Leftrightarrow 1 \cdot 4 = p \cdot 2,5 \Rightarrow p = 1,6 \text{ atm}$

Câu 11: Một bơm xe đạp hình trụ có đường kính trong là 3 cm. Người ta dùng ngón tay bịt kín đầu vòi bơm và ấn pit-tông từ từ để nén không khí trong bơm sao cho nhiệt độ không thay đổi. Lấy áp suất khí quyển là $p_0 = 10^5 \text{ Pa}$. Khi thể tích của không khí trong bơm giảm đi 4 lần thì lực tác dụng lên pit-tông bằng bao nhiêu N?

- A. 232 N B. 252 N C. 212 N D. 220 N

Có ngoại lực F xuất hiện, áp dụng $p = p_0 + \frac{F}{S}$ (Do nén khí).
Áp dụng định luật Boyle:

$$p_0 V_0 = pV \Rightarrow \frac{V_0}{V} = \frac{p}{p_0} = \frac{p_0 + \frac{F}{S}}{p_0} = 4 \Rightarrow \frac{F}{Sp_0} = 3 \Rightarrow F = 3Sp_0 = 3 \cdot \frac{\pi d^2}{4} p_0 = 3 \cdot \frac{\pi \cdot 0,03^2}{4} \cdot 10^5 = 212$$

Câu 12: Một quả bóng da có dung tích 1,25 lít. Người ta bơm không khí ở áp suất 10^5 Pa vào bóng. Mỗi lần bơm được 125 cm^3 không khí. Biết trước khi bơm, trong bóng có không khí ở áp suất 10^5 Pa và nhiệt độ không đổi trong thời gian bơm. Áp suất không khí trong quả bóng sau 20 lần bơm bằng

- A. $2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ B. $4,5 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ C. $7 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ D. $1,5 \cdot 10^5 \text{ Pa}$

Xét quá trình biến đổi của lượng không khí được bơm vào quả bóng

$$\text{Trạng thái 1: } \begin{cases} V_1 = 125 \cdot 20 = 2500 \text{ cm}^3 = 2,5 \text{ l} \\ p_1 = p_0 = 10^5 \text{ N/m}^2 \end{cases}$$

$$\text{Trạng thái 2: } \begin{cases} V_2 = 1,25 \text{ l} \\ p_2 = ? \end{cases}$$

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow p_2 = \frac{p_1 V_1}{V_2} = \frac{10^5 \cdot 2,5}{1,25} = 2 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$$

Câu 13: Để bơm đầy một khí cầu đến thể tích 100m^3 có áp suất 1atm ở nhiệt độ không đổi người ta dùng các ống khí hêli có thể tích 50 lít ở áp suất 100atm . Số ống khí hêli cần để bơm khí cầu bằng:

- A. 9 B. 12 C. 1 D. 20

Gọi n là Số ống khí hêli cần để bơm khí cầu

$$\begin{cases} p_1 V_1 = 1(\text{atm}) \cdot 100(\text{m}^3) \\ p_2 V_2 = 100(\text{atm}) \cdot 50 \cdot 10^{-3}(\text{m}^3) \cdot n \end{cases} \xrightarrow{p_1 V_1 = p_2 V_2} n = 20$$

Ta có:

Câu 14: Người ta dùng một bơm tay có ống bơm dài 40 cm và đường kính trong 4 cm để bơm không khí vào một túi cao su sao cho túi phồng lên. Sau khi bơm, không khí trong túi có thể tích là $6,28\text{ lít}$ và áp suất không khí trong túi là 4 atm . Biết áp suất khí quyển là 1 atm và coi nhiệt độ của không khí được bơm vào túi không đổi. Số lần đẩy bơm là

- A. 100 lần. B. 80 lần. C. 25 lần. D. 50 lần.

Trạng thái 1: Lượng khí được bơm vào quả bóng:
$$\begin{cases} p_1 = p_0 = 1\text{ atm} \\ V_1 = n \cdot S \cdot h = n \cdot \frac{\pi d^2}{4} \cdot h = n \cdot \frac{\pi \cdot 4^2}{4} \cdot 40 = n \cdot 502,4\text{ cm}^3 \end{cases}$$

Trạng thái 2: Khí được nén ở trong quả bóng:
$$\begin{cases} p_2 = 4(\text{atm}) \\ V_2 = 6,28(\text{l}) \end{cases}$$

Áp dụng định luật Boyle: $p_1 V_1 = p_2 V_2 \Leftrightarrow 1 \cdot n \cdot 502,4 = 4 \cdot 6,28 \cdot 10^3 \Rightarrow n = 50$

Câu 15: Dùng ống bơm bơm một quả bóng đang bị xẹp, mỗi lần bơm đẩy được 50cm^3 không khí ở áp suất 1 atm vào quả bóng. Sau 60 lần bơm quả bóng có dung tích 2 lít , coi quá trình bơm nhiệt độ không đổi, áp suất khí trong quả bóng sau khi bơm là:

- A. 1,25 atm B. 1,5 atm C. 2 atm D. 2,5 atm

Áp dụng định luật Boyle:

$$p_0 \cdot nV_0 = pV \Leftrightarrow 1 \cdot 60 \cdot 50 = p \cdot 2 \cdot 10^3 \Rightarrow p = 1,5\text{ atm}$$

Câu 16: Bơm không khí có áp suất $0,8\text{ atm}$ và nhiệt độ không đổi $V = 2,5\text{ lít}$. Mỗi lần bơm, ta đưa được 125 cm^3 không khí vào trong quả bóng đó. Sau khi bơm 40 lần, áp suất bên trong quả bóng có giá trị là

- A. 1,25 atm. B. 3,5 atm. C. 2,5 atm. D. 1,6 atm.

Áp dụng định luật Boyle: $p_1 \cdot nV_1 = p_2 V_2 \Leftrightarrow 0,8 \cdot 40 \cdot 125 = p \cdot 2,5 \cdot 10^3 \Rightarrow p = 1,6\text{ atm}$

Câu 17: Quả bóng có dung tích 4 lít bị xẹp. Dùng ống bơm mỗi lần đẩy được 40cm^3 không khí ở áp suất 1 atm vào quả bóng. Sau 20 lần bơm, áp suất khí trong quả bóng là bao nhiêu? Coi nhiệt độ không đổi trong quá trình bơm.

- A. 0,2 atm B. 4,5 atm C. 0,15 atm D. 5 atm

Đổi $4\text{ lít} = 4\text{ dm}^3 = 4000\text{ cm}^3$

Áp dụng định luật Boyle: $p \cdot V = p_0 \cdot nV_0 \Rightarrow p = \frac{nV_0}{V} p_0 = \frac{20 \cdot 40}{4000} p_0 = 0,2\text{ atm}$

Câu 18: Người ta dùng bơm có pit-tông diện tích 8 cm^2 và khoảng chạy 25 cm bơm một bánh xe đạp sao cho áp lực của bánh xe đạp lên mặt đường là 350 N thì diện tích tiếp xúc là 50 cm^2 . Ban đầu bánh xe đạp chứa không khí ở áp suất khí quyển $p_0 = 10^5 \text{ Pa}$ và có thể tích là $V_0 = 1500 \text{ cm}^3$. Giả thiết khi áp suất không khí trong bánh xe đạp vượt quá $1,5p_0$ thì thể tích của bánh xe đạp là 2000 cm^3 . Tính số lần đẩy bơm?

A. 12

B. 25

C. 18

D. 10

Có ngoại lực F xuất hiện (lực nén), áp dụng $p = p_0 + \frac{F}{S}$ (Do nén khí).

*Áp suất trong bánh xe sau khi bơm xong:

$$p = p_0 + \frac{F}{S} = 10^5 + \frac{350}{50 \cdot 10^{-4}} = 1,7 \cdot 10^5 > 1,5 p_0 \Rightarrow V = 2000 \text{ cm}^3$$

	Trạng thái 1	Trạng thái 2
Áp suất	$p_1 = p_0$	$p_2 = p$
Thể tích	$V_1 = V_0 + n \cdot l \cdot S$	$V_2 = 2000 \text{ cm}^3$

*Áp dụng ĐL Boyle:

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow p_0 (V_0 + n l S) = p V_2 \Leftrightarrow 10^5 (1500 + n \cdot 25 \cdot 8) = 1,7 \cdot 10^5 \cdot 2000 \Rightarrow n = 9,5 \approx 10$$

2. Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu	Lệnh hỏi	Đáp án (Đ/S)	Câu	Lệnh hỏi	Đáp án (Đ/S)
1	a)	Đ	3	a)	Đ
	b)	S		b)	Đ
	c)	S		c)	S
	d)	Đ		d)	Đ
2	a)	S	4	a)	Đ
	b)	Đ		b)	Đ
	c)	S		c)	S
	d)	S		d)	S

Câu 1: Người ta dùng bơm để bơm một bánh xe đạp sao cho áp lực của bánh xe đạp lên mặt đường là 350 N thì diện tích tiếp xúc là 50 cm^2 . Ban đầu bánh xe đạp chứa không khí ở áp suất khí quyển $p_0 = 10^5 \text{ Pa}$ và có thể tích là $V_0 = 1500 \text{ cm}^3$. Giả thiết khi áp suất không khí trong bánh xe đạp vượt quá $1,5p_0$ thì thể tích của bánh xe đạp là 2000 cm^3 .



a. Có thể xem đây là quá trình đẳng nhiệt vì nhiệt độ không đổi $\Rightarrow \mathbf{Đ}$

b. Áp suất của bánh xe sau khi bơm xong là $1,25 \cdot 10^5 \text{ Pa} \Rightarrow \mathbf{S}$

Áp suất trong bánh xe sau khi bơm xong:

$$p = \frac{F}{S} + p_0 = \frac{350}{50 \cdot 10^{-4}} + 10^5 = 1,7 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

c. Thể tích của bánh xe đạp sau khi bơm xong là $1850 \text{ cm}^3 \Rightarrow \mathbf{S}$

$$1,7 \cdot 10^5 > 1,5 p_0 \Rightarrow V = 2000 \text{ cm}^3$$

d. Nếu mỗi lần đẩy bơm chỉ đưa được 100 cm^3 không khí vào bánh xe thì phải đẩy bơm 19 lần $\Rightarrow \mathbf{Đ}$

$$\begin{cases} T_1 T_1 \left\{ \begin{array}{l} p_1 = p_0 \\ V_1 = V_0 + 100n (\text{cm}^3) \end{array} \right. \\ T_2 T_2 \left\{ \begin{array}{l} p_2 = p \\ V_2 = 2000 (\text{cm}^3) \end{array} \right. \end{cases}$$

$$\Rightarrow p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow p_0 (V_0 + nLS) = p V_2 \Leftrightarrow 10^5 (1500 + n \cdot 100) = 1,7 \cdot 10^5 \cdot 2000$$

$$\Rightarrow n = 19$$

Câu 2: Một quả bóng da có dung tích 2,0 lít chứa không khí ở áp suất $8 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. Người ta bơm không khí ở áp suất 10^5 Pa vào bóng. Mỗi lần bơm được 160 cm^3 không khí.



a. Thể tích của không khí trong quả bóng sau 40 lần bơm là 10 lít $\Rightarrow \mathbf{S}$

Thể tích của không khí trong quả bóng sau 40 lần bơm là $V_2 = 160 \cdot 40 = 6400 \text{ cm}^3 = 6,4 \text{ lít}$.

b. Trong thời gian bơm, nhiệt độ của không khí không đổi nên có thể áp dụng định luật Boyle $\Rightarrow \mathbf{Đ}$

c. Áp suất của không khí trong quả bóng sau 40 lần bơm là $2,8 \cdot 10^5 \text{ Pa} \Rightarrow \mathbf{S}$

Áp suất của không khí trong quả bóng sau 40 lần bơm là

$$p_2 = \frac{p_1 V_1}{V_2} = \frac{8 \cdot 10^5 \cdot 2}{6,4} = 2,5 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

d. Để bơm không khí có áp suất $4 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ vào bóng thì cần phải bơm 30 lần $\Rightarrow \mathbf{S}$

$$V'_2 = \frac{p_1 \cdot V_1}{p'_2} = \frac{8 \cdot 10^5 \cdot 2}{4 \cdot 10^5} = 4 \text{ lít}$$

$$= 4000 \text{ cm}^3$$

$$\frac{4000}{125} = 32$$

Số lần bơm : 32 lần

Câu 3: Một bình đựng khí có dung tích $6 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$ đựng khí áp suất $2,75 \cdot 10^6 \text{ Pa}$. Người ta dùng khí trong bình để thổi các quả bóng bay sao cho bóng có thể tích $3,3 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$ và khí trong bóng có áp suất 10^5 Pa . Coi nhiệt độ của khí không đổi.



a. Khí trong bình chỉ được thổi cho tới khi áp suất của khí trong bình bằng áp suất của khí trong bóng. $\Rightarrow \text{Đ}$

b. Biểu thức của định luật Boyle được áp dụng cho quá trình biến đổi này: $p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow \text{Đ}$

c. Trong quá trình biến đổi đẳng nhiệt của một lượng khí xác định, áp suất tỉ lệ thuận với thể tích. $\Rightarrow \text{S}$
Trong quá trình biến đổi đẳng nhiệt của một lượng khí xác định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.

d. Số lượng bóng thổi được từ bình khí là 48 quả. $\Rightarrow \text{Đ}$

Áp dụng định luật Boyle:

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 = p_2 (n V_{02} + V_1) \Rightarrow 2,75 \cdot 10^6 \cdot 6 \cdot 10^{-3} = 10^5 (n \cdot 3,3 \cdot 10^{-3} + 6 \cdot 10^{-3}) \Rightarrow n = 48$$

Vậy số lượng bóng thổi được là 48 quả

Câu 4: Một bạn nam dùng bơm tay để bơm không khí vào một quả bóng cao su có thể tích là 3 lít, với áp suất không khí là 10^5 Pa . Xung quanh của bơm có chiều cao là 42 cm, đường kính xilanh là 5 cm. Biết trong quá trình bơm nhiệt độ không thay đổi.

a. Thể tích mỗi lần bơm là $824,25 \text{ cm}^3$. $\Rightarrow \text{Đ}$

Thể tích mỗi lần bơm là

$$V_0 = S \cdot h = \frac{\pi d^2}{4} \cdot h = \frac{\pi \cdot 5^2}{4} \cdot 42 = 824,25 \text{ cm}^3$$

b. Có thể áp dụng định luật Boyle cho quá trình
Vì nhiệt độ của không khí không đổi nên có thể cho quá trình biến đổi này

c. Trước khi bơm trong quả bóng không có bóng là $5 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$ ta cần bơm 12 lần. $\Rightarrow \text{S}$

Gọi p_0, V_0 là áp suất và thể tích không khí mỗi lần bơm

Trước khi bơm trong quả bóng không có không khí

$$(n V_0) \cdot p_0 = p_1 V \Rightarrow n = \frac{p_1 V}{p_0 V_0} = \frac{5 \cdot 10^5 \cdot 3}{10^5 \cdot 824,25 \cdot 10^{-3}} \approx 18$$

Áp dụng định luật Boyle :

lần



biến đổi này. $\Rightarrow \text{Đ}$

áp dụng định luật BôiLơ

không khí, để áp suất quả

d. Trước khi bơm trong quả bóng có áp suất là 10^5 N/m^2 . Để áp suất trong quả bóng là 5.10^5 N/m^2 thì cần bơm 8 lần $\Rightarrow$ S

Trước khi bơm trong quả bóng có áp suất là 10^5 N/m^2

Ta có $P = P_1 + P_0 \Rightarrow P_1 = P - P_0 = 5.10^5 - 10^5 = 4.10^5 \text{ Pa}$

Áp dụng định luật Boyle : $(nV_0).P_0 = P_1V \Rightarrow n = \frac{P_1V}{P_0V_0} = \frac{4.10^5.3}{10^5.824,25.10^{-3}} \approx 15$ lần

3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm

Câu	Đáp án	Câu	Đáp án
1	15	4	2,6
2	6	5	0,6
3	75	6	50

Câu 1: Một bạn nam đang đi xe đạp ở đường thì xe bị hết hơi trong săm xe, bạn nam đã mượn bơm để bơm xe. Sau 5 lần bơm thì diện tích tiếp xúc của lốp xe và mặt đất là $S_1 = 40\text{cm}^2$. Hỏi sau bao nhiêu lần bơm nữa thì diện tích tiếp xúc là $S_2 = 10\text{cm}^2$. Biết rằng trọng lực của xe cân bằng với áp lực của không khí trong vỏ xe, thể tích mỗi lần bơm là như nhau và nhiệt độ trong quá trình bơm là không đổi.
(kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)



Đáp án:

1	5		
---	---	--	--

Gọi F là trọng lượng của xe, V_0 là thể tích mỗi lần bơm, V thể tích săm xe
Ta có trong lần bơm đầu tiên: $n_1 = 5$ lần : $F = p_1S_1$

$$F = p_2.S_2 \Rightarrow \frac{p_1}{p_2} = \frac{S_2}{S_1} \quad (1)$$

Trong lần bơm sau n_2 lần:

$$\begin{cases} (n_1V_0).P_0 = P_1V \\ (n_2V_0).P_0 = P_2V \end{cases} \Rightarrow \frac{n_1}{n_2} = \frac{P_1}{P_2} \quad (2)$$

+ Ta có: $\xrightarrow{(1)(2)} \frac{n_1}{n_2} = \frac{S_2}{S_1} \Rightarrow n_2 = \frac{S_1}{S_2}.n_1 = \frac{40}{10}.5 = 20$ lần.

Vậy số lần phải bơm thêm là $\Delta n = 20 - 5 = 15$ (lần)

Câu 2: Để bơm đầy một khí cầu đến thể tích 150 m^3 có áp suất $0,2 \text{ atm}$ ở nhiệt độ không đổi người ta dùng các ống khí hêli có thể tích 50 lít ở áp suất 100 atm . Số ống khí hêli cần để bơm khí cầu là bao nhiêu?
(kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)

Đáp án:

6			
---	--	--	--

Gọi n là Số ống khí hêli cần để bơm khí cầu

$$\begin{cases} p_1 V_1 = 0,2 \text{ (atm)} \cdot 150 \text{ (m}^3) \\ p_2 V_2 = 100 \text{ (atm)} \cdot 50 \cdot 10^{-3} \text{ (m}^3) \cdot n \end{cases} \xrightarrow{p_1 V_1 = p_2 V_2} n = 6$$

Ta có:

Câu 3: Cho một bơm tay có diện tích 10cm^2 , chiều dài bơm 20cm dùng để đưa không khí vào quả bóng có thể tích là 5 lít . Phải bơm bao nhiêu lần để áp suất của quả bóng tăng gấp 3 lần áp suất khí quyển. Ban đầu quả bóng mới không có không khí, coi nhiệt độ trong quá trình bơm là không thay đổi.
(kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)

Đáp án:

7	5		
---	---	--	--

Gọi V_0 là thể tích mỗi lần bơm: $V_0 = S \cdot h = 10 \cdot 20 = 200\text{cm}^3 = 0,2\ell$

+ Mà $p = 3p_0$

+ Ta có định luật Boyle cho quá trình biến đổi là:

$$(nV_0) \cdot p_0 = p \cdot V \Rightarrow n = \frac{p \cdot V}{p_0 \cdot V_0} = \frac{3 \cdot 5}{0,2} = 75 \quad (\text{lần})$$

Câu 4: Một quả bóng có dung tích $2,5\ell$. Người ta bơm không khí ở áp suất khí quyển 10^5N/m^2 vào bóng. Mỗi lần bơm được 125cm^3 không khí. Hỏi áp suất của không khí trong quả bóng sau 52 lần bơm là bao nhiêu, theo đơn vị 10^5 Pa ? Coi quả bóng trước khi bơm không có không khí và trong thời gian bơm nhiệt độ của không khí không đổi.

(kết quả lấy 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)

Đáp án:

2	,	6	
---	---	---	--

Xét quá trình biến đổi của lượng không khí được bơm vào quả bóng

$$\begin{cases} V_1 = 125 \cdot 52 = 6500\text{cm}^3 = 6,5\ell \\ p_1 = p_0 = 10^5 \text{ N / m}^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_2 = 2,5\ell \\ p_2 = ? \end{cases}$$

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow p_2 = \frac{p_1 V_1}{V_2} = \frac{10^5 \cdot 6,5}{2,5} = 2,6 \cdot 10^5 \text{ N / m}^2$$

Câu 5: Quả bóng có dung tích $2,5\text{ lít}$ bị xẹp. Dùng ống bơm mỗi lần đẩy được 30cm^3 không khí ở áp suất 1 atm vào quả bóng. Sau 50 lần bơm, áp suất khí trong quả bóng là atm ? Coi nhiệt độ không đổi trong quá trình bơm

(kết quả lấy 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)

Đáp án:

0	,	6	
---	---	---	--

Đổi $2,5\text{ lít} = 2,5\text{ dm}^3 = 2500\text{ cm}^3$

$$\text{Áp dụng định luật Bôi Lơ: } p \cdot V = p_0 \cdot nV_0 \Rightarrow p = \frac{nV_0}{V} p_0 = \frac{50 \cdot 30}{2500} = 0,6\text{atm}$$

Câu 6: Mỗi lần bơm đưa được $V_0 = 80\text{ cm}^3$ không khí vào ruột xe. Sau khi bơm diện tích tiếp xúc của nó với mặt đường là 30cm^2 , thể tích ruột xe sau khi bơm là 2000cm^3 , áp suất khí quyển là 1atm , trọng lượng xe là 600N . Tính số lần phải bơm ?(coi nhiệt độ không đổi trong quá trình bơm)

(kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)

Đáp án:	5	0		
----------------	----------	----------	--	--

Gọi n là số lần bơm để đưa không khí vào ruột xe :

$$\text{Trạng thái 1: } \begin{cases} V_1 = n \cdot 80(\text{cm}^3) \\ p_1 = 1\text{atm} \end{cases}$$

$$\text{Trạng thái 2: } \begin{cases} V_2 = 2000\text{cm}^3 \\ p_2 = \frac{F}{S} = \frac{600}{30 \cdot 10^{-4}} = 2 \cdot 10^5 \text{ Pa} = 2\text{atm} \end{cases}$$

Áp dụng định luật Bôi Lơ : $p_1 V_1 = p_2 V_2 \Leftrightarrow n \cdot 80 \cdot 1 = 2 \cdot 2000 \Rightarrow n = 50$ **III – BÀI TẬP TỰ LUYỆN****1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)**

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

Câu 1: Trong hệ tọa độ (p,V), đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng nhiệt ?

- A. Đường hypebol .
 B. Đường thẳng kéo dài qua gốc tọa độ
 C. Đường thẳng không đi qua gốc tọa độ.
 D. Đường thẳng cắt trục p tại điểm $p = p_0$.

Câu 2. Khí trong quá trình biến đổi đẳng nhiệt, thể tích ban đầu 2dm, áp suất biến đổi từ 1,5atm đến 0,75atm; thì độ biến thiên thể tích của chất khí là ?

- A. Tăng 2 dm³ B. Tăng 4 dm³ C. Giảm 2 dm³ D. Giảm 4 dm³

Giải thích :

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow 1,5 \cdot 2 = 0,75 \cdot V_2 \Rightarrow V_2 = 4\text{dm}^3$$

+

$$\Rightarrow \Delta V = V_2 - V_1 = 4 - 2 = 2\text{dm}^3$$

Câu 3: Đối với một lượng khí lý tưởng xác định, khi nhiệt độ không đổi thì áp suất

- A. tỉ lệ nghịch với thể tích.
 B. tỉ lệ thuận với thể tích.
 C. tỉ lệ thuận với bình phương thể tích.
 D. tỉ lệ nghịch với bình phương thể tích.

Câu 4: Hệ thức nào sau đây **không phải** là của định luật Boyle

- A. $p_1 V_1 = p_3 V_3$. B. $pV = \text{const}$. C. $V \sim p$. D. $p \sim 1/V$.


Câu 5: Nén một lượng khí lý tưởng trong bình kín thì quá trình đẳng nhiệt xảy ra như sau:

- A. Áp suất tăng, nhiệt độ tỉ lệ thuận với áp suất.
 B. Áp suất giảm, nhiệt độ không đổi.
 C. Áp suất giảm, nhiệt độ tỉ lệ nghịch với áp suất.
 D. Áp suất tăng, nhiệt độ không đổi.

Câu 6: Khi nhiệt độ không đổi, khối lượng riêng của chất khí phụ thuộc vào áp suất khí theo hệ thức nào sau đây?

- A. $p_1 D_2 = p_2 D_1$ B. $p_1 D_1 = p_2 D_2$ C. $D \propto \frac{1}{p}$ D. $pD = \text{const}$


Câu 7: Đồ thị nào sau đây biểu diễn **đúng** định luật Boyle



Hình 1



Hình 2



Hình 3

- A. hình 1 B. hình 2 C. hình 3 D. Cả 3 hình trên.


Câu 8: Khi giãn nở khí đẳng nhiệt thì:

- A. Số phân tử khí trong một đơn vị thể tích tăng. B. Áp suất khí tăng lên.
C. Số phân tử khí trong một đơn vị thể tích giảm. D. Khối lượng riêng của khí tăng lên

Câu 9: Trong hệ tọa độ (V,T), đường đẳng nhiệt là:

- A. Đường thẳng có phương qua O. B. Đường thẳng vuông góc trục V.
C. Đường thẳng vuông góc trục OT. D. Đường hypebol.

Câu 10: Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Boyle đối với lượng khí xác định ở hai nhiệt độ khác nhau với $T_2 > T_1$?



hình 1

hình 2

hình 3

hình 4

- A. Hình 1 B. Hình 3
C. Hình 2 D. Hình 4

Câu 11: Một học sinh dùng bơm tay để bơm không khí vào một quả bóng cao su có thể tích là 3 lít, với áp suất không khí là 10^5 N/m^2 . Xung quanh của bơm có chiều cao là 45 cm, đường kính xy lanh là 4 cm. Hỏi học sinh đó phải bơm bao nhiêu lần để không khí trong bóng có áp suất $5 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$, biết trong quá trình bơm nhiệt độ không thay đổi. Trước khi bơm trong quả bóng không có không khí.

- A. 27 lần. B. 30 lần. C. 14 lần. D. 7 lần.

Gọi p_0, V_0 là áp suất và thể tích không khí mỗi lần bơm

$$V_0 = S \cdot h = \frac{\pi d^2}{4} \cdot h = \frac{\pi \cdot 4^2}{4} \cdot 45 = 565,2 \text{ cm}^3$$

Thể tích mỗi lần bơm là

Trước khi bơm trong quả bóng không có không khí

$$(nV_0) \cdot p_0 = p_1 V \Rightarrow n = \frac{p_1 V}{p_0 V_0} = \frac{5 \cdot 10^5 \cdot 3}{10^5 \cdot 565,2 \cdot 10^{-3}} \approx 27$$

Áp dụng định luật Boyle:

Câu 12: Người ta dùng bơm để nén khí vào một bánh xe đạp sau 30 lần bơm diện tích tiếp xúc với mặt đất phẳng là 60 cm^2 . Vậy sau 10 lần bơm nữa thì diện tích tiếp xúc sẽ là bao nhiêu? Cho rằng thể tích sơm xe không đổi, lượng khí mỗi lần bơm là như nhau. Cho rằng nhiệt độ không đổi.

- A. 30 cm^2 B. 45 cm^2 C. 15 cm^2 D. 25 cm^2

V_0 thể tích mỗi lần bơm, p_0 là áp suất khí quyển,

V là thể tích sơm xe, trọng lượng phần xe đạp tác dụng lên bánh xe đang bơm là F ,

Ta có: $F = p_1 \cdot 60 = p_2 \cdot S$

Với p_1 và p_2 là áp suất đầu và sau khi bơm
 S là diện tích tiếp xúc sau khi bơm thêm 10 lần.

$$\frac{p_1}{p_2}$$

$$\text{Vậy } S = 60 \cdot \frac{p_1}{p_2} \text{ A (1)}$$

$$\text{Theo định luật Boyle: } \begin{cases} 30V_0p_0 = Vp_1 \\ 40V_0p_0 = Vp_2 \end{cases} \Rightarrow \frac{30}{40} = \frac{p_1}{p_2} = \frac{3}{4} \text{ (2)}$$

$$\text{Thay (2) vào (1) ta có: } S = \frac{3}{4} \cdot 60 = 45 \text{ cm}^2$$

Câu 13: Một quả bóng có dung tích 2,5ℓ. Người ta bơm không khí ở áp suất khí quyển 10^5 N/m^2 vào bóng. Mỗi lần bơm được 130 cm^3 không khí. Hỏi áp suất của không khí trong quả bóng sau 40 lần bơm? Coi quả bóng trước khi bơm không có không khí và trong thời gian bơm nhiệt độ của không khí không đổi.

- A. $3,5 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ B. $1,8 \text{ Pa}$ C. $2,08 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ D. $0,5 \text{ Pa}$

Áp dụng định luật Boyle

$$p_0 \cdot nV_0 = pV \Leftrightarrow 10^5 \cdot 40 \cdot 130 = p \cdot 2,5 \cdot 10^3 \Rightarrow p = 2,08 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

Câu 14: Người ta dùng bơm có pit-tông diện tích 8 cm^2 và khoảng chạy 25 cm bơm một bánh xe đạp sao cho áp lực của bánh xe đạp lên mặt đường là 350 N thì diện tích tiếp xúc là 50 cm^2 . Ban đầu bánh xe đạp chứa không khí ở áp suất khí quyển $p_0 = 10^5 \text{ Pa}$ và có thể tích là $V_0 = 1500 \text{ cm}^3$. Giả thiết khi áp suất không khí trong bánh xe đạp vượt quá $1,5p_0$ thì thể tích của bánh xe đạp là 2000 cm^3 . Số lần đẩy bơm gần bằng

- A. 17. B. 10. C. 5. D. 15

Áp suất trong bánh xe khi bơm xong: $p = p_0 + p'$

$$\text{Với } p' = F/S = 350/0,005 = 0,7 \cdot 10^5 \text{ Pa;}$$

$$\rightarrow p = 1,7 \cdot 10^5 \text{ Pa lớn hơn } 1,5p_0 \text{ nên thể tích sau khi bơm là } 2000 \text{ cm}^3.$$

Mỗi lần bơm có $8 \cdot 25 = 200 \text{ cm}^3$ không khí ở áp suất p_0 được đưa vào bánh xe.

Sau n lần bơm có $200 \cdot n \text{ cm}^3$ không khí được đưa vào bánh.

Ban đầu có 1500 cm^3 không khí ở áp suất p_0 trong bánh xe.

Như vậy có thể coi:

$$\text{Trạng thái 1: } p_1 = p_0; V_1 = (1500 + 200n)$$

$$\text{Trạng thái 2: } p_2 = 1,7 \cdot 10^5 \text{ Pa; } V_2 = 2000 \text{ cm}^3$$

Áp dụng định luật Boyle, dễ dàng tìm được $n = 19/2 \approx 10$ lần

Câu 15: Một bình đựng khí có dung tích $6 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$ đựng khí áp suất $2,41 \cdot 10^6 \text{ Pa}$. Người ta dùng khí trong bình để thổi các quả bóng bay sao cho bóng có thể tích $3,3 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$ và khí trong bóng có áp suất 10^5 Pa . Nếu coi nhiệt độ của khí không đổi thì số lượng bóng thổi được là

- A. 50 quả bóng. B. 42 quả bóng. C. 52 quả bóng. D. 49 quả bóng.

Áp dụng định luật Boyle

$$p_1V_1 = p_2V_2 = p_2(nV_{02} + V_1) \Rightarrow 2,41 \cdot 10^6 \cdot 6 \cdot 10^{-3} = 10^5 (n \cdot 3,3 \cdot 10^{-3} + 6 \cdot 10^{-3}) \Rightarrow n = 42$$

Vậy số lượng bóng thổi được là 42 quả

Câu 16: Cho một bơm tay có diện tích 20 cm^2 , chiều dài bơm 30cm dùng để đưa không khí vào quả bóng có thể tích là 3 lít. Phải bơm bao nhiêu lần để áp suất của quả bóng tăng gấp 3 lần áp suất khí quyển. Ban đầu quả bóng mới không có không khí, coi nhiệt độ trong quá trình bơm là không thay đổi.

- A. 6 lần. B. 18 lần. C. 15 lần. D. 10 lần.

$$\text{Gọi } V_0 \text{ là thể tích mỗi lần bơm: } V_0 = S \cdot h = 20 \cdot 30 = 600 \text{ cm}^3 = 0,6 \ell$$

$$+ \text{ Mà } p = 3p_0$$

+ Ta có định luật Boyle cho quá trình biến đổi là:

$$(nV_0) \cdot p_0 = p \cdot V \Rightarrow n = \frac{p \cdot V}{p_0 \cdot V_0} = \frac{3 \cdot 3}{0,6} = 15 \text{ (lần)}$$

Câu 17: Một học sinh đi xe đạp bị hết hơi trong sấm xe, học sinh đó mượn bơm để bơm xe. Sau 15 lần bơm thì diện tích tiếp xúc của lốp xe và mặt đất là $S_1 = 30\text{cm}^2$. Hỏi sau bao nhiêu lần bơm nữa thì diện tích tiếp xúc là $S_2 = 10\text{cm}^2$. Biết rằng trọng lực của xe cân bằng với áp lực của không khí trong vỏ xe, thể tích mỗi lần bơm là như nhau và nhiệt độ trong quá trình bơm là không đổi.

- A. 8 lần. B. 10 lần. C. 30 lần. D. 15 lần.

Gọi F là trọng lượng của xe, V_0 là thể tích mỗi lần bơm, V thể tích sấm xe
Ta có trong lần bơm đầu tiên: $n_1 = 10$ lần : $F = p_1 S_1$

$$F = p_2 \cdot S_2 \Rightarrow \frac{p_1}{p_2} = \frac{S_2}{S_1} \quad (1)$$

Trong lần bơm sau n_2 lần:

$$\begin{cases} (n_1 V_0) \cdot p_0 = p_1 V \\ (n_2 V_0) \cdot p_0 = p_2 V \end{cases} \Rightarrow \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2} \quad (2)$$

+ Ta có:

$$\xrightarrow{(1);(2)} \frac{n_1}{n_2} = \frac{S_2}{S_1} \Rightarrow n_2 = \frac{S_1}{S_2} \cdot n_1 = \frac{30}{10} \cdot 15 = 45 \text{ lần.}$$

Vậy số lần phải bơm thêm là $\Delta n = 45 - 15 = 30$ (lần)

Câu 18: Dùng ống bơm bơm một quả bóng đang bị xẹp, mỗi lần bơm đẩy được 40cm^3 không khí ở áp suất 1 atm vào quả bóng. Sau 30 lần bơm quả bóng có dung tích 2 lít, coi quá trình bơm nhiệt độ không đổi, áp suất khí trong quả bóng sau khi bơm là:

- A. 1,25 atm B. 0,6 atm C. 2 atm D. 2,5 atm

Ta có định luật Boyle cho quá trình biến đổi là:

$$(nV_0) \cdot p_0 = p \cdot V \Rightarrow p = \frac{p_0 \cdot n \cdot V_0}{V} = \frac{1 \cdot 30 \cdot 40}{2 \cdot 10^3} = 0,6 \text{ atm}$$

2. Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu 1: Người ta dùng một bơm tay có ống bơm dạng hình trụ dài 50 cm và bán kính trong 4 cm để bơm không khí vào một túi cao su sao cho túi phồng lên, có thể tích là 6,28 lít và áp suất không khí trong túi là 4 atm. Biết áp suất khí quyển là 1 atm và coi nhiệt độ của không khí được bơm vào túi không đổi.



a. Áp suất không khí mỗi lần bơm là 2,5 atm $\Rightarrow$ S

$$\begin{cases} p_1 = p_0 = 1 \text{ atm} \\ V_1 = n.V_0 = n.S.h = n.\pi r^2.h \end{cases}$$

Trạng thái 1:

$$\begin{cases} p_2 = 4 \text{ atm} \\ V_2 = 6,28.10^3 \text{ (cm}^3\text{)} \end{cases}$$

Trạng thái 2:

b. Gọi n là số lần đẩy bơm, V_0 là thể tích lượng khí mỗi lần bơm. Thể tích lượng khí được đưa vào trong túi cao su là $V_1 = n.V_0 \Rightarrow$ Đ

c. Định luật Boyle được áp dụng cho quá trình biến đổi trạng thái này $\Rightarrow$ Đ

d. Số lần đẩy bơm là 15 lần. $\Rightarrow$ S

Câu 2: Một quả bóng có dung tích 2,5 lít. Người ta bơm 45 lần không khí ở áp suất 10^5 Pa vào bóng. Mỗi lần bơm được 125 cm³ không khí. Coi quả bóng trước khi bơm không có không khí và trong khi bơm nhiệt độ không khí không thay đổi.



a. Định luật Boyle được áp dụng cho quá trình biến đổi trạng thái này. $\Rightarrow$ Đ

b. Sau 45 lần bơm thể tích không khí người ta đã đưa vào quả bóng là 5565 cm^3 . $\Rightarrow$ S
 Sau 45 lần bơm thể tích không khí người ta đã đưa vào quả bóng là

$$V_1 = 45 \cdot 125 = 5625 \text{ cm}^3$$

$$p_1 = 10^5 \text{ Pa}$$

c. Sau khi bơm cả thể tích và áp suất không khí trong quả bóng đều thay đổi. $\Rightarrow$ D

d. Sau 45 lần bơm, áp suất cuối cùng của khối khí là $2,6 \cdot 10^5 \text{ Pa} \Rightarrow$ S

Sau 45 lần bơm, áp suất cuối cùng của khối khí là p_2 , thể tích $V_2 = 2,5 \text{ lít} = 2500 \text{ cm}^3$

Do nhiệt độ không đổi, ta áp dụng định luật Boyle

$$p_2 = \frac{p_1 V_1}{V_2} = \frac{10^5 \cdot 5625}{2500} = 2,25 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

Câu 3: Một bơm tay có chiều cao $h = 50 \text{ cm}$, đường kính $d = 5 \text{ cm}$. Người ta dùng bơm này để đưa không khí vào trong sơm xe đạp (chưa có không khí). Biết thời gian mỗi lần bơm là $1,5 \text{ s}$ và áp suất khí quyển bằng 10^5 Pa , trong khi bơm xem nhiệt độ của khí không đổi. Khi đưa vào sơm 7 lít khí thì áp suất trong sơm là $5 \cdot 10^5 \text{ Pa}$



a. Thể tích không khí mỗi lần bơm vào sơm xe đạp là $0,25 \text{ lít} \Rightarrow$ S

$$V_0 = S \cdot h = \frac{\pi d^2}{4} \cdot h = \frac{3,14 \cdot 0,05^2}{4} \cdot 0,5 = 982 \text{ cm}^3 = 0,982 \text{ lít}$$

Thể tích mỗi lần bơm:

b. Định luật Boyle được áp dụng cho quá trình biến đổi trạng thái này vì nhiệt độ không khí không thay đổi trong quá trình bơm. $\Rightarrow$ D

c. Thể tích không khí bơm vào sơm xe là $30 \text{ lít} \Rightarrow$ S

xét lượng khí cần bơm vào sơm

$$\text{Trạng thái 1: } \begin{cases} p_1 = 10^5 \text{ Pa} \\ V_1 = n \cdot V_0 \end{cases}$$

$$\text{Trạng thái 2: } \begin{cases} p_2 = 5 \cdot 10^5 \text{ Pa} \\ V_2 = 7 \text{ lít} \end{cases}$$

$$\text{Thể tích khí cần bơm vào xe là } p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow V_1 = \frac{p_2 V_2}{p_1} = \frac{5 \cdot 10^5 \cdot 7}{10^5} = 35 \text{ (lít)}$$

d. Thời gian để bơm xe là $60 \text{ s} \Rightarrow$ S

$$t = n \cdot \Delta t = \frac{V_1}{V_0} \cdot \Delta t = \frac{35}{0,982} \cdot 1,5 = 53 \text{ s}$$

Thời gian bơm sẽ là

Câu 4: Người ta dùng một bơm tay có ống bơm dài 50 cm và đường kính trong 4 cm để bơm không khí vào một túi cao su sao cho túi phồng lên. Sau 40 lần bơm thì không khí trong túi có thể tích là 6,28 lít. Biết áp suất khí quyển là 1 atm và coi nhiệt độ của không khí được bơm vào túi không đổi. Lấy $\pi = 3,14$



a. Mỗi lần bơm ta đưa vào quả bóng 0,5 lít khí $\Rightarrow$ S

Thể tích mỗi lần bơm: $V_0 = S \cdot h = \frac{\pi d^2}{4} \cdot h = \frac{3,14 \cdot 0,04^2}{4} \cdot 0,5 = 6,28 \cdot 10^{-4} m^3 = 0,628 \text{ lít}$

b. Sau 40 lần bơm ta đưa vào quả bóng 15 lít khí. $\Rightarrow$ S

Thể tích sau 40 lần bơm: $V_1 = nV_0 = 40 \cdot 0,628 = 25,12 \text{ lít}$

c. Sau 40 lần bơm lượng khí đưa vào quả bóng được nén còn 6,28 lít. $\Rightarrow$ D

Trạng thái 2: Khí được nén ở trong quả bóng: $\begin{cases} p_2 = ? (atm) \\ V_2 = 6,28 (l) \end{cases}$
vậy sau 40 lần bơm lượng khí đưa vào quả bóng được nén còn 6,28 lít.

d. Áp suất khí trong quả bóng sau 40 lần bơm là 4,5 atm $\Rightarrow$ S

Áp dụng định luật Boyle: $p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow p_2 = \frac{p_1 V_1}{V_2} = \frac{1 \cdot 25,12}{6,28} = 4 (atm)$

Do nhiệt độ không đổi nên ta áp dụng định luật Boyle:

$$p_0 \cdot n \cdot \pi r^2 l = p_2 V_2 \Rightarrow n = \frac{p_2 V_2}{p_0 \pi \cdot r^2 h} = \frac{4 (atm) \cdot 6,28 \cdot 10^3 (cm^3)}{1 (atm) \cdot \pi \cdot 4^2 \cdot 50 (cm^3)} \approx 10$$

3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm

Câu 1: Một quả bóng cao su có dung tích 2 lít chứa không khí ở áp suất 10^5 Pa . Người ta bơm không khí ở áp suất 10^5 Pa vào bóng. Mỗi lần bơm được 120 cm^3 không khí. Hỏi áp suất của không khí trong quả bóng sau 40 lần bơm, theo đơn vị 10^5 Pa? Biết trong thời gian bơm, nhiệt độ của không khí không đổi. (kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)

Đáp án:

2	,	4	
---	---	---	--

Đổi $V = 2\text{ lít} = 2000\text{ cm}^3$

Ta có định luật Boyle cho quá trình biến đổi là:

$$(nV_0).p_0 = p.V \Rightarrow p = \frac{p_0.n.V_0}{V} = \frac{10^5.40.120}{2000} = 2,4.10^5\text{ Pa}$$

Câu 2: Dùng ống bơm bơm một quả bóng đang bị xẹp, mỗi lần bơm đẩy được 50 cm^3 không khí ở áp suất 1 atm vào quả bóng. Sau 60 lần bơm quả bóng có dung tích 2 lít, coi quá trình bơm nhiệt độ không đổi, áp suất khí trong quả bóng sau khi bơm là bao nhiêu atm?

(kết quả lấy 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)

Đáp án:

1	,	5	
---	---	---	--

Đổi đơn vị: $2\text{ l} = 2.10^{-3}\text{ m}^3 = 2.10^{-3}(10^6\text{ cm}^3) = 2.10^3\text{ cm}^3$

Trạng thái 1:

Sau 60 lần bơm đã đưa vào quả bóng một lượng khí ở bên ngoài có:

$$p_1 = 1(\text{atm}), V_1 = 60.50(\text{cm}^3) = 3.10^3\text{ m}^3$$

Trạng thái 2:

Khi khí đã vào trong quả bóng lượng khí này có áp suất và thể tích lần lượt là:

$$p_2 = ?; V_2 = 2.10^3\text{ cm}^3$$

$$p_2 = \frac{p_1 V_1}{V_2} = \frac{1(\text{atm})50.60(\text{cm}^3)}{2.10^3(\text{cm}^3)} = 1,5(\text{atm})$$

Do nhiệt độ không đổi, áp dụng định luật Boyle

Câu 3: Người ta dùng bơm để nén khí vào một bánh xe đạp sau 30 lần bơm diện tích tiếp xúc với mặt đất phẳng là 60 cm^2 . Vậy sau 20 lần bơm nữa thì diện tích tiếp xúc sẽ là bao nhiêu cm^2 ? Cho rằng thể tích săm xe không đổi, lượng khí mỗi lần bơm là như nhau. Cho rằng nhiệt độ không đổi.

(kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)

Đáp án:

3	6		
---	---	--	--

V_0 thể tích mỗi lần bơm, p_0 là áp suất khí quyển,

V là thể tích săm xe ,trọng lượng phần xe đạp tác dụng lên bánh xe đang bơm là F ,

Ta có: $F = p_1.60 = p_2.S$

Với p_1 và p_2 là áp suất đầu và sau khi bơm

S là diện tích tiếp xúc sau khi bơm thêm 20 lần.

$$\frac{p_1}{p_2}$$

$$\text{Vậy } S = 60. \frac{p_1}{p_2} \text{ A (1)}$$

$$\text{Theo định luật Boyle: } \begin{cases} 30V_0p_0 = Vp_1 \\ 50V_0p_0 = Vp_2 \end{cases} \Rightarrow \frac{30}{50} = \frac{p_1}{p_2} = \frac{3}{5} \text{ (2)}$$

$$S = \frac{3}{5} \cdot 60 = 36 \text{ cm}^2$$

Thay (2) vào (1) ta có:

Câu 4: Người ta dùng một bơm tay có ống bơm dạng hình trụ dài 50 cm và bán kính trong 4 cm để bơm không khí vào một túi cao su sao cho túi phồng lên, có thể tích là 6,28 lít và áp suất không khí trong túi là 4 atm. Biết áp suất khí quyển là 1 atm và coi nhiệt độ của không khí được bơm vào túi không đổi. Số lần đẩy bơm là bao nhiêu?

Đáp án:

1	0		
---	---	--	--

$$\begin{cases} p_1 = p_0 = 1 \text{ atm} \\ V_1 = n \cdot S \cdot l = n \cdot \pi r^2 \cdot l \end{cases}$$

*Trạng thái 1:

$$\begin{cases} p_2 = 4 \text{ atm} \\ V_2 = 6,28 \cdot 10^3 \text{ (cm}^3\text{)} \end{cases}$$

*Trạng thái 2:

*Do nhiệt độ không đổi nên ta áp dụng định luật Boyle

$$p_0 \cdot n \cdot \pi r^2 l = p_2 V_2 \Rightarrow n = \frac{p_2 V_2}{p_0 \pi \cdot r^2 l} = \frac{4(\text{atm}) \cdot 6,28 \cdot 10^3 (\text{cm}^3)}{1(\text{atm}) \cdot \pi \cdot 4^2 \cdot 50 (\text{cm}^3)} \approx 10$$

Câu 5: Người ta dùng bơm có pit-tông diện tích 8 cm² và khoảng chạy 25 cm bơm một quả bóng. Ban đầu quả bóng chứa không khí ở áp suất khí quyển $p_0 = 10^5$ Pa và có thể tích là $V_0 = 1500$ cm³. Sau 10 lần bơm thì thể tích của quả bóng là 2000 cm³. Coi quá trình bơm nhiệt độ không đổi, áp suất khí trong quả bóng sau khi bơm là bao nhiêu 10³ Pa?

(kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)

Đáp án:

1	7	5	
---	---	---	--

Trạng thái 1:

Sau $n = 10$ lần bơm đã đưa vào quả bóng một lượng khí ở bên ngoài có:

$$p_1 = p_0 = 10^5 \text{ Pa} \quad V_1 = V_0 + n \cdot S \cdot h = 1500 + 10 \cdot 8 \cdot 25 = 3500 (\text{cm}^3)$$

;

Trạng thái 2:

Khi khí đã vào trong quả bóng lượng khí này có áp suất và thể tích lần lượt là:

$$p_2 = ? \quad V_2 = 2 \cdot 10^3 \text{ cm}^3$$

;

Do nhiệt độ không đổi, áp dụng định luật Boyle:

$$p_2 = \frac{p_1 V_1}{V_2} = \frac{10^5 (\text{Pa}) \cdot 3500 (\text{cm}^3)}{2 \cdot 10^3 (\text{cm}^3)} = 175 \cdot 10^3 (\text{Pa})$$

Câu 6: Cho một bơm tay có diện tích đáy 10 cm², chiều dài bơm 30 cm dùng để đưa không khí vào quả bóng có thể tích là 3 lít. Phải bơm bao nhiêu lần để áp suất của quả bóng tăng gấp 4 lần áp suất khí quyển? Ban đầu quả bóng mới không có không khí, coi nhiệt độ trong quá trình bơm là không thay đổi.

(kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)

Đáp án:

4	0		
---	---	--	--

Gọi V_0 là thể tích mỗi lần bơm: $V_0 = S \cdot h = 10 \cdot 30 = 300 \text{ cm}^3 = 0,3 \ell$

$$+ \text{ Mà } p = 3p_0$$

+ Ta có định luật Boyle cho quá trình biến đổi là:

$$(nV_0).p_0 = p.V \Rightarrow n = \frac{p.V}{p_0.V_0} = \frac{4.3}{0,3} = 40 \quad (\text{lần})$$

Dạng 3 – QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT TRONG ỐNG THỦY TINH

I – TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Áp suất tính theo độ cao cột thủy ngân

- Từ công thức gốc $p = p_0 \pm \rho gh$ người ta đi thiết lập một thang đo mới của áp suất. Đó là áp suất tính theo mmHg:
- $$p = p_0 \pm h \text{ (mmHg)}$$

Chú ý:

Như vậy nếu $h(\text{mmHg})$ thì p và p_0 cũng được tính theo mmHg.

- Milimet thủy ngân (Torr) là chiều cao của một cột thủy ngân trong ống thủy tinh có đường kính rất nhỏ. Độ dài của cột thủy ngân này được đo bằng đơn vị mét.

$$\rho = 13589 \left(\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right), \quad g = 9,81 \left(\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right)$$

Thủy ngân có khối lượng riêng

$$1 \text{ mmHg} = 13589 \cdot 9,81 \cdot 10^{-3} = 133,3 \text{ Pa}$$

- Áp suất khí quyển biến đổi xung quanh giá trị 760 mmHg.

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 760 \cdot 133,3 = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

Người ta gọi giá trị này là 1 atmôtphe(atm):

2. Áp suất tính theo độ cao cột nước


Xét một lượng nước và một lượng thủy ngân có cùng khối lượng. Ta có

$$m_{H_2O} = m_{Hg} \Rightarrow \rho_{H_2O} V_{H_2O} = \rho_{Hg} V_{Hg} \Leftrightarrow \rho_{H_2O} S \cdot h_{H_2O} = \rho_{Hg} S \cdot h_{Hg}$$

$$\Rightarrow h_{Hg} = \frac{\rho_{H_2O}}{\rho_{Hg}} \cdot h_{H_2O} = \frac{h_{H_2O} (\text{mmH}_2\text{O})}{13,6} \Rightarrow p = p_0 + \frac{h_{H_2O} (\text{mmH}_2\text{O})}{13,6} (\text{mmHg})$$

3. Những trường hợp thường gặp

Xét ống thủy tinh, trong có chứa thủy ngân có độ cao h . Áp suất khí quyển là p_0 .




+ Bịt kín hai đầu: $p_2 = p_1 + h$

+ Đầu để hở phía trên: $p = p_0 + h$

+ Đầu để hở phía dưới: $p = p_0 - h$

4. Ngoại lực tác dụng lên thể tích bình chứa

Lúc đầu áp suất của khí bên trong bình đựng khí là p_0 . Nếu có ngoại lực F tác dụng vào bình với diện tích tiếp xúc là S làm thể tích của bình bị thay đổi thì áp suất lúc sau là p .



$$p = p_0 \pm \frac{F}{S} \Rightarrow \begin{cases} p = p_0 + \frac{F}{S} \\ p = p_0 - \frac{F}{S} \end{cases}$$

Ta có:

Khí nén: $p = p_0 + \frac{F}{S}$


Khí dẫn: $p = p_0 - \frac{F}{S}$

1. Câu trắc nhiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)


Câu	Đáp án	Câu	Đáp án
1	B	10	C
2	B	11	A
3	B	12	A
4	C	13	B
5	C	14	B
6	A	15	A
7	D	16	B
8	B	17	C
9	A	18	A

Câu 1: Đồ thị nào sau đây **không phải** biểu diễn quá trình đẳng nhiệt:



- A. hình 1 B. hình 3 C. hình 2 D. hình 4

Câu 2: : Đồ thị nào sau đây biểu diễn **đúng** định luật Bôilơ – Mariôt:




Câu 3: Đẩy pit-tông của một xilanh đủ chậm để nén lượng khí chứa trong xilanh sao cho thể tích của lượng khí này giảm đi 2 lần ở nhiệt độ không đổi. Khi đó áp suất của khí trong xi lanh

- A. giảm đi 2 lần. B. tăng lên 2 lần.
C. tăng thêm 4 lần. D. không thay đổi.

Câu 4. Một lượng không khí có thể tích 240 cm^3 chứa trong một xilanh có pit-

tông đóng kín, diện tích của pit-tông là 24 cm^2 (xem hình vẽ bên). Áp suất của không khí trong xilanh bằng áp suất ngoài là 100 kPa . Cần một lực bằng bao nhiêu để dịch chuyển pit-tông 2 cm theo chiều làm thể tích khí giảm? Bỏ qua ma sát giữa pit-tông và thành xilanh. Coi trong quá trình chuyển động nhiệt độ không thay đổi.



A. 20 N .

B. 80 N .

C. 60 N .

D. 40 N

Hướng dẫn

$$\Delta V = Sh = 24 \cdot 2 = 48 (\text{cm}^3)$$

* Lượng thể tích khí giảm:

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \xrightarrow{V_2 = V_1 - \Delta V} p_2 = p_1 \frac{V_1}{V_1 - \Delta V} = 10^5 \cdot \frac{240}{240 - 48} = 1,25 \cdot 10^5 (\text{Pa})$$

* Từ:

$$p_t S = p_n S + F$$


+ Điều kiện pitông cân bằng:

$$\Rightarrow F = (p_t - p_n) S = (1,25 \cdot 10^5 - 10^5) 24 \cdot 10^{-4} = 60 (\text{N})$$

$\Rightarrow$

Chọn C.

Câu 5: Cho 1 ống nghiệm 1 đầu kín được đặt nằm ngang; tiết diện đều, bên trong có cột không khí cao $l = 20 \text{ cm}$ ngăn cách với bên ngoài bằng giọt thủy ngân dài $d = 4 \text{ cm}$. Cho áp suất khí quyển là $p_0 = 76 \text{ cmHg}$. Chiều dài cột khí trong ống là bao nhiêu khi ống được dựng thẳng ống nghiệm ở trên?



A. 21 cm

B. 20 cm

C. 19 cm


D. 18 cm

+ Khi ống nằm ngang: $p = p_0$; $V = \ell S$


+ Khi ống thẳng đứng miệng ở trên: $p_1 = p_0 + d$; $V_1 = \ell_1 S$

+ Áp dụng định luật Boyle

$$p_0 \ell S = (p_0 + d) \ell_1 S \Rightarrow \ell_1 = \frac{p_0}{p_0 + d} \cdot \ell = \frac{76}{80} \cdot 20 = 19 \text{ cm}$$



Câu 6: Một ống thủy tinh hình trụ, một đầu kín một đầu hở, dài 40cm chứa không khí với áp suất khí quyển 10^5 N/m^2 . Ấn ống xuống chậu nước theo phương thẳng đứng, miệng ống ở dưới sao cho đầu kín ngang với mặt nước. Tính chiều cao cột nước trong ống? biết trọng lượng riêng của nước là: $d = 10^4 \text{ N/m}^3$




- A. 1,5 cm. B. 2 cm.
C. 1,8 cm. D. 4 cm.

+ Ta có:
$$\begin{cases} p = p_0 + (h - x)d \\ V = (h - x)S \end{cases}; \text{ Mà } p_0 V_0 = p.V$$

$$\Rightarrow 10^5 \cdot 0,4S = [10^5 + (0,4 - x) \cdot 10^4] \cdot (0,4 - x)S$$

$$\Rightarrow x^2 - 10,8x + 0,16 = 0 \Rightarrow x \approx 1,5 (\text{cm})$$

Câu 7: Phía trên cột thủy ngân của áp kế có lọt một khối lượng nhỏ không khí, nên áp kế đó chỉ áp suất nhỏ hơn áp suất khí quyển. Khi áp suất khí quyển là 768mmHg thì áp kế chỉ 748 mmHg, chiều dài khoảng chân không khí đó là 80 mm. Coi nhiệt độ trong hai lần đo là như nhau. Nếu áp kế chỉ 734 mmHg thì áp suất khí quyển thực bằng bao nhiêu mmHg?



- A. 760 mmHg B. 755 mmHg
C. 745 mmHg D. 751 mmHg


Gọi l là chiều dài của ống
 x là chiều dài của ống chứa không khí.
 h là chiều cao cột thủy ngân

$$\begin{cases} TT_1 \begin{cases} p_1 = p_{01} - h_1 \\ V_1 = S \cdot x_1 \end{cases} \\ TT_2 \begin{cases} p_2 = p_{02} - h_2 \\ V_2 = Sx_2 = S(l - h_2) \end{cases} \end{cases} \Rightarrow \underbrace{(p_{01} - h_1)S \cdot x_1}_{p_1 V_1} = \underbrace{(p_{02} - h_2)S(l - h_2)}_{p_2 V_2}$$


(chiều dài ống: $l = x_1 + h_1 = 80 + 748 = 828 \text{ mm}$)

$$\Rightarrow (768 - 748) \cdot 80 = (p_{02} - 734)(828 - 734) \Rightarrow p_{02} = 751 \text{ mmHg}$$

Chú ý: Số chỉ của áp kế chính bằng độ cao của cột thủy ngân.



Câu 8: Một ống nghiệm hình trụ có chứa chất lỏng có độ cao h và khối lượng riêng là ρ , phần miệng ống ở trên, bên dưới chất lỏng có chứa một lượng khí. Biết áp suất khí quyển là p_0 . Xác lập biểu thức tính áp suất của lượng khí bên trong ống ?



A. $p = p_0 - \rho gh$

B. $p = p_0 + \rho gh$

C. $p = p_0 - 2\rho gh$

D. $p = p_0 + 2\rho gh$

Gọi S là diện tích đáy của ống hình trụ.

Lượng khí bị nén bởi trọng lượng của chất lỏng. Do đó ta áp dụng công thức:

$$p = p_0 + \frac{F}{S} \xrightarrow{F=P} p = p_0 + \frac{P}{S} = p_0 + \frac{mg}{S} = p_0 + \frac{\rho Vg}{S} \xrightarrow{V=Sh} p = p_0 + \rho gh$$


Câu 9: Một xilanh đang chứa một khối khí, khi đó pit-tông cách đáy xilanh một khoảng 15cm. Hỏi phải đẩy pit-tông theo chiều nào, một đoạn bằng bao nhiêu để áp suất khí trong xilanh tăng gấp 3 lần? Coi nhiệt độ của khí không đổi.

A. Pit tông dịch sang trái một đoạn là 5 cm.

B. Pit tông dịch sang trái một đoạn là 10 cm.


C. Pit tông dịch sang phải một đoạn là 10 cm.

D. Pit tông dịch sang phải một đoạn là 6 cm.




Do áp suất tăng nên suy ra thể tích phải giảm. Do đó pit-tông phải dịch sang trái

	Trạng thái 1	Trạng thái 2
Áp suất	p_1	$p_2 = 3p_1$
Thể tích	$V_1 = Sl$	$V_2 = S(l - \Delta l)$



*Áp dụng ĐL Bôi-lo: $p_1 V_1 = p_2 V \Rightarrow p_1 Sl = 3p_1 \cdot S(l - \Delta l) \Rightarrow l = 3(l - \Delta l) \xrightarrow{l=15cm} \Delta l = 10cm$

Câu 10: Ống thủy tinh đặt thẳng đứng đầu hở ở trên, đầu kín ở dưới. Một cột không khí cao 20cm bị giam trong ống bởi một cột thủy ngân cao 40cm. Biết áp suất khí quyển là 80 cmHg, lật ngược ống lại để đầu kín ở trên, đầu hở ở dưới, coi nhiệt độ không đổi, nếu muốn lượng thủy ngân ban đầu không chảy ra ngoài thì chiều dài tối thiểu của ống phải là bao nhiêu ?




A. 75cm
50cm

B. 100cm
42cm

C.

Trước khi lật ngược, trạng thái khí là: $p_1 = p_0 + h$, $V_1 = l_1 S$


Khi lật ngược, trạng thái khí là: $p_2 = p_0 - h$, $V_2 = l_2 S$



$$\Rightarrow p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2 \Leftrightarrow (p_0 + h) \cdot l_1 = (p_0 - h) \cdot l_2 \Leftrightarrow l_2 = 60 \text{ cm.}$$

$\Rightarrow$ Ống phải dài tối thiểu là: $40 + 60 = 100 \text{ cm.}$

Câu 11: Một lượng không khí có thể tích 240 cm^3 bị giam trong một xilanh có pít – tông đóng kín như hình vẽ trên, diện tích của pít – tông là 24 cm^2 , áp suất khí trong xilanh bằng áp suất ngoài là 100 kPa . Cần một lực bằng bao nhiêu để dịch chuyển pít – tông sang trái 2 cm ? Bỏ qua mọi ma sát, coi quá trình trên đẳng nhiệt.



A. 50N

B. 25N

C. 60N


D. 30N

Xét trạng thái biến đổi của chất khí :

	Trạng thái 1	Trạng thái 2
Áp suất	$p_1 = 100 \text{ kPa} = 10^5 \text{ Pa}$	$p_2 = p_1 + \frac{F}{S} = 100 \cdot 10^3 + \frac{F}{24 \cdot 10^{-4}} \text{ (Pa)}$ (do pít tông dịch chuyển sang trái)
Thể tích	$V_1 = S l = 240 \text{ cm}^3 \Rightarrow l = 10 \text{ cm}$	$V_2 = S (l - \Delta l) = 24 \cdot (10 - 2) = 192 \text{ cm}^3$

Áp dụng ĐL Bôi-lơ:

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow 10^5 \cdot 240 = \left(10^5 + \frac{F}{24 \cdot 10^{-4}}\right) \cdot 192 \Rightarrow F = 60 \text{ (N)}$$



Câu 12: Ở chính giữa một ống thủy tinh nằm ngang, tiết diện nhỏ, chiều dài $L = 100 \text{ cm}$, hai đầu bịt kín có một cột thủy ngân dài $h = 20 \text{ cm}$. Trong ống có không khí. Khi đặt ống thẳng đứng cột thủy ngân dịch chuyển xuống dưới một đoạn $l = 10 \text{ cm}$. Tìm áp suất của không khí trong ống khi ống nằm ngang ra cmHg và Pa . Coi nhiệt độ không khí trong ống không đổi và khối lượng riêng thủy ngân là $\rho = 1,36 \cdot 10^4 \text{ kg/m}^3$.

A. $5 \cdot 10^4 \text{ Pa}$

B. $9 \cdot 10^4 \text{ Pa}$

C. $2,5 \cdot 10^4 \text{ Pa}$

D. $2 \cdot 10^4 \text{ Pa}$

$$\begin{cases} p_1 \\ V_1 = \frac{L-h}{2} \cdot S \end{cases}$$

Trạng thái 1 của mỗi lượng khí ở hai bên cột thủy ngân (ống nằm ngang):

Trạng thái 2 (ống thẳng đứng)

$$+ \text{Đối với lượng khí ở trên cột thủy ngân: } \begin{cases} p_2 \\ V_2 = \left(\frac{L-h}{2} + l\right) \cdot S \end{cases}$$

$$+ \text{Đối với lượng khí ở dưới cột thủy ngân: } \begin{cases} p'_2 \\ V'_2 = \left(\frac{L-h}{2} + l\right) \cdot S \end{cases}$$

Áp suất khí ở phần dưới bằng áp suất khí ở phần trên cộng với áp suất do cột thủy ngân gây ra. Do đó đối

$$\begin{cases} p'_2 = p_2 + h \\ V'_2 = \left(\frac{L-h}{2} + l\right) \cdot S \end{cases}$$

với khí ở phần dưới, ta có:

Áp dụng định luật Boyle cho từng lượng khí. Ta có:

$$p_1(L-h) \frac{S}{2} = p_2(L-h+2l) \frac{S}{2} \Rightarrow p_1(L-h) = p_2(L-h+2l) \quad (1)$$

+ Đối với khí ở trên:

$$p_1(L-h) \frac{S}{2} = (p_2 + h)(L-h+2l) \frac{S}{2} \Rightarrow p_1(L-h) = (p_2 + h)(L-h+2l) \quad (2)$$

+ Đối với khí ở dưới:

$$p_2 = \frac{h(L-h-2l)}{4l}$$

Từ hai phương trình (1) và (2) rút ra:

Thay giá trị của p_2 vào (1) ta được:

$$p_1 = 37,5(\text{cmHg})$$

$$p_1 = \rho g H = 1,36 \cdot 10^4 \cdot 9,8 \cdot 0,375 = 5 \cdot 10^4 \text{ Pa.}$$

Câu 13: Một ống thủy tinh tiết diện đều gồm một đầu kín, một đầu hở, trong ống có cột không khí ngăn cách với bên ngoài bằng cột thủy ngân dài 20cm. Khi ống thẳng đứng miệng ở dưới thì chiều dài cột không khí là 48cm, miệng ở trên thì dài cột không khí là 28cm. Tính áp suất khí quyển và chiều dài cột không khí khi ống nằm ngang.

A. 25,5 cm.

B. 19,5 cm.

C. 15,75 cm.


D. 35,37 cm.

Ta có


$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow (p_0 - 20) \cdot 48 = (p_0 + 20) \cdot 28 \Rightarrow p_0 = 76 \text{ cmHg}$$

Mặt khác

$$p_0 V_0 = p_1 V_1 \Rightarrow 16 \cdot l = 56 \cdot 48 \Rightarrow l = 35,37 \text{ cm}$$



Câu 14: Một ống thủy tinh tiết diện đều có chiều dài 60cm gồm một đầu kín, một đầu hở hướng lên, trong ống có cột không khí ngăn cách với bên ngoài bằng cột thủy ngân dài 40cm, cột thủy ngân bằng miệng ống. Khi ống thẳng đứng miệng ở dưới thì một phần thủy ngân chảy ra ngoài. Tìm cột thủy ngân còn lại trong ống. Biết áp suất khí quyển là 80cmHg.



A. 25 cm.


B.

30 cm.

C. 20 cm.

D. 15,25 cm.

Gọi S là diện tích ống thủy tinh. Chiều dài cột không khí có trong ống là



$$l_1 = 60 - 40 = 20 \text{ cm}$$

$$p_1 = p_0 + 40 = 120 \text{ cmHg}$$

Áp suất không khí trong ống :

Khi lật ngược miệng ống phía dưới thì cột thủy ngân còn lại trong ống là x nên

$$p_2 = p_0 - x = 80 - x (\text{cmHg})$$

Chiều dài cột không khí $l_2 = 60 - x$


$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \Leftrightarrow p_1 l_1 S = p_2 l_2 S \Leftrightarrow 120 \cdot 20 = (80 - x) \cdot (60 - x)$$

Ta có

Mà $x < 40 \text{ cm}$ nên $x = 20 \text{ cm}$

Vậy độ cao cột thủy ngân còn lại trong ống là 20 cm

Câu 15: Trong một ống nhỏ dài, một đầu kín, một đầu hở, tiết diện đều, ban đầu đặt ống thẳng đứng miệng ống hướng lên, trong ống về phía đáy có cột không khí dài 40 cm và được ngăn cách với bên ngoài bằng cột thủy ngân dài $h = 14 \text{ cm}$. Áp suất khí quyển 76 cmHg và nhiệt độ không đổi. Tính chiều cao của cột không khí trong ống của trường hợp ống thẳng đứng miệng ở dưới?



A. 25,15 cm

B. 15,45 cm

C. 58,065

D. 70,25 cm

Ống thẳng đứng miệng ở dưới


Ta có $p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$, với

$$\begin{cases} p_1 = p_0 + h = 76 + 14 = 90 \text{ cmHg} \\ V_1 = l_1 \cdot S = 40 \cdot S \end{cases}$$


$$\begin{cases} p_2 = p_0 - h = 76 - 14 = 62 \text{ cmHg} \\ V_2 = l_2 \cdot S \end{cases}$$

$$\Rightarrow 90 \cdot 40 \cdot S = 62 \cdot l_2 \cdot S$$

$$\Rightarrow l_2 = 58,065 \text{ cm}$$



Câu 16: Trong một ống nhỏ dài, một đầu kín, một đầu hở, tiết diện đều, ban đầu đặt ống thẳng đứng miệng ống hướng lên, trong ống về phía đáy có cột không khí dài 40 cm và được ngăn cách với bên ngoài bằng cột thủy ngân dài $h = 14 \text{ cm}$. Áp suất khí quyển 76 cmHg và nhiệt độ không đổi. Tính chiều cao của cột không khí trong ống của trường hợp ống đặt nghiêng góc 30° so với phương ngang, miệng ở trên?



A. 30,25 cm

B. 45,15 cm

C. 25,2 cm

D. 43,373 cm


Ống đặt nghiêng góc 30° so với phương ngang, miệng ở trên.

Cột thủy ngân có độ dài là h nhưng khi đặt nghiêng ra thì độ cao của cột thủy ngân là


$$h' = h \cdot \sin 30^\circ = \frac{h}{2}$$

Ta có $p_1 \cdot V_1 = p_3 \cdot V_3$,

$$\begin{cases} p_3 = p_0 + h' = 76 + 7 = 83 \text{ cmHg} \\ V_3 = l_3 \cdot S \end{cases} \Rightarrow 90 \cdot 40 \cdot S = 83 \cdot l_3 \cdot S \Rightarrow l_3 = 43,373 \text{ cm}$$



Câu 17: Trong một ống nhỏ dài, một đầu kín, một đầu hở, tiết diện đều, ban đầu đặt ống thẳng đứng miệng ống hướng lên, trong ống về phía đáy có cột không khí dài 40cm và được ngăn cách với bên ngoài bằng cột thủy ngân dài $h = 14\text{cm}$. Áp suất khí quyển 76cmHg và nhiệt độ không đổi. Tính chiều cao của cột không khí trong ống của trường hợp ống đặt nghiêng góc 30° so với phương ngang, miệng ở dưới ?



A. 45,25 cm

B. 42 cm

C. 50,25 cm

D. 52,174 cm

Giải thích :

Ống đặt nghiêng góc 30° so với phương ngang, miệng ở dưới.

Cột thủy ngân có độ dài là h nhưng khi đặt nghiêng ra thì độ cao của cột thủy ngân là

$$h' = h \cdot \sin 30^\circ = \frac{h}{2}$$

Ta có $p_1 \cdot V_1 = p_4 \cdot V_4$,

$$\begin{cases} p_4 = p_0 - h' = 76 - 7 = 69 \text{ cmHg} \\ V_4 = l_4 \cdot S \end{cases} \Rightarrow 90 \cdot 40 \cdot S = 69 \cdot l_4 \cdot S \Rightarrow l_4 = 52,174 \text{ cm}$$

Câu 18: Cho 1 ống nghiệm 1 đầu kín được đặt nằm ngang; tiết diện đều, bên trong cột không khí cao $l = 20\text{cm}$ ngăn cách với bên ngoài bằng giọt thủy ngân dài $d = 4\text{cm}$. Cho áp suất khí quyển là $p_0 = 76\text{cmHg}$. Chiều dài cột khí là bao nhiêu khi ống đứng thẳng miệng ở dưới?


A. 15,5 cm

B. 22cm

C. 21,11cm

D. 20,25cm

Giải thích :



Áp suất của cột không khí khi ống nghiệm nằm ngang là

$$p_1 = p_0 = 76 \text{ cmHg.}$$

Áp suất của cột không khí khi ống nghiệm được dựng thẳng đứng miệng ống ở dưới là

$$p_2 = p_0 + d = 76 + 4 = 80 \text{ cmHg.}$$

Ta có $p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$

Chiều dài cột khí trong ống khi ống được dựng thẳng đứng miệng ống ở dưới là $p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2 \Leftrightarrow$

$$76 \cdot S \cdot 20 = 80 \cdot S \cdot l_2 \Rightarrow l_2 = 21,11 \text{ cm}$$

2. Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu	Lệnh hỏi	Đáp án (Đ/S)	Câu	Lệnh hỏi	Đáp án (Đ/S)
1	a)	S	3	a)	Đ
	b)	S		b)	Đ
	c)	Đ		c)	S
	d)	Đ		d)	Đ
2	a)	Đ	4	a)	S
	b)	S		b)	Đ
	c)	Đ		c)	Đ
	d)	Đ		d)	S

Câu 1: Một xilanh nằm ngang, giam một lượng khí lí tưởng bởi một pittong ở cách đáy một đoạn là 20 cm.

a. Thể tích của lượng khí trong xilanh khi chưa di chuyển pittong là $20S \text{ cm}^3$ (với S là diện tích tiết diện của xilanh) $\Rightarrow$ **Đ**

b. Để áp suất khí trong xilanh tăng gấp 4 lần thì thể tích khí trong xilanh là $5S \text{ cm}^3 \Rightarrow$ **Đ**

c. Để áp suất khí trong xilanh tăng gấp 4 lần thì thể tích khí trong xilanh tăng một lượng là $10S \text{ cm}^3 \Rightarrow$ **S**
 Để áp suất khí trong xilanh tăng gấp 4 lần thì thể tích khí trong xilanh tăng một lượng là $10S \text{ cm}^3$.

$$\text{Trạng thái 1 : } p_1, V_1 = S.l = 20S \text{ cm}^3$$


$$\text{Trạng thái 2 : } p_2 = 3p_1, V_2 = S.l'$$

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2 \Rightarrow V_2 = 5S \text{ (cm}^3) \Rightarrow \text{Để áp suất khí trong xilanh tăng gấp 4 lần thì thể tích khí trong xilanh giảm một lượng là } 20S - 5S = 15S \text{ cm}^3.$$

d. Để áp suất khí trong xilanh tăng gấp 4 lần thì phải đẩy pittong theo chiều giảm thể tích khí trong xi lanh một đoạn 25 cm $\Rightarrow$ **S**

Để áp suất khí trong xilanh tăng gấp 4 lần thì phải đẩy pittong theo chiều giảm thể tích khí trong xi lanh một đoạn 15 cm.

Câu 2: Một lượng khí có thể tích 240 cm^3 chứa trong một xilanh có pittong đóng kín, diện tích của đáy pittong là 24 cm^2 (Hình vẽ). Áp suất khí trong xi lanh bằng áp suất ngoài và bằng 100 kPa. Bỏ qua ma sát giữa pittong và thành xilanh. Coi các quá trình xảy ra là đẳng nhiệt.



a. Khi pit-tông dịch chuyển sang trái 2 cm thì thể tích khí lúc này là $192 \text{ cm}^3 \Rightarrow$ **Đ**

$$\text{Khi pit-tông dịch chuyển sang trái 2 cm: } V_2 = V_1 - Sl = 240 - 24 \cdot 2 = 192 \text{ cm}^3$$

b. Khi pit-tông dịch chuyển sang phải 2 cm thể tích khí lúc này là $288 \text{ cm}^3 \Rightarrow$ **Đ**

$$\text{Khi pit-tông dịch chuyển sang phải 2 cm: } V_2 = V_1 + Sl = 240 + 24 \cdot 2 = 288 \text{ cm}^3$$

c. Để dịch chuyển pit tông sang trái 2 cm cần một lực 45 N. $\Rightarrow$ S

Khi pit-tông dịch chuyển sang trái 2 cm (thể tích giảm, áp suất tăng):

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \xrightarrow{p_2 = p_1 + \frac{F}{S}} p_1 V_1 = \left(p_1 + \frac{F}{S} \right) (V_1 - S \cdot l) \Rightarrow 100 \cdot 240 = \left(100 + \frac{F \cdot 10^{-3}}{24 \cdot 10^{-4}} \right) (240 - 24 \cdot 2)$$

$$\Rightarrow F = 60 \text{ N}$$

d. Để dịch chuyển pit-tông sang phải 2 cm cần một lực 65 N $\Rightarrow$ S

Khi pit-tông dịch chuyển sang phải 2 cm (thể tích tăng, áp suất giảm):

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \xrightarrow{p_2 = p_1 - \frac{F}{S}} p_1 V_1 = \left(p_1 - \frac{F}{S} \right) (V_1 + S \cdot l) \Rightarrow 100 \cdot 240 = \left(100 - \frac{F \cdot 10^{-3}}{24 \cdot 10^{-4}} \right) (240 + 24 \cdot 2)$$

$$\Rightarrow F = 40 \text{ N}$$

Câu 3: Ở chính giữa một ống thủy tinh nằm ngang, kín cả hai đầu có một cột thủy ngân dài $h = 19,6 \text{ mm}$. Nếu đặt ống nghiêng một góc 30° so với phương nằm ngang thì cột thủy ngân dịch chuyển một đoạn $\Delta l_1 = 20 \text{ mm}$. Nếu đặt ống thẳng đứng thì cột thủy ngân dịch chuyển một đoạn $\Delta l_2 = 30 \text{ mm}$.

a. Khi ống nằm ngang, áp suất và thể tích của hai lượng khí ở hai bên ống là bằng nhau $\Rightarrow$ D

b. Có thể áp dụng định luật Boyle cho quá trình biến đổi chất khí nói trên. $\Rightarrow$ D

c. Gọi L là chiều dài của ống

Khi ống nằm ngang, tích áp suất và thể tích của lượng khí hai bên ống là

$$pV = p \cdot \frac{L-h}{2} \cdot S$$

$\Rightarrow$ D

d. Áp suất của không khí trong ống khi ống nằm ngang bằng $p_1 = 7 \text{ mmHg}$, $p_2 = 10 \text{ mmHg}$ $\Rightarrow$ S

$$\text{Tích } pV \begin{cases} \text{Khi trên: } p_2 (x + \Delta l_1) S \\ \text{Khi dưới: } (p_2 + 0,5h)(x - \Delta l_1) S \end{cases}$$

*Khi ống đặt nghiêng góc 30° :

$$\text{Tích } pV \begin{cases} \text{Khi trên: } p_3 (x + \Delta l_2) S \\ \text{Khi dưới: } (p_3 + h)(x - \Delta l_2) S \end{cases}$$

*Khi ống đặt thẳng đứng:

*Áp dụng định luật Boyle:


$$p_1 x = \underbrace{p_2 (x + \Delta l_1)}_{(1)} = \underbrace{(p_2 + 0,5h)(x - \Delta l_1)}_{(2)} = \underbrace{p_3 (x + \Delta l_2)}_{(3)} = \underbrace{(p_3 + h)(x - \Delta l_2)}_{(4)}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} (1) \text{ va } (2) \Rightarrow p_2 = \frac{h}{4} \left(\frac{x}{\Delta l_1} - 1 \right) \\ (3) \text{ va } (4) \Rightarrow p_3 = \frac{h}{2} \left(\frac{x}{\Delta l_2} - 1 \right) \end{array} \right. \Rightarrow \frac{p_2}{p_3} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{x}{\Delta l_1} - 1}{\frac{x}{\Delta l_2} - 1} = \frac{x + \Delta l_2}{x + \Delta l_1} \Rightarrow x \approx 49 \text{ mm}$$

*Từ

$$\Rightarrow p_2 = 7 \text{ mmHg} \Rightarrow p_1 = \frac{p_2 (x + \Delta l_1)}{x} = \frac{7(49 + 20)}{49} \approx 10 \text{ mmHg}$$

Câu 4: Cho 1 ống nghiệm 1 đầu kín được đặt nằm ngang; tiết diện đều, bên trong có cột không khí cao $l = 20 \text{ cm}$ ngăn cách với bên ngoài bằng giọt thủy ngân dài $d = 4 \text{ cm}$. Cho áp suất khí quyển là $p_0 = 76 \text{ cmHg}$.



a. Áp suất của cột không khí khi ống nghiệm nằm ngang là $86 \text{ cmHg} \Rightarrow \text{S}$

Áp suất của cột không khí khi ống nghiệm nằm ngang là

$$p_1 = p_0 = 76 \text{ cmHg.}$$

b. Áp suất của cột không khí khi ống nghiệm được dựng thẳng đứng miệng ống ở trên là $80 \text{ cmHg} \Rightarrow \text{Đ}$

Áp suất của cột không khí khi ống nghiệm được dựng thẳng đứng miệng ống ở trên là

$$p_2 = p_0 + d = 76 + 4 = 80 \text{ cmHg.}$$

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$$

c. Thể tích và áp suất của cột không khí liên hệ bằng biểu thức: $\Rightarrow \text{Đ}$

d. Chiều dài cột khí trong ống khi ống được dựng thẳng đứng ống nghiệm miệng ống ở trên là $20 \text{ cm} \Rightarrow \text{S}$

Chiều dài cột khí trong ống khi ống được dựng thẳng đứng ống nghiệm miệng ống ở trên là

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2 \Leftrightarrow 76 \cdot S \cdot l_1 = 80 \cdot S \cdot l_2 \Rightarrow l_2 = 19 \text{ cm}$$


3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm

Câu	Đáp án	Câu	Đáp án
1	20	4	10,3
2	100	5	44,8
3	14,5	6	32,7

Câu 1: Ống thủy tinh dài 60 cm đặt thẳng đứng đầu hở ở trên, đầu kín ở dưới. Một cột không khí cao 20 cm bị giam trong ống bởi một cột thủy ngân cao 40 cm. Biết áp suất khí quyển là 80 cmHg, lật ngược ống lại để đầu kín ở trên, đầu hở ở dưới, coi nhiệt độ không đổi, một phần thủy ngân bị chảy ra ngoài. Hỏi thủy ngân còn lại trong ống có độ cao bao nhiêu cm?

(Kết quả làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)



Đáp án: 2 0

*Đầu hở ở trên, lượng khí trong ống có

$$\begin{cases} p_1 = p_0 + 40 \text{ (cmHg)} \\ V_1 = 20S \text{ (cm}^3\text{)} \end{cases}$$

*Đầu hở ở dưới, lượng khí trong ống có


$$\begin{cases} p_2 = p_0 - h \\ V_2 = (l - h)S \end{cases}$$

*Áp dụng định luật Boyle: $p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow (p_0 + 40) \cdot 20S = (p_0 - h)(l - h)S$

Thay số: $(80 + 40) \cdot 20 = (80 - h)(60 - h) \xrightarrow{h < l=60\text{cm}} h = 20\text{cm}$

Câu 2: Một lượng không khí có thể tích 240 cm^3 bị giam trong một xilanh có pít – tông đóng kín như hình vẽ, diện tích của pít-tông là 20 cm^2 , áp suất khí trong xilanh bằng áp suất ngoài là 100 kPa. Bỏ qua mọi ma sát, coi quá trình trên là đẳng nhiệt. Để pít- tông dịch chuyển sang trái 4 cm thì cần tác dụng lên pít-tông một lực có độ lớn bằng bao nhiêu N?

(Kết quả làm tròn đến 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)



Đáp án: 1 0 0


Khi pít-tông dịch chuyển sang trái thì khí sẽ nén.

$$\left\{ \begin{array}{l} TT_1 \left\{ \begin{array}{l} p_1 = 100 \text{ kPa} \\ V_1 = 240 \text{ cm}^3 \end{array} \right. \\ TT_2 \left\{ \begin{array}{l} p_2 = ? \\ V_2 = V_1 - Sl \end{array} \right. \end{array} \right. \Rightarrow \underbrace{100 \cdot 240}_{p_1 V_1} = \underbrace{p_2 \cdot (240 - 4 \cdot 20)}_{p_2 V_2}$$

$$p_2 = 150 \text{ kPa} \xrightarrow{p_2 = p_1 + \frac{F}{S}} F = (p_2 - p_1) \cdot S = \underbrace{(150 - 100)}_{[Pa]} \cdot \underbrace{20 \cdot 10^{-4}}_{[m^2]} = 100 \text{ N}$$

Câu 3: Một ống thủy tinh tiết diện đều S , một đầu kín một đầu hở, chứa một cột thủy ngân dài $h = 14 \text{ cm}$. Khi đặt ống thẳng đứng, đầu hở ở trên thì chiều dài của cột không khí là $l_1 = 10 \text{ cm}$, áp suất khí quyển bằng $p_0 = 76 \text{ cmHg}$. Khi đặt ống thủy tinh thẳng đứng đầu hở ở dưới thì cột không khí trong ống có chiều dài l_2 bằng bao nhiêu cm?

(Kết quả làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)



Đáp án:	1	4	,	5
----------------	----------	----------	----------	----------

Xét áp suất và thể tích của lượng khí ở phần đáy của ống (đầu kín).

*Khi đặt ống thẳng đứng có đầu hở lên phía trên: $p_1 = p_0 + h$; $V_1 = S \cdot l_1$

*Khi đặt ống thẳng đứng có đầu hở xuống phía dưới: $p_2 = p_0 - h$; $V_2 = S \cdot l_2$

$$(p_0 + h)l_1 = (p_0 - h)l_2 \Rightarrow l_2 = \frac{p_0 + h}{p_0 - h} l_1 = \frac{76 + 14}{76 - 14} \cdot 10 = 14,5 \text{ cm}$$

*Áp dụng định luật Boyle:

Câu 4: Nếu dùng chất lỏng là thủy ngân để làm khí áp kế thì khi đo áp suất khí quyển chiều cao cột thủy ngân là 760mm. Nếu thay thủy ngân bằng một lượng nước đúng bằng lượng thủy ngân ban đầu thì khi đo áp suất khí quyển chiều cao cột nước là bao nhiêu mét? Biết khối lượng riêng của nước là $10^3 \text{ (kg/m}^3\text{)}$.

(Kết quả làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)

Đáp án:	1	0	,	3
----------------	----------	----------	----------	----------


Áp dụng mối liên hệ giữa chiều cao cột thủy ngân và chiều cao cột nước.

$$h(\text{mmHg}) = \frac{h(\text{mmH}_2\text{O})}{13,6} \Rightarrow h(\text{mmH}_2\text{O}) = 13,6h(\text{mmHg})$$


$$\text{Thay số: } h(\text{mmH}_2\text{O}) = 13,6 \cdot 760 = 10336 \text{ mm} \approx 10,3 \text{ m}$$

Sử dụng giải thiết sau cho câu 5, câu 6

Trong một ống nhỏ dài, một đầu kín, một đầu hở, tiết diện đều, ban đầu đặt ống thẳng đứng miệng ống hướng lên, trong ống về phía đáy có cột không khí dài 30cm và được ngăn cách với bên ngoài bằng cột thủy ngân dài $h = 15 \text{ cm}$. Áp suất khí quyển 76cmHg và nhiệt độ không đổi.



Câu 5: Tính chiều cao của cột không khí trong ống theo đơn vị cm? Biết ống thẳng đứng miệng ở dưới? (Kết quả làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)



Đáp án:	4	4	,	8
----------------	----------	----------	----------	----------

Ống thẳng đứng miệng ở dưới

Ta có $p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$, với

$$\begin{cases} p_1 = p_0 + h = 76 + 15 = 91 \text{ cmHg} \\ V_1 = l_1 \cdot S = 30 \cdot S \end{cases}$$


$$\begin{cases} p_2 = p_0 - h = 76 - 15 = 61 \text{ cmHg} \\ V_2 = l_2 \cdot S \end{cases}$$

$$\Rightarrow 91 \cdot 30 \cdot S = 61 \cdot l_2 \cdot S$$

$$\Rightarrow l_2 = 44,8 \text{ cm}$$

Câu 6: Tính chiều cao của cột không khí trong ống theo đơn vị cm? Biết ống đặt nghiêng góc 30° so với phương ngang, miệng ở trên.

(Kết quả làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)



Đáp án:	3	2	,	7
----------------	----------	----------	----------	----------

Ống đặt nghiêng góc 30° so với phương ngang, miệng ở trên.

Cột thủy ngân có độ dài là h nhưng khi đặt nghiêng ra thì độ cao của cột thủy ngân là $h' = h \cdot \sin 30^\circ = \frac{h}{2}$

Ta có $p_1 \cdot V_1 = p_3 \cdot V_3$,

$$\begin{cases} p_3 = p_0 + h' = 76 + 7,5 = 83,5 \text{ cmHg} \\ V_3 = l_3 \cdot S \end{cases} \Rightarrow 91 \cdot 30 \cdot S = 83,5 \cdot l_3 \cdot S \Rightarrow l_3 = 32,7 \text{ cm}$$

với

III – BÀI TẬP TỰ LUYỆN

1. Câu trắc nhiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

Câu 1: Định luật Boyle chỉ đúng

A. với khí thực.

C. khi nhiệt độ thấp.

B. với khí lý tưởng.

D. khi áp suất cao.

Câu 2: Đối với một lượng khí lý tưởng xác định, khi nhiệt độ không đổi thì áp suất

A. tỉ lệ thuận với bình phương thể tích.

C. tỉ lệ thuận với thể tích.

B. tỉ lệ nghịch với thể tích.

D. tỉ lệ nghịch với bình phương thể tích.

Câu 3: Khi một lượng khí giãn đẳng nhiệt thì số phân tử khí trong một đơn vị thể tích sẽ:

A. Tăng, tỉ lệ nghịch với áp suất.

C. Giảm, tỉ lệ thuận với áp suất.

B. Tăng, không tỉ lệ với áp suất.

D. Không thay đổi.

Câu 4: Đặc điểm nào sau đây không phải đặc điểm của quá trình đẳng nhiệt ?


A. Khi thể tích khối khí tăng thì áp suất giảm.

C. Khi áp suất tăng thì thể tích khối khí giảm.

B. Nhiệt độ của khối khí không đổi.

D. Nhiệt độ khối khí tăng thì áp suất tăng.

Câu 5: Cho 1 ống nghiệm 1 đầu kín được đặt nằm ngang; tiết diện đều, bên trong có cột không khí cao $l = 20\text{cm}$ ngăn cách với bên ngoài bằng giọt thủy ngân dài $d = 4\text{cm}$. Cho áp suất khí quyển là $p_0 = 76\text{cmHg}$. Chiều dài cột khí là bao nhiêu



A. 25,75 cm


B. 15,85cm

C. 21,11cm

D. 22cm

$$p_0 \ell_1 S = (p_0 - d) \ell_2 S \Rightarrow \ell_2 = \frac{p_0}{p_0 - d} \cdot \ell_1 = \frac{76}{72} \cdot 20 = 21,111 (\text{cm})$$

Câu 6: Một lượng không khí có thể tích 240cm^3 bị giam trong một xilanh có pít – tông đóng kín như hình vẽ trên, diện tích của pít – tông là 24cm^2 , áp suất khí trong xilanh bằng áp suất ngoài là 100kPa . Cần một lực bằng bao nhiêu để dịch chuyển pít – tông sang phải 2cm ? Bỏ qua mọi ma sát, coi quá trình trên đẳng nhiệt.



A. 25 N

B. 15 N

C. 40 N

D. 30 N


Xét quá trình biến đổi của lượng khí

	Trạng thái 1	Trạng thái 2
Áp suất	$p_1 = 100\text{kPa} = 10^5 \text{ Pa}$	$p_2 = p_1 + \frac{F}{S} = 100 \cdot 10^3 + \frac{F}{24 \cdot 10^{-4}} (\text{Pa})$ (do pittông dịch chuyển sang phải)
Thể tích	$V_1 = Sl = 240 \text{ cm}^3 \Rightarrow l = 10\text{cm}$	$V_2 = S(l + \Delta l) = 24 \cdot (10 + 2) = 288 \text{ cm}^3$

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow 10^5 \cdot 240 = \left(10^5 + \frac{F}{24 \cdot 10^{-4}}\right) \cdot 288 \Rightarrow F = 40 (\text{N})$$

Áp dụng ĐL Bôi-lơ:

Câu 7: Một ống thủy tinh tiết diện đều S , một đầu kín một đầu hở, chứa một cột thủy ngân dài $h = 16 \text{ cm}$. Khi đặt ống thẳng đứng, đầu hở ở trên thì chiều dài của cột không khí là $l_1 = 15 \text{ cm}$, áp suất khí quyển bằng $p_0 = 76 \text{ cmHg}$. Khi đặt ống thủy tinh theo phương thẳng đứng, đầu hở ở dưới thì chiều cao của cột không khí trong ống bằng bao nhiêu?



A. 42 cm

B. 23 cm

C. 15 cm

D. 18 cm

$$p_1 = p_0 + h$$

Khi đặt ống thẳng đứng, đầu hở ở trên thì áp suất và thể tích của khí ở trong ống lần lượt là:


và

$$V_1 = S.l_1$$

Khi đặt ống thủy tinh theo phương thẳng đứng, đầu hở ở dưới thì áp suất và thể tích của khí trong ống lần lượt là: $p_2 = p_0 - h$ và $V_2 = l_0 S$. Áp dụng định luật Boyle:

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \Leftrightarrow (p_0 + h) S l_1 = (p_0 - h) S l_0 \Rightarrow l_0 = \frac{p_0 + h}{p_0 - h} l_1 = \frac{76 + 16}{76 - 16} \cdot 15 = 23 \text{ cm}$$

Câu 8: Một ống thủy tinh tiết diện đều S, một đầu kín một đầu hở, chứa một cột thủy ngân dài $h = 16\text{cm}$. Khi đặt ống thẳng đứng, đầu hở ở trên thì chiều dài của cột không khí là $l_1 = 15\text{cm}$, áp suất khí quyển bằng $p_0 = 76 \text{ cmHg}$. Khi đặt ống thủy tinh nghiêng một góc 30° so với phương thẳng đứng, đầu hở ở trên thì chiều cao của cột không khí trong ống bằng bao nhiêu?



A. 7,45 mm

B. 30,5 mm

C. 15,4 mm

D. 20,4 mm

Khi đặt ống thẳng đứng, đầu hở ở trên: $p_1 = p_0 + h$; $V_1 = S.l_1$

Khi đặt ống thủy tinh nghiêng một góc 30° so với phương thẳng đứng:


Gọi α là góc hợp bởi ống thủy tinh so với phương nằm ngang.

$$p_2 = p_0 + h \sin \alpha; V_2 = l_0 S$$

Áp dụng định luật Boyle:

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \Leftrightarrow (p_0 + h) S l_1 = (p_0 + h \sin \alpha) S l_0 \Rightarrow l_0 = \frac{p_0 + h}{p_0 + h \sin \alpha} l_1 = \frac{76 + 16}{76 + 16 \sin 60^\circ} \cdot 15 = 15,4 \text{ cm}$$

Câu 9: Một lượng không khí bị giam trong ống thủy tinh nằm ngang bởi một cột thủy ngân có chiều dài $h = 100 \text{ mmHg}$, phần cột khí bị giam trong ống có chiều dài là 40 mm , áp suất khí quyển có đơn vị 760 mmHg . Đặt ống nghiêng góc $\alpha = 60^\circ$ so với phương thẳng đứng, miệng ống hướng xuống, giả sử thủy ngân không chảy ra ngoài thì chiều dài cột khí trong ống bằng bao nhiêu?



A. 42,8 mm

B. 50 mm

C. 20 mm

D. 11,5 mm


Khi ống nằm ngang: $p_1 = p_0$ và $V_1 = S.l_0$

Khi ống nằm nghiêng (miệng ống hướng xuống): $p_2 = p_0 - h \cos \alpha$ và $V_2 = S.l'$

Áp dụng định luật Boyle:

$$p_0 l_0 = (p_0 - h \cos \alpha) l' \Rightarrow l' = \frac{l_0}{1 - \frac{h \cos \alpha}{p_0}} = \frac{l_0}{1 - \frac{h \cos 60^\circ}{p_0}} = \frac{l_0}{1 - \frac{h}{2p_0}} = \frac{40}{1 - \frac{100}{2.760}} = 42,8 \text{ mm}$$

Câu 10: Một xilanh đang chứa một khối khí đặt nằm ngang có đáy nằm bên trái, khi đó pít - tông cách đáy xilanh một khoảng 20 cm. Hỏi phải đẩy pít - tông theo chiều nào, một đoạn bằng bao nhiêu để áp suất khí trong xilanh tăng gấp 4 lần? Coi nhiệt độ của khí không đổi trong quá trình trên:



A. sang phải 25cm. B. sang trái 15cm. C. sang phải 15cm. D. sang trái 25 cm.

Do áp suất tăng nên suy ra thể tích phải giảm. Do đó pít-tông phải dịch sang trái

	Trạng thái 1	Trạng thái 2
Áp suất	p_1	4
Thể tích	$V_1 = Sl$	$V_2 = S(l - \Delta l)$

Áp dụng ĐL Boyle: $p_1 V_1 = p_2 V \Rightarrow p_1 Sl = 4 p_1 S(l - \Delta l) \Rightarrow l = 3(l - \Delta l) \xrightarrow{l=20\text{cm}} \Delta l = 15 \text{ cm}$

Câu 11: Một ống thủy tinh tiết diện đều S, một đầu kín một đầu hở, chứa một cột thủy ngân dài $h = 16 \text{ cm}$. Khi đặt ống thẳng đứng, đầu hở ở trên thì chiều dài của cột không khí là $l_1 = 12 \text{ cm}$, áp suất khí quyển bằng $p_0 = 76 \text{ cmHg}$. Khi đặt ống thủy tinh nghiêng một góc $\alpha = 30^\circ$ đối với phương thẳng đứng, đầu hở ở trên thì chiều cao của cột không khí trong ống bằng:

A. 13,5cm B. 20,2cm C. 15cm D. 12,2cm


Khi đặt ống thẳng đứng, đầu hở ở trên: $p_1 = p_0 + h$; $V_1 = S.l_1$

Khi đặt ống thủy tinh nghiêng một góc 30° so với phương thẳng đứng:

Gọi α là góc hợp bởi ống thủy tinh so với phương nằm ngang.

$$p_2 = p_0 + h \sin \alpha; V_2 = l_0 S$$

Áp dụng định luật Boyle:



$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \Leftrightarrow (p_0 + h) S l_1 = (p_0 + h \sin \alpha) S l_0 \Rightarrow l_0 = \frac{p_0 + h}{p_0 + h \sin \alpha} l_1 = \frac{76 + 12}{76 + 12 \sin 60^\circ} \cdot 12 = 12,2 \text{ cm}$$

Câu 12: Ống thủy tinh đặt thẳng đứng đầu hở ở trên, đầu kín ở dưới. Một cột không khí cao 30cm bị giam trong ống bởi một cột thủy ngân cao 40cm. Biết áp suất khí quyển là 80 cmHg, lật ngược ống lại để đầu kín ở trên, đầu hở ở dưới, coi nhiệt độ không đổi, nếu muốn lượng thủy ngân ban đầu không chảy ra ngoài thì chiều dài tối thiểu của ống phải là bao nhiêu?

A. 130cm B. 80cm C. 75cm D. 150cm

Trước khi lật ngược, trạng thái khí là: $p_1 = p_0 + h$, $V_1 = l_1.S$

Khi lật ngược, trạng thái khí là: $p_2 = p_0 - h$, $V_2 = l_2.S$


$$\Rightarrow p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2 \Leftrightarrow (p_0 + h) \cdot l_1 = (p_0 - h) \cdot l_2$$

$$\Leftrightarrow (80 + 40) \cdot 30 = (80 - 40) \cdot l_2$$

$$\Leftrightarrow l_2 = 90 \text{ cm.}$$

$\Rightarrow$ Ống phải dài tối thiểu là: $40 + 90 = 130 \text{ cm.}$

Câu 13: Một không khí trong ống thủy tinh hình trụ nhỏ dài tiết diện đều. Cột không khí được ngăn cách với không khí bên ngoài bởi một cột thủy ngân có chiều dài $l = 15 \text{ mm}$. Chiều dài của cột không khí khi ống nằm ngang là $l_0 = 150 \text{ mm}$. Cho áp suất khí quyển bằng 760 mmHg . Khi ống được đặt thẳng đứng và miệng ống hướng lên trên. Giả sử rằng nhiệt độ của khối khí là không thay đổi. Chiều dài của cột không khí trong ống là:



A. 127 mm

B. 125mm

C. 147mm

D. 100mm


Khi ống nằm ngang, khối khí có thể tích $V_0 = S \cdot l_0 = 150 \cdot S$ và áp suất p_0

Gọi l_1 là chiều dài của cột không khí trong ống khi ống được đặt thẳng đứng, khi đó thể tích của khối khí trong ống là $V = S \cdot l_1$ và áp suất $p = p_0 + l$

Áp dụng định luật Bôilơ:

$$p_0 V_0 = p V \Leftrightarrow 760 \cdot 150 \cdot S = (760 + 15) \cdot S \cdot l_1 \Rightarrow l_1 = 147 \text{ mm}$$

Câu 14: Một ống thủy tinh úp vào trong chậu thủy ngân như hình vẽ làm một cột không khí bị nhốt ở phần đáy trên có chiều dài $l = 56 \text{ mm}$, làm cột thủy ngân dâng lên $h = 748 \text{ mmHg}$, áp suất khí quyển khi đó là 768 mmHg . Thay đổi áp suất khí quyển làm cột thủy ngân tụt xuống, coi nhiệt độ không đổi, tìm áp suất khí quyển khi cột thủy ngân chỉ dâng lên $h' = 734 \text{ mmHg}$:



A. 528mmHg

B. 526mmHg

C. 758mmHg

D. 748,8 mmHg

Lúc đầu áp suất ở phần trên đáy $p_1 = p_{01} - h_1$ và thể tích $V_1 = S \cdot l$

Lúc sau áp suất ở phần trên đáy $p_2 = p_{02} - h_2$ và thể tích $V_2 = S(l + \Delta h)$

Áp dụng định luật Bôilơ: $p_1 V_1 = p_2 V_2 \Leftrightarrow (p_{01} - h_1) S l = (p_{02} - h_2) S (l + h_1 - h_2)$

$$\text{hay } (768 - 748) \cdot 40 = (p_{02} - 734)(40 + 748 - 734) \Rightarrow p_{02} = 748,8 \text{ mmHg}$$

Câu 15: Một ống thủy tinh hình trụ có chiều dài 1 m , một đầu để hở và một đầu được bịt kín. Nhúng ống thủy tinh đó vào trong nước theo hướng thẳng đứng sao cho đầu được bịt kín hướng lên trên (như hình vẽ). Người ta quan sát thấy mực nước trong ống thấp hơn mực nước ngoài ống là 40 cm . Cho biết trọng lượng riêng của nước là $d = 1,013 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$ và nhiệt độ trong nước là không thay đổi. Chiều cao của cột nước trong ống là:



A. 2,4 cm

B. 0,4 cm

C. 4 cm

D. 3,5 m

Gọi A là điểm nằm trên mặt thoáng của chất lỏng ở trong ống, B là điểm nằm ngoài ống nhưng có cùng độ cao với A.

Khi mực nước ở trong vòng ngoài ống cân bằng nhau, ta có:

$$p_A = p_B \Rightarrow p = p_0 + d \cdot h = 1,013 \cdot 10^5 + 1000 \cdot 0,4 = 101700 (Pa)$$

Vì nhiệt độ là không đổi, do đó áp dụng định luật Boyle cho khối khí trong ống trước và sau khi nhúng, ta có:


$$pV = p_0 V_0 \Rightarrow \frac{V}{V_0} = \frac{l}{l_0} = \frac{p_0}{p}$$

Trong đó l và l_0 là chiều cao cột không khí trước và sau khi nhúng

$$l = l_0 \cdot \frac{p_0}{p} = 1 \cdot \frac{101300}{101700} = 0,996 m = 99,6 cm$$

Chiều cao cột nước trong ống là: $H = l_0 - l = 100 - 99,6 = 0,4 (cm)$

Câu 16: Một ống thủy tinh hình trụ, một đầu kín một đầu hở, dài 40cm chứa không khí với áp suất khí quyển $10^5 N/m^2$. Ấn ống xuống chậu nước theo phương thẳng đứng, miệng ống ở dưới sao cho đầu kín ngang với mặt nước. Tính chiều cao cột nước trong ống, biết trọng lượng riêng của nước là: $d = 10^4 N/m^3$



A. 5 cm.

B. 1,25 cm.

C. 0,85 cm.


D. 3,5 cm.

Ta có:
$$\begin{cases} p = p_0 + (h - x)d \\ V = (h - x)S \end{cases}; \text{ Mà } p_0 V_0 = p \cdot V$$

$$\Rightarrow 10^5 \cdot 0,3S = [10^5 + (0,3 - x) \cdot 10^4] \cdot (0,3 - x) \cdot S$$

$$\Rightarrow x \approx 0,85 (cm)$$

Câu 17: Trong một ống nhỏ dài, một đầu kín, một đầu hở, tiết diện đều, ban đầu đặt ống thẳng đứng miệng ống hướng lên, trong ống về phía đáy có cột không khí dài 40cm và được ngăn cách với bên ngoài bằng cột thủy ngân dài $h = 12$ cm. Áp suất khí quyển 76cmHg và nhiệt độ không đổi. Tính chiều cao của cột không khí trong ống với ống đặt nằm ngang?




- A. 30,25 cm B. 46,32 cm C. 22,45 cm D. 15,5 cm

Ống đặt nằm ngang: $p_2 = p_0$

Ta có: $p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow 88.40S = 76.\ell_2.S \Rightarrow \ell_2 = 46,32(\text{cm})$

Câu 18: Cho 1 ống nghiệm 1 đầu kín được đặt nằm ngang; tiết diện đều, bên trong có cột không khí cao $l = 15 \text{ cm}$ ngăn cách với bên ngoài bằng giọt thủy ngân dài $d = 6 \text{ cm}$. Cho áp suất khí quyển là $p_0 = 76 \text{ cmHg}$. Chiều dài cột khí trong ống là bao nhiêu khi ống được dựng thẳng ống nghiệm ở trên?




- A. 14cm B. 25cm C. 24cm D. 15cm

Khi ống nằm ngang: $p = p_0; V = \ell.S$

Khi ống thẳng đứng miệng ở trên: $p_1 = p_0 + d; V_1 = \ell_1.S$

Áp dụng định luật Boyle

$$p_0 \ell S = (p_0 + d) \ell_1 S \Rightarrow \ell_1 = \frac{p_0}{p_0 + d} \cdot \ell = \frac{76}{82} \cdot 15 = 14 \text{ cm}$$



2. Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu 1: Một ống hình chữ U tiết diện 1 cm^2 có một đầu kín. Đổ một lượng thủy ngân vào ống thì đoạn ống chứa không khí bị giảm có độ dài $l_1 = 30 \text{ cm}$ và hai mực thủy ngân ở hai nhánh chênh nhau $h_1 = 11 \text{ cm}$. Đổ thêm thủy ngân thì đoạn chứa không khí có độ dài 29 cm . Áp suất khí quyển $p_0 = 76 \text{ cmHg}$ và nhiệt độ không đổi.

$$p_1 V_1 = (p_0 - h_1) \cdot S l_1$$

a. Trước khi đổ thêm thủy ngân $\Rightarrow$ S

Xét lượng khí bên trong ống trước và sau khi đổ thêm thủy ngân:

$$\begin{cases} \text{Trước : } p_1 V_1 = (p_0 + h_1) \cdot S l_1 \\ \text{Sau : } p_2 V_2 = (p_0 + h_2) \cdot S l_2 \end{cases} \xrightarrow{p_1 V_1 = p_2 V_2} (p_0 + h_1) l_1 = (p_0 + h_2) l_2 (*)$$

$$\begin{aligned} \text{Lượng khí bên trong ống trước khi đổ thêm thủy ngân } p_1 V_1 &= (p_0 + h_1) \cdot S l_1 \\ p_2 V_2 &= (p_0 + h_2) \cdot S l_2 \end{aligned}$$

b. Sau khi đổ thêm thủy ngân : $\Rightarrow$ Đ

Câu 2: Một xilanh có thể tích 100 cm^3 chứa lượng khí lí tưởng có áp suất là $2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. Coi nhiệt độ của khí không thay đổi.

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$$

a. Thể tích và áp suất của khối khí biến đổi theo phương trình: $\Rightarrow$ Đ

b. Nếu đẩy từ từ pittong làm giảm thể tích của khí trong xilanh xuống còn 75 cm^3 thì áp suất của khí trong xilanh lúc này bằng $1,67 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. $\Rightarrow$ S

Nếu đẩy từ từ pittong làm giảm thể tích của khí trong xilanh xuống còn 75 cm^3 thì áp suất của khí trong xilanh lúc này bằng:

$$\text{Trạng thái 1 : } V_1 = 100 \text{ cm}^3, p_1 = 2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$\text{Trạng thái 2 : } V_2 = 75 \text{ cm}^3, p_2 = ?$$

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2 \Rightarrow 100 \cdot 2 \cdot 10^5 = 75 p_2 \Rightarrow p_2 = 2,67 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

c. Nếu tiếp tục đẩy pittong để thể tích của khí trong xilanh xuống còn 50 cm^3 thì áp suất lúc này tăng thêm một lượng $3 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ so với trạng thái ban đầu. $\Rightarrow$ S

Nếu tiếp tục đẩy pittong để thể tích của khí trong xilanh xuống còn 50 cm^3 thì áp suất lúc này tăng thêm một lượng $2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ so với trạng thái ban đầu.

$$\text{Trạng thái 1 : } V_1 = 100 \text{ cm}^3, p_1 = 2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$\text{Trạng thái 2 : } V_2 = 50 \text{ cm}^3, p_2 = ?$$

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2 \Rightarrow 100 \cdot 2 \cdot 10^5 = 50 p_2 \Rightarrow p_2 = 4 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

d. Trong (p,V) đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo thể tích khi nhiệt độ được giữ không đổi, có dạng đường hyperbol. $\Rightarrow$ Đ

Câu 3: Một xilanh đang chứa một khối khí, khi đó pít - tông cách đáy xilanh một khoảng 15cm. Gọi S là diện tích mặt đáy pít tông. Coi nhiệt độ của khí không đổi trong quá trình biến đổi trên:

a. Thể tích của khối khí trong xilanh khi pít tông cách đáy xilanh 15 cm là $5S \text{ cm}^3$. $\Rightarrow$ S

Thể tích của khối khí trong xilanh khi pít tông cách đáy xilanh 15 cm là $15S \text{ cm}^3$.

b. Quá trình biến đổi của khối khí trong xilanh tuân theo định luật Boyle. $\Rightarrow$ Đ

c. Để áp suất khối khí trong xilanh giảm gấp 3 lần thì phải đẩy pít tông ra xa đáy xilanh, một đoạn 3 cm.

$\Rightarrow$ S

Để áp suất khối khí trong xilanh giảm gấp 3 lần thì phải đẩy pít tông ra xa đáy xilanh: $p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2 \Rightarrow 15 \cdot S \cdot p_1 = p_1/3 \cdot l' \cdot S \Rightarrow l' = 45 \text{ cm}$

$$\Delta l = 45 - 15 = 30 \text{ cm}$$

d. Để áp suất khối khí trong xilanh tăng gấp 3 lần thì phải đẩy pít tông về phía đáy xilanh, một đoạn 10 cm. $\Rightarrow$ Đ

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2 \Rightarrow 15 \cdot S \cdot p_1 = 3p_1 \cdot l' \cdot S \Rightarrow l_2 = 5 \text{ cm}$$

$$\Delta l = 15 - 5 = 10 \text{ cm}$$

Câu 4: Cột không khí chứa trong một ống nhỏ, dài, tiết diện đều. Cột không khí được ngăn cách với khí quyển bởi một cột thủy ngân có chiều dài $h = 150 \text{ mm}$. Áp suất khí quyển là $p_0 = 750 \text{ mmHg}$. Chiều dài cột không khí khi ống nằm ngang là $l_0 = 120 \text{ mm}$. Cột không khí khi ống đặt nghiêng góc 30° so với phương ngang, miệng ống ở dưới.

a. Áp suất và thể tích của lượng khí bị giam trong ống thủy tinh mang tỉ lệ thuận với nhau. $\Rightarrow$ S

Xét 2 thông số áp suất và thể tích của lượng khí bị giam trong ống thủy tinh mang tính chất tỉ lệ nghịch với nhau

b. Khi ống nằm ngang: $p_1 = 750 \text{ mmHg}$ và $V_1 = S \cdot l_0 \Rightarrow$ Đ

Khi ống nằm ngang: $p_1 = p_0$ và $V_1 = S \cdot l_0$

$$p_2 = p_0 - h \cos \alpha \quad V_2 = S \cdot l'$$

c. Khi ống nằm nghiêng (miệng ống hướng xuống): và $\Rightarrow$ Đ

d. Chiều dài cột không khí khi ống đặt nghiêng góc 30° so với phương ngang, miệng ống ở dưới có giá trị bằng 0,3 cm. $\Rightarrow$ S

Áp dụng ĐL Boyle

$$p_0 l_0 = (p_0 - h \cos \alpha) l' \Rightarrow l' = \frac{l_0}{1 - \frac{h \cos \alpha}{p_0}} = \frac{l_0}{1 - \frac{h \cos 60^\circ}{p_0}} = \frac{120}{1 - \frac{150}{2 \cdot 750}} = 133,3 \text{ mm}$$

Lượng khí bên trong ống sau khi đổ thêm thủy ngân $p_2 V_2 = (p_0 + h_2) S l_2$

c. Đổ thêm thủy ngân thì độ chênh lệch mực thủy ngân ở hai nhánh $h_2 = 24 \text{ cm} \Rightarrow$ S

Thay số vào pt(*) $\Rightarrow (76 + 11).30 = (76 + h_2).29 \Rightarrow h_2 = 14 \text{ cm}$

Đổ thêm thủy ngân thì độ chênh lệch mực thủy ngân ở hai nhánh $h_2 = 14 \text{ cm}$

d. Thể tích thủy ngân đã đổ thêm bằng $3 \text{ cm}^3 \Rightarrow \mathbf{S}$


Thể tích thủy ngân đã đổ thêm: $\Delta V = S \{ 2(l_1 - l_2) + h_2 - h_1 \} = 1(2.1 + 14 - 11) = 5 \text{ cm}^3$

3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm

Câu	Đáp án	Câu	Đáp án
1	35,7	4	10,5
2	100	5	39,9
3	750	6	35,9

Câu 1: Một ống thủy tinh được cắm lộn ngược vào một chậu chứa thủy ngân, bên trong ống chứa 40 cm³ không khí và một cột thủy ngân cao 8 cm so với mực thủy ngân trong chậu (Hình a). Người ta ấn sâu ống thủy tinh vào thủy ngân cho tới khi mực thủy ngân ở bên trong và bên ngoài ống bằng nhau (Hình b). Biết áp suất khí quyển là 75 cmHg. Thể tích của không khí còn lại bên trong ống thủy tinh bằng bao nhiêu cm³?
(Kết quả làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân).



Đáp án: 3 5 , 7

Ở hình a ta có áp suất và thể tích của lượng khí lần lượt là: $p_1 = p_0 - h_1$; $V_1 = 40 \text{ cm}^3$
Ở hình b ta có áp suất và thể tích của lượng khí lần lượt là:

$$p_2 = p_0 - h_2 \xrightarrow{h_2=0} p_2 = p_0; V_2 = x (\text{cm}^3)$$

Do nhiệt độ không thay đổi nên ta áp dụng ĐL Boyle

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow (p_0 - h_1) V_1 = p_0 x \Rightarrow x = \frac{p_0 - h}{p_0} V_1 = \frac{75 - 8}{75} \cdot 40 = 35,7 \text{ cm}^3$$

Câu 2: Ống thủy tinh đặt thẳng đứng đầu hở ở trên, đầu kín ở dưới. Một cột không khí cao 20cm bị giam trong ống bởi một cột thủy ngân cao 40cm. Biết áp suất khí quyển là 80cmHg, lật ngược ống lại để đầu kín ở trên, đầu hở ở dưới, coi nhiệt độ không đổi, nếu muốn lượng thủy ngân ban đầu không chảy ra ngoài thì chiều dài tối thiểu của ống phải là bao nhiêu cm?
(Kết quả làm tròn đến 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)



Đáp án: 1 0 0

Đầu hở ở trên, lượng khí trong ống có

$$\begin{cases} p_1 = p_0 + 40 (\text{cmHg}) \\ V_1 = 20S (\text{cm}^3) \end{cases}$$


$$\begin{cases} p_2 = p_0 - 40 \\ V_2 = (l - 40)S \end{cases}$$

Đầu hở ở dưới, lượng khí trong ống có

$$\text{Áp dụng định luật Boyle } p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow (p_0 + 40) \cdot 20S = (p_0 - 40)(l - 40)S \xrightarrow{p_0 = 80 \text{ cmHg}} l = 100 \text{ cm}$$

Muốn thủy ngân không bị chảy ra ngoài khi: $l \geq 100 \text{ cm} \Rightarrow l_{\min} = 100 \text{ cm}$

Câu 3: Một ống thủy tinh úp vào trong chậu thủy ngân như hình vẽ làm một cột không khí bị nhốt ở phần đáy trên có chiều dài $l = 56 \text{ mm}$, làm cột thủy ngân dâng lên $h = 748 \text{ mmHg}$, áp suất khí quyển khi đó là 768 mmHg . Thay đổi áp suất khí quyển làm cột thủy ngân tụt xuống, coi nhiệt độ không đổi. Tìm áp suất khí quyển theo đơn vị mmHg khi cột thủy ngân chỉ dâng lên $h' = 734 \text{ mmHg}$.
(Kết quả làm tròn đến 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)



Đáp án:

7	5	0
---	---	---

Lúc đầu áp suất ở phần trên đáy $p_1 = p_{01} - h_1$ và thể tích $V_1 = S \cdot l$

Lúc sau áp suất ở phần trên đáy $p_2 = p_{02} - h_2$ và thể tích $V_2 = S(l + \Delta h)$

$$\text{Áp dụng định luật Boyle } p_1 V_1 = p_2 V_2 \Leftrightarrow (p_{01} - h_1)Sl = (p_{02} - h_2)S(l + h_1 - h_2)$$

$$\text{hay } (768 - 748) \cdot 56 = (p_{02} - 734)(56 + 748 - 734) \Rightarrow p_{02} = 750 \text{ mmHg}$$

Câu 4: Nếu dùng chất lỏng là thủy ngân để làm khí áp kế thì khi đo áp suất khí quyển chiều cao cột thủy ngân là 760 mm . Nếu thay thủy ngân bằng rượu vang có khối lượng đúng bằng khối lượng thủy ngân ban đầu thì khi đo áp suất khí quyển chiều cao cột rượu vang là bao nhiêu mét? Biết khối lượng riêng của rượu vang và thủy ngân lần lượt là $0,984 \cdot 10^3 \text{ (kg/m}^3\text{)}$ và $13,6 \cdot 10^3 \text{ (kg/m}^3\text{)}$
(Kết quả làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)

Đáp án:

1	0	,	5
---	---	---	---

Xét một lượng rượu vang và một lượng thủy ngân có cùng khối lượng.


$$m_R = m_{Hg} \Rightarrow \rho_R V_R = \rho_{Hg} V_{Hg} \Leftrightarrow \rho_R S \cdot h_R = \rho_{Hg} S \cdot h_{Hg}$$

$$\Rightarrow h_{Hg} = \frac{\rho_R}{\rho_{Hg}} \cdot h_R = \frac{h_R (\text{mmR})}{13,6} \Rightarrow h_{Hg} = \frac{h_R (\text{mmR})}{13,8} (\text{mmHg})$$


$$h (\text{mmH}_2\text{O}) = 13,8 h_{Hg} (\text{mmHg}) = 13,8 \cdot 760 \approx 10,5 \text{ m}$$

Sử dụng giải thiết sau cho câu 5, câu 6

Trong một ống nhỏ dài, một đầu kín, một đầu hở, tiết diện đều, ban đầu đặt ống thẳng đứng miệng ống hướng lên, trong ống về phía đáy có cột không khí dài 30 cm và được ngăn cách với bên ngoài bằng cột thủy ngân dài $h = 15 \text{ cm}$. Áp suất khí quyển 76 cmHg và nhiệt độ không đổi.



Câu 5: Tính chiều cao của cột không khí trong ống theo đơn vị cm? Biết ống đặt nghiêng góc 30° so với phương ngang, miệng ở dưới
(Kết quả làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)



Đáp án:	3	9	,	9
----------------	----------	----------	----------	----------

Ống đặt nghiêng góc 30° so với phương ngang, miệng ở dưới

$$h' = h \cdot \sin 30^\circ = \frac{h}{2}$$

Cột thủy ngân có độ dài là h nhưng khi đặt nghiêng ra thì độ cao của cột thủy ngân là


Ta có $p_1 \cdot V_1 = p_4 \cdot V_4$, với

$$\begin{cases} p_4 = p_0 - h' = 76 - 7,5 = 68,5 \text{ cmHg} \\ V_4 = l_4 \cdot S \end{cases}$$

$$\Rightarrow 91,30 \cdot S = 68,5 \cdot l_4 \cdot S$$

$$\Rightarrow l_4 = 39,9 \text{ cm}$$

Câu 6: Tính chiều cao của cột không khí trong ống theo đơn vị cm? Biết ống đặt nằm ngang
(Kết quả làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)



Đáp án:	3	5	,	9
----------------	----------	----------	----------	----------

Ống đặt nằm ngang

Ta có $p_1 \cdot V_1 = p_5 \cdot V_5$, với

$$\begin{cases} p_5 = p_0 = 76 \text{ cmHg} \\ V_5 = l_5 \cdot S \end{cases}$$

$$\Rightarrow 91,30 \cdot S = 76 \cdot l_5 \cdot S$$

$$\Rightarrow l_5 = 35,9 \text{ cm}$$

IV– BÀI TẬP THEO MỨC ĐỘ :

1. Câu trắc nhiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25điểm)

A. Mức độ NHẬN BIẾT – THÔNG HIỂU

Câu 1: Định luật Boyle mô tả mối quan hệ giữa áp suất và thể tích của một lượng khí khi nhiệt độ:

- A. Không đổi
- B. Tăng
- C. Giảm
- D. Thay đổi

⇒ **Đáp án đúng: A**

Giải thích:

Định luật Boyle phát biểu rằng áp suất của một khối lượng khí tỉ lệ nghịch với thể tích của nó khi nhiệt độ không đổi.

Câu 2: Nếu thể tích của một lượng khí giảm đi một nửa, thì áp suất của nó sẽ:

- A. Giảm đi một nửa
- B. Tăng gấp đôi
- C. Không đổi
- D. Tăng gấp ba

⇒ **Đáp án đúng: B**

Giải thích:

Theo định luật Boyle, $pV = \text{hằng số}$. Nếu thể tích V giảm đi một nửa, thì áp suất p sẽ tăng gấp đôi để giữ hằng số.

Câu 3: Biểu thức của định luật Boyle là:

- A. $pV = \text{hằng số}$
- B. $pT = \text{hằng số}$
- C. $V/T = \text{hằng số}$
- D. $p/T = \text{hằng số}$

⇒ **Đáp án đúng: A**

Giải thích:

Định luật Boyle phát biểu rằng tích của áp suất và thể tích của một khối lượng khí là một hằng số khi nhiệt độ không đổi.

Câu 4: Trong quá trình đẳng nhiệt, nếu áp suất của một khí tăng từ 2 atm lên 4 atm, thể tích của nó sẽ:

- A. Tăng gấp đôi
- B. Giảm đi một nửa
- C. Không thay đổi
- D. Giảm đi một phần ba

⇒ **Đáp án đúng: B**

Giải thích:

Theo định luật Boyle, nếu áp suất tăng gấp đôi, thể tích sẽ giảm đi một nửa để giữ hằng số.

Câu 5: Khi nhiệt độ không đổi, nếu thể tích của một khối khí tăng từ 1 lít lên 3 lít, áp suất của nó sẽ:

- A. Giảm đi một phần ba
- B. Tăng gấp ba
- C. Giảm đi một nửa
- D. Không thay đổi

⇒ **Đáp án đúng: A**

Giải thích:

Nếu thể tích tăng gấp ba, áp suất sẽ giảm đi một phần ba để giữ hằng số pV .

Câu 6: Trong hệ tọa độ (p , V), đường đẳng nhiệt là:

- A. Đường thẳng

- B. Đường cong hyperbol
- C. Đường parabol
- D. Đường tròn

⇒ **Đáp án đúng:** B

Giải thích:

Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, V) là một nhánh của đường hyperbol.

Câu 7: Đơn vị của áp suất có thể là:

- A. Lít
- B. Kelvin
- C. Pascal
- D. Joule

⇒ **Đáp án đúng:** C

Giải thích:

Pascal (Pa) là một đơn vị đo áp suất.

Câu 8: Nếu một khí ở trạng thái có áp suất 3 atm và thể tích 2 lít, thì tích số pV là:

- A. 1.5
- B. 6
- C. 5
- D. 3

⇒ **Đáp án đúng:** B

Giải thích:

Tích số $pV = 3 \cdot 2 = 6$.

Câu 9: Đơn vị của thể tích có thể là:

- A. Bar
- B. Lít
- C. Kelvin
- D. Pascal

⇒ **Đáp án đúng:** B

Giải thích:

Lít là một đơn vị đo thể tích.

Câu 10: Định luật Boyle áp dụng khi nào?

- A. Khi nhiệt độ không đổi
- B. Khi thể tích không đổi
- C. Khi áp suất không đổi
- D. Khi tất cả các thông số đều thay đổi

⇒ **Đáp án đúng:** A

Giải thích:

Định luật Boyle chỉ áp dụng khi nhiệt độ của khí không đổi.

Câu 11: Một khí có áp suất ban đầu là 5 atm và thể tích là 4 lít. Nếu thể tích tăng lên 8 lít, áp suất sẽ là:

- A. 10 atm
- B. 2.5 atm
- C. 5 atm
- D. 1 atm

⇒ **Đáp án đúng:** B

Giải thích:

Theo định luật Boyle, $p_1 V_1 = p_2 V_2$

Câu 12: Nếu áp suất của một khí giảm từ 6 atm xuống 3 atm, thể tích sẽ:

- A. Giảm đi một nửa
- B. Tăng gấp đôi
- C. Không thay đổi
- D. Tăng gấp ba

⇒ **Đáp án đúng:** B

Giải thích:

Nếu áp suất giảm đi một nửa, thể tích sẽ tăng gấp đôi để giữ hằng số pV

Câu 13: Khi một khí nén lại, áp suất của nó sẽ:

- A. Giảm
- B. Tăng
- C. Không đổi
- D. Bằng không

⇒ **Đáp án đúng:** B

Giải thích:

Khi khí nén lại, thể tích giảm, làm tăng áp suất theo định luật Boyle.

Câu 14: Một khí có áp suất ban đầu là 2 atm và thể tích là 10 lít. Nếu thể tích giảm xuống 5 lít, áp suất sẽ là:

- A. 1 atm
- B. 4 atm
- C. 2 atm
- D. 10 atm

⇒ **Đáp án đúng:** B

Giải thích:

Theo định luật Boyle, $p_2 = \frac{p_1 V_1}{V_2} = 4 \text{ atm}$

Câu 15: Nếu nhiệt độ của khí giữ không đổi, mối quan hệ giữa áp suất và thể tích là:

- A. Tỷ lệ thuận
- B. Tỷ lệ nghịch
- C. Không liên quan
- D. Tỷ lệ với bình phương của nhau

⇒ **Đáp án đúng:** B

Giải thích:

Theo định luật Boyle, áp suất và thể tích của một khối lượng khí tỷ lệ nghịch với nhau khi nhiệt độ không đổi.

Câu 16: Một khí có áp suất 100 kPa và thể tích 0.5 m³. Nếu thể tích thay đổi thành 1 m³, áp suất mới sẽ là:

- A. 50 kPa
- B. 200 kPa
- C. 100 kPa
- D. 25 kPa

⇒ **Đáp án đúng:** A

Giải thích:

Theo định luật Boyle, $p_1 V_1 = p_2 V_2 = 1 p_2$

Câu 17: Một khí có thể tích 3 lít và áp suất 2 atm. Thể tích tăng thêm 3 lít. Áp suất mới sẽ là:

- A. 4 atm
- B. 1 atm
- C. 2 atm
- D. 3 atm

⇒ **Đáp án đúng:** B

Giải thích:

Theo định luật Boyle, $p_1 V_1 = p_2 V_2 = 1 p_2$

Câu 18: Khi áp suất của một khí tăng gấp đôi, thể tích của nó sẽ:

- A. Tăng gấp đôi
- B. Giảm đi một nửa
- C. Không thay đổi
- D. Tăng gấp ba

⇒ **Đáp án đúng:** B

Giải thích:

Theo định luật Boyle, nếu áp suất tăng gấp đôi, thể tích sẽ giảm đi một nửa để giữ hằng số.

Câu 19: Đơn vị của áp suất nào sau đây không đúng?

- A. Pascal (Pa)
- B. Bar
- C. Lít
- D. Atmosphere (atm)

⇒ **Đáp án đúng:** C

Giải thích:

Lít là đơn vị đo thể tích, không phải áp suất.

Câu 20: Khi áp suất và thể tích của một khí không đổi, sản phẩm của chúng:

- A. Thay đổi
- B. Tăng
- C. Giảm
- D. Không đổi

⇒ **Đáp án đúng:** D

Giải thích:

Theo định luật Boyle, sản phẩm của áp suất và thể tích của một khối lượng khí không đổi khi nhiệt độ không đổi.

Câu 21: Nếu một lượng khí có áp suất ban đầu là 2 atm và thể tích là 5 lít, khi thể tích thay đổi thành 10 lít, áp suất mới của khí sẽ là

- A. giảm thêm 1 atm
- B. tăng thêm 1 atm
- C. giảm đến 1 atm
- D. tăng đến 1 atm

⇒ **Đáp án đúng:** A

Giải thích:

Theo định luật Boyle, $p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow V_2 = 1 \Rightarrow V_2 - V_1 = -1 \text{ atm} \Rightarrow$ giảm

Câu 22: Một khí có thể tích ban đầu là 6 lít và áp suất là 3 atm. Nếu thể tích giảm đi 4 lít, áp suất mới sẽ là bao nhiêu?

- A. 6 atm
- B. 9 atm
- C. 12 atm
- D. 18 atm

⇒ **Đáp án đúng:** B

Giải thích:

$$\text{Theo định luật Boyle, } p_2 = \frac{p_1 V_1}{V_2} = \frac{6 \cdot 3}{6 - 4}$$

Câu 23: Một khí ở nhiệt độ không đổi có thể tích tăng gấp đôi, áp suất của khí sẽ thay đổi như thế nào?

- A. Tăng gấp đôi
- B. Giảm đi một nửa
- C. Không thay đổi
- D. Giảm đi một phần ba

⇒ **Đáp án đúng:** B

Giải thích:

Theo định luật Boyle, nếu thể tích tăng gấp đôi, áp suất sẽ giảm đi một nửa.

Câu 24: Khi áp suất của một khí giảm từ 8 atm xuống 4 atm, thể tích của nó sẽ thay đổi như thế nào?

- A. Giảm đi một nửa
- B. Tăng gấp đôi
- C. Không thay đổi
- D. Tăng gấp ba

⇒ **Đáp án đúng:** B

Giải thích:

Theo định luật Boyle, nếu áp suất giảm đi một nửa, thể tích sẽ tăng gấp đôi.

Câu 25: Một bình chứa khí có thể tích 0.75 m^3 ở áp suất 2 atm . Nếu áp suất tăng lên thêm 2 atm , thể tích sẽ là:

- A. 0.75 m^3
- B. 0.375 m^3
- C. 1.5 m^3
- D. 3 m^3

⇒ **Đáp án đúng:** B

Giải thích:

Theo định luật Boyle, $V_2 = \frac{p_1 V_1}{p_2} = 0.375 \text{ m}^3$.

Câu 26: Một lượng khí có thể tích 6 lít dưới áp suất 2 atm . Nếu nhiệt độ được giữ không đổi và áp suất tăng lên 50% so với ban đầu thì thể tích của lượng khí này là bao nhiêu?

- A. 3 lít
- B. 4 lít
- C. 2.5 lít
- D. 6 lít

⇒ **Đáp án đúng:** B

Giải thích:

Áp suất tăng lên 50% có nghĩa là áp suất mới là $p_2 = p_1 + 0.5 p_1 = 3 \text{ atm}$.

$$V_2 = \frac{p_1 V_1}{p_2} = 4$$

Câu 27: Một khối khí lý tưởng xác định có áp suất 2 atm được làm tăng áp suất đến 6 atm ở nhiệt độ không đổi thì thể tích biến đổi một lượng 2 lít . Thể tích ban đầu của khối khí đó là bao nhiêu?

- A. 3 lít
- B. 4 lít
- C. 6 lít
- D. 8 lít

⇒ **Đáp án đúng:** A

Giải thích:

$$V_1 = \frac{p_2 V_2}{p_1} = \frac{6(V_1 - 2)}{2} = 3(V_1 - 2)$$

Câu 28: Khí được nén đẳng nhiệt từ thể tích 30 lít đến thể tích 20 lít , áp suất khí tăng thêm 0.5 atm . Tìm áp suất ban đầu của khí?

- A. 1 atm
- B. 1.5 atm
- C. 2 atm
- D. 0.75 atm

⇒ **Đáp án đúng:** A

Giải thích:

Theo định luật Boyle, $p_1 V_1 = p_2 V_2 = 30 p_1 = 20(p_1 + 0.5) = 20 p_1 + 10$

Câu 29: Một lượng khí có thể tích 12 lít dưới áp suất 1 atm . Nếu nhiệt độ được giữ không đổi và áp suất tăng lên 100% so với ban đầu thì thể tích của lượng khí này là bao nhiêu?

- A. 6 lít
- B. 8 lít
- C. 12 lít
- D. 4 lít

⇒ **Đáp án đúng:** A

Giải thích:

Áp suất tăng lên 100% có nghĩa là áp suất tăng lên gấp đôi $p_2 = 2 p_1$

Áp dụng: $p_1 V_1 = p_2 V_2 = 24$

Câu 30: Một khối khí lý tưởng xác định có áp suất 1.5 atm được làm tăng áp suất đến 3 atm ở nhiệt độ không đổi thì thể tích biến đổi một lượng 2 lít. Thể tích ban đầu của khối khí đó là bao nhiêu?

- A. 3 lít
- B. 4 lít
- C. 6 lít
- D. 2 lít

⇒ **Đáp án đúng:** B

Giải thích:

Áp suất tăng=> Thể tích giảm.

Áp dụng: $p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow 1,5 \cdot V_1 = 3(V_1 - 2) \Rightarrow V_1 = 4 \text{ lít}$

Câu 31: Khí được nén đẳng nhiệt từ thể tích 40 lít đến thể tích 25 lít, áp suất khí tăng thêm 1 atm. Áp suất ban đầu của khí gần bằng

- A. 2 atm
- B. 1.5 atm
- C. 3 atm
- D. 1.2 atm

⇒ **Đáp án đúng:** B

Giải thích:

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow p_1 \cdot 40 = (p_1 + 1) \cdot 25 \Rightarrow p_1 = \frac{25}{15} = 1,67 \text{ atm}$$

Câu 32: Một bình chứa khí có thể tích 15 lít và áp suất là 3 atm. Nếu thể tích tăng lên thêm 5 lít, áp suất sẽ thay đổi bao nhiêu?

- A. 2.25 atm
- B. 2.5 atm
- C. 0,75 atm
- D. 3.6 atm

⇒ **Đáp án đúng:** C

Giải thích:

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow p_2 = 2,25 \text{ atm} \Rightarrow \Delta p = p_2 - p_1 = -0,75 \Rightarrow \text{Giảm } 0,75 \text{ atm}$$

Câu 33: Một bình khí có thể tích 8 lít chứa không khí ở áp suất 2 atm. Nếu nén không khí vào bình đi thể tích 4 lít, áp suất trong bình sẽ thay đổi bao nhiêu phần trăm?

- A. 100%
- B. 50%
- C. 75%
- D. 25%

⇒ **Đáp án đúng:** A

Giải thích:

Theo định luật Boyle, $p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow p_2 = 4 \text{ atm} \Rightarrow \frac{p_2 - p_1}{p_1} \cdot 100\% = 100\%$

Câu 34: Một khối khí lý tưởng xác định có áp suất 2 atm được làm tăng áp suất đến 8 atm ở nhiệt độ không đổi thì thể tích biến đổi một lượng 6 lít. Thể tích ban đầu của khối khí đó là bao nhiêu?

- A. 4 lít
- B. 6 lít
- C. 8 lít
- D. 12 lít

⇒ **Đáp án đúng:** C

Giải thích:

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow 2 \cdot V_1 = 8(V_1 - 6) \Rightarrow V_1 = 8 \text{ lít}$$

Câu 35: Một bình chứa khí có thể tích 10 lít và áp suất là 1.5 atm. Nếu thể tích tăng lên 15 lít, áp suất sẽ thay đổi bao nhiêu lần so với ban đầu?

- A. tăng 3 lần

B. tăng $1/3$ lần

C. giảm 3 lần

D. giảm $1/3$ lần

⇒ **Đáp án đúng:** D

Giải thích:

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 = 10 \cdot 1,5 = 15. \quad p_2 = 1 \text{ atm} = \frac{p_2 - p_1}{p_1} = \frac{1 - 1,5}{1,5} = \frac{-1}{3}$$

B. Mức độ VẬN DỤNG – VẬN DỤNG CAO

Câu 36: Một bơm xe đạp có đường kính trong là 4 cm. Người ta dùng ngón tay bịt kín đầu vòi bơm và ấn pit-tông từ từ để nén không khí trong bơm sao cho nhiệt độ không thay đổi. Lấy áp suất khí quyển là $p_0 = 10^5$ Pa. Khi thể tích của không khí trong bơm giảm đi 5 lần thì lực tác dụng lên pit-tông bằng bao nhiêu N?

A. 628 N

B. 256 N

C. 460 N

D. 500 N

⇒ Đáp án đúng: A**Giải thích:**

Giảm thể tích 5 lần, áp suất tăng lên 5 lần $p = 5 p_0$. Diện tích pit-tông $S = \frac{\pi d^2}{4}$. Lực

$$F = p \cdot S = 5 \cdot 10^5 \cdot \frac{3,14 \cdot 0,04^2}{4} = 628 \text{ N}$$

Câu 37: Để bơm đầy một khí cầu đến thể tích 50 m^3 có áp suất 1 atm ở nhiệt độ không đổi, người ta dùng các ống khí hêli có thể tích 10 lít ở áp suất 200 atm. Số ống khí hêli cần để bơm khí cầu bằng:

A. 25

B. 10

C. 50

D. 75

⇒ Đáp án đúng: A**Giải thích:**

Sử dụng định luật Boyle: $p_1 V_1 = p_2 V_2 \cdot n$ (n : số lần bơm)

$$n > n = \frac{p_1 V_1}{p_2 V_2} = \frac{50 \cdot 1}{0,01 \cdot 200} = 25$$

Câu 38: Dùng ống bơm bơm một quả bóng đang bị xẹp, mỗi lần bơm đẩy được 75 cm^3 không khí ở áp suất 1 atm vào quả bóng. Sau 80 lần bơm, quả bóng có dung tích 3 lít, coi quá trình bơm nhiệt độ không đổi, áp suất khí trong quả bóng sau khi bơm là

A. 1 atm

B. 2 atm

C. 3 atm

D. 4 atm

⇒ Đáp án đúng: B**Giải thích:**

Áp dụng: $p_1 V_1 = p_2 V_2 \cdot n = p_1 \cdot 3000 = 1,75 \cdot 80 = p_1 = 2 \text{ atm}$

Câu 39: Một quả bóng có dung tích 6 lít bị xẹp. Dùng ống bơm mỗi lần đẩy được 50 cm^3 không khí ở áp suất 1 atm vào quả bóng. Sau 24 lần bơm, áp suất khí trong quả bóng là bao nhiêu? Coi nhiệt độ không đổi trong quá trình bơm.

A. 0.2 atm

B. 1.2 atm

C. 1.5 atm

D. 2.0 atm

⇒ Đáp án đúng: B**Giải thích:**

$$\text{Áp dụng: } p_s V_s = p_1 V_1 = p_s = \frac{p_1 (V_0 + 50 \cdot 24)}{V_s} = \frac{1 \cdot (6000 + 50 \cdot 24)}{6000} = 1,2 \text{ atm}$$

Câu 40: Người ta dùng một bơm tay có ống bơm dài 30 cm và đường kính trong 3 cm để bơm không khí vào một túi cao su sao cho túi phồng lên. Sau khi bơm, không khí trong túi có thể tích là $4,71 \text{ lít}$ và áp suất không

khí trong túi là 3 atm. Biết áp suất khí quyển là 1 atm và coi nhiệt độ của không khí được bơm vào túi không đổi. Số lần đẩy bơm gần bằng là

- A. 100 lần
- B. 50 lần
- C. 67 lần
- D. 134 lần

⇒ **Đáp án đúng: C**

Giải thích:

$$p_s V_s = p_1 V_1 = 3.4710 = 1. \pi \cdot \frac{d^2}{4} \cdot l \cdot n = n = 66.67 \approx 67$$

Câu 41: Dùng một bơm không khí có áp suất 0.9 atm và nhiệt độ không đổi để bơm vào bình có thể tích là 3 lít có áp suất là 0.4 atm. Mỗi lần bơm, ta đưa được 100 cm³ không khí vào trong quả bóng đó. Sau khi bơm 30 lần, áp suất bên trong quả bóng có giá trị là:

- A. 1.8 atm
- B. 1.3 atm
- C. 2.7 atm
- D. 3.0 atm

⇒ **Đáp án đúng: B**

Giải thích:

$$p = \frac{n \cdot V_{\text{mỗi lần bơm}} \cdot P_{\text{bơm}}}{V}$$

Áp suất tổng cộng sau khi bơm x lần có thể tính theo công thức sau:

$$P_2 = P_1 + \frac{n \cdot V_{\text{mỗi lần bơm}} \cdot P_{\text{bơm}}}{V} = 0.4 + \frac{30 \cdot 0.1 \cdot 0.9}{3} = 1.3$$

Câu 42: Một bơm không khí có thể tích 0.15 lít và áp suất của bơm không khí trong bơm là 1 atm. Dùng bơm để bơm không khí vào một quả bóng có dung tích không đổi là 3 lít. Giả sử ban đầu áp suất của khí trong bình là 1 atm và nhiệt độ của quả bóng là không thay đổi trong suốt quá trình bơm. Hãy xác định áp suất của khối khí trong bóng sau 10 lần bơm.


- A. 1.5 atm
- B. 1.7 atm
- C. 2.0 atm
- D. 2.5 atm

⇒ **Đáp án đúng: A**

Giải thích:

$$P_2 = P_1 + \frac{n \cdot V_{\text{mỗi lần bơm}} \cdot P_{\text{bơm}}}{V} = 1.0 + \frac{10 \cdot 0.15 \cdot 1}{3} = 1.5$$

Câu 43: Cho 1 ống nghiệm 1 đầu kín được đặt nằm ngang; tiết diện đều, bên trong có cột không khí cao $l = 22\text{cm}$ ngăn cách với bên ngoài bằng giọt thủy ngân dài $d = 4\text{cm}$. Cho áp suất khí quyển là $p_0 = 76\text{cmHg}$. Chiều dài cột khí trong ống là bao nhiêu khi ống được dựng thẳng ống nghiệm ở trên?



- A. 21cm

- B. 20cm

- C. 19cm

- D. 18cm

⇒ **Đáp án đúng: A**

Giải thích:

+ Khi ống nằm ngang: $p = p_0; V = l \cdot S$

+ Khi ống thẳng đứng miệng ở trên: $p_1 = p_0 + d; V_1 = l_1 \cdot S$

+ Áp dụng định luật Boyle $p_0 l S = (p_0 + d) l_1 S$

$$\Rightarrow l_1 = \frac{p_0}{p_0 + d} \cdot l = \frac{76}{80} \cdot 22 = 20,9 \approx 21 \text{ cm}$$

Câu 44: Một ống thủy tinh hình trụ, một đầu kín một đầu hở, dài 42cm chứa không khí với áp suất khí quyển 10^5 N/m^2 . Ấn ống xuống chậu nước theo phương thẳng đứng, miệng ống ở dưới sao cho đầu kín ngang với mặt nước. Tính chiều cao cột nước trong ống? biết trọng lượng riêng của nước là: $d = 10^4 \text{ N/m}^3$

- A. 1,5 cm. B. 2,3 cm. C. 1,8 cm. D. 4 cm.

⇒ **Đáp án đúng:** B

Giải thích:

+ Ta có:
$$\begin{cases} p = p_0 + (h - x)d \\ V = (h - x)S \end{cases}; \text{ Mà } p_0 V_0 = p \cdot V$$

$$\Rightarrow 10^5 \cdot 0,5S = [10^5 + (0,5 - x) \cdot 10^4] \cdot (0,5 - x) \cdot S$$

$$\Rightarrow x \approx 2,3 \text{ cm}$$

Câu 45: Phía trên cột thủy ngân của áp kế có lọt một khối lượng nhỏ không khí, nên áp kế đó chỉ áp suất nhỏ hơn áp suất khí quyển. Khi áp suất khí quyển là 768mmHg thì áp kế chỉ 748 mmHg, chiều dài khoảng chân không khi đó là 80 mm. Coi nhiệt độ trong hai lần đo là như nhau. Nếu áp kế chỉ 734 mmHg thì áp suất khí quyển thực bằng bao nhiêu mmHg?

- A. 760 mmHg
B. 755 mmHg
C. 745 mmHg
D. 758 mmHg

⇒ **Đáp án đúng:** D

Giải thích:

Khi phong vũ biểu chỉ 758mmHg, áp suất không khí lọt vào

$$p_1 = 768 - 748 = 20 \text{ mmHg}$$

Chiều dài của phong vũ biểu là: $h = 748 + h_1 = 748 + 80 = 828 \text{ mmHg}$

Khi phong vũ biểu chỉ 734mmHg, chiều dài khoảng chân không là

$$h_2 = h - 734 = 828 - 734 = 94 \text{ mmHg}$$

Trong hai trường hợp nhiệt độ môi trường không đổi, xét cột khí lọt vào là khí lí tưởng, áp dụng định luật Bôi lơ:

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow \frac{p_1}{p_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{h_1}{h_2} \Rightarrow \frac{20}{p_2} = \frac{80}{94} \Rightarrow p_2 = 23,25 \text{ mmHg}$$

⇒ Áp suất khí quyển: $p = p_2 + 734 = 757,5 \text{ mmHg}$

Câu 46: Một ống nghiệm hình trụ có chứa chất lỏng có độ cao h và khối lượng riêng là ρ , phần miệng ống

ở trên, bên dưới chất lỏng có chứa một lượng khí. Biết áp suất khí quyển là p_0 . Xác lập biểu thức tính áp suất của lượng khí bên trong ống ?

- A. $p = p_0 - \rho gh$
B. $p = p_0 + \rho gh$
C. $p = p_0 - 2\rho gh$
D. $p = p_0 + 2\rho gh$



⇒ **Đáp án đúng:** D

Giải thích:


Gọi S là diện tích đáy của ống hình trụ.

Lượng khí bị nén bởi trọng lượng của chất lỏng. Do đó ta áp dụng công thức:

$$p = p_0 + \frac{F}{S} \xrightarrow{F=P} p = p_0 + \frac{P}{S} = p_0 + \frac{mg}{S} = p_0 + \frac{\rho Vg}{S} \xrightarrow{V=Sh} p = p_0 + \rho gh$$

Câu 47: Một xilanh đang chứa một khối khí, khi đó pit-tông cách đáy xilanh một khoảng 20cm. Hỏi phải đẩy pit-tông theo chiều nào, một đoạn bằng bao nhiêu để áp suất khí trong xilanh tăng gấp 4 lần? Coi nhiệt độ của khí không đổi.

- A. Pit tông dịch sang trái một đoạn là 10 cm.
 B. Pit tông dịch sang trái một đoạn là 15 cm.
 C. Pit tông dịch sang phải một đoạn là 10 cm.
 D. Pit tông dịch sang phải một đoạn là 15 cm.



⇒ **Đáp án đúng:** B


Giải thích:

Do áp suất tăng nên suy ra thể tích phải giảm. Do đó pit-tông phải dịch sang trái

	Trạng thái 1	Trạng thái 2
Áp suất	p_1	$p_2 = 4 p_1$
Thể tích	$V_1 = Sl$	$V_2 = S(l - \Delta l)$

*Áp dụng ĐL Bôi-lo: $p_1 V_1 = p_2 V \Rightarrow p_1 Sl = 4 p_1 \cdot S(l - \Delta l)$
 $\Rightarrow l = 4(l - \Delta l) \Rightarrow l = 20 \text{ cm} \Rightarrow \Delta l = 15 \text{ cm}$

Câu 48: Ống thủy tinh đặt thẳng đứng đựng dầu hỏa ở trên, dầu kín ở dưới. Một cột không khí cao 10cm bị giam trong ống bởi một cột thủy ngân cao 30cm. Biết áp suất khí quyển là 76 cmHg, lật ngược ống lại để dầu kín ở trên, dầu hỏa ở dưới, coi nhiệt độ không đổi, nếu muốn lượng thủy ngân ban đầu không chảy ra ngoài thì chiều dài tối thiểu của ống phải là bao nhiêu ?



- A. 53cm B. 63cm C. 65cm D. 75cm

⇒ **Đáp án đúng:** A

Giải thích:


Trước khi lật ngược, trạng thái khí là: $p_1 = p_0 + h$, $V_1 = l_1 \cdot S$

Khi lật ngược, trạng thái khí là: $p_2 = p_0 - h$, $V_2 = l_2 \cdot S$

$\Rightarrow p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2 \Leftrightarrow (p_0 + h) \cdot l_1 = (p_0 - h) \cdot l_2 \Leftrightarrow l_2 = 23 \text{ cm}$

⇒ Ống phải dài tối thiểu là: $30 + 23 = 53 \text{ cm}$.

Câu 49: Một lượng không khí có thể tích 240 cm^3 bị giam trong một xilanh có pit – tông đóng kín như hình vẽ trên, diện tích của pit – tông là 24 cm^2 , áp suất khí trong xilanh bằng áp suất ngoài là 100kPa. Cần một lực bằng bao nhiêu để dịch chuyển pit – tông sang trái 4cm? Bỏ qua mọi ma sát, coi quá trình trên đẳng nhiệt.



- A. 160N B. 140N C. 120N D. 100N

⇒ **Đáp án đúng:** A

Giải thích:

Xét trạng thái biến đổi của chất khí :

	Trạng thái 1	Trạng thái 2
Áp suất	$p_1 = 100 \text{ kPa} = 10^5 \text{ Pa}$	$p_2 = p_1 + \frac{F}{S} = 100 \cdot 10^3 + \frac{F}{24 \cdot 10^{-4}} (\text{Pa})$

		(do pitong dịch chuyển sang trái)
Thể tích	$V_1 = Sl = 240 \text{ cm}^3 \Rightarrow l = 10 \text{ cm}$	$V_2 = S(l - \Delta l) = 24 \cdot (10 - 4) = 144 \text{ cm}^3$

Áp dụng ĐL Bôi-lơ: $p_1 V_1 = p_2 V \Rightarrow 10^5 \cdot 240 = \left(10^5 + \frac{F}{24 \cdot 10^{-4}}\right) \cdot 144 \Rightarrow F = 160 \text{ (N)}$

Câu 50: Ở chính giữa một ống thủy tinh nằm ngang, tiết diện nhỏ, chiều dài $L = 100 \text{ cm}$, hai đầu bịt kín có một cột thủy ngân dài $h = 20 \text{ cm}$. Trong ống có không khí. Khi đặt ống thẳng đứng cột thủy ngân dịch chuyển xuống dưới một đoạn $l = 12 \text{ cm}$. Tìm áp suất của không khí trong ống khi ống nằm ngang ra cmHg và Pa. Coi nhiệt độ không khí trong ống không đổi và khối lượng riêng thủy ngân là $\rho = 1,36 \cdot 10^4 \text{ kg/m}^3$.

A. $5,1 \cdot 10^4 \text{ Pa}$

B. $4,4 \cdot 10^4 \text{ Pa}$

C. $2,2 \cdot 10^4 \text{ Pa}$

D. 10^4 Pa

⇒ **Đáp án đúng:** A

Giải thích:

Trạng thái 1 của mỗi lượng khí ở hai bên cột thủy ngân (ống nằm ngang):
Trạng thái 2 (ống thẳng đứng)

$$\begin{cases} p_1 \\ V_1 = \frac{L-h}{2} \cdot S \end{cases}$$

+ Đối với lượng khí ở trên cột thủy ngân: $\begin{cases} p_2 \\ V_2 = \left(\frac{L-h}{2} + l\right) \cdot S \end{cases}$

+ Đối với lượng khí ở dưới cột thủy ngân: $\begin{cases} p'_2 \\ V'_2 = \left(\frac{L-h}{2} - l\right) \cdot S \end{cases}$

Áp suất khí ở phần dưới bằng áp suất khí ở phần trên cộng với áp suất do cột thủy ngân gây ra. Do đó đối với khí ở phần dưới, ta có: $\begin{cases} p'_2 = p_2 + h \\ V'_2 = \left(\frac{L-h}{2} - l\right) \cdot S \end{cases}$

Áp dụng định luật Boyle cho từng lượng khí. Ta có:

+ Đối với khí ở trên: $p_1(L-h) \frac{S}{2} = p_2(L-h+2l) \frac{S}{2} \Rightarrow p_1(L-h) = p_2(L-h+2l) \quad (1)$

+ Đối với khí ở dưới:

$$p_1(L-h) \frac{S}{2} = (p_2+h)(L-h-2l) \frac{S}{2} \Rightarrow p_1(L-h) = (p_2+h)(L-h-2l) \quad (2)$$

Từ hai phương trình (1) và (2) rút ra: $p_2 = \frac{h(L-h-2l)}{4l}$ Thay giá trị của p_2 vào (1) ta được:

$$p_1 = \frac{h[(L-h)^2 - 4l^2]}{4l(L-l)} = \frac{20[(100-20)^2 - 4 \cdot 15^2]}{4 \cdot 15(100-20)} = 33,08 \approx 33 \text{ cmHg}$$

$$p_1 = 33 \text{ cmHg}$$

$$p_1 = \rho g H = 1,36 \cdot 10^4 \cdot 9,8 \cdot 0,33 = 4,4 \cdot 10^4 \text{ Pa.}$$

Câu 51: Một ống thủy tinh tiết diện đều gồm một đầu kín, một đầu hở, trong ống có cột không khí ngăn cách với bên ngoài bằng cột thủy ngân dài 22 cm . Khi ống thẳng đứng miệng ở dưới thì chiều dài cột không khí là 48 cm , miệng ở trên thì dài cột không khí là 27 cm . Tính áp suất khí quyển và chiều dài cột không khí khi ống nằm ngang.

A. $34,56 \text{ cm}$.

B. $35,37 \text{ cm}$.

C. $40,50 \text{ cm}$.

D. $42,50 \text{ cm}$.

⇒ **Đáp án đúng:** A

Giải thích:

Ta có

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow (p_0 - 22) \cdot 48 = (p_0 + 22) \cdot 27 \Rightarrow p_0 = 78,6 \text{ cmHg}$$

Mặt khác

$$p_0 V_0 = p_1 V_1 \Rightarrow 78,6 \cdot l = 56,6 \cdot 48 \Rightarrow l = 34,56 \text{ cm}$$

Câu 52: Một ống thủy tinh tiết diện đều có chiều dài 60cm gồm một đầu kín, một đầu hở hướng lên, trong ống có cột không khí ngăn cách với bên ngoài bằng cột thủy ngân dài $a=30\text{cm}$, cột thủy ngân bằng miệng ống. Khi ống thẳng đứng miệng ở dưới thì một phần thủy ngân chảy ra ngoài. Tìm cột thủy ngân còn lại trong ống. Biết áp suất khí quyển là 80cmHg .

- A. 11,7 cm. B. 20,2 cm. C. 40,5 cm. D. 42,5 cm.

⇒ **Đáp án đúng:** A

Giải thích:

Gọi S là diện tích ống thủy tinh. Chiều dài cột không khí có trong ống là

$$l_1 = 60 - a = 30 \text{ cm}$$

Áp suất không khí trong ống : $p_1 = p_0 + a = 110 \text{ cmHg}$

Khi lật ngược miệng ống phía dưới thì cột thủy ngân còn lại trong ống là x nên

$$p_2 = p_0 - x = 80 - x (\text{cmHg})$$


Chiều dài cột không khí $l_2 = 60 - x$

$$\text{Ta có } p_1 V_1 = p_2 V_2 \Leftrightarrow p_1 l_1 S = p_2 l_2 S \Leftrightarrow (p_0 + a)(60 - a) = (80 - x) \cdot (60 - x)$$

Mà $x = 128 < 30 \text{ cm}$ nên $x = 11,7 \text{ cm}$

Vậy độ cao cột thủy ngân còn lại trong ống là 11,7cm

Câu 53: Trong một ống nhỏ dài, một đầu kín, một đầu hở, tiết diện đều, ban đầu đặt ống thẳng đứng miệng ống hướng lên, trong ống về phía đáy có cột không khí dài 40cm và được ngăn cách với bên ngoài bằng cột thủy ngân dài $h = 20\text{cm}$. Áp suất khí quyển 76cmHg và nhiệt độ không đổi. Tính chiều cao của cột không khí trong ống của trường hợp ống thẳng đứng miệng ở dưới?



- A. 58,065 cm B. 68,57 cm C. 72 cm D. 60,35 cm

⇒ **Đáp án đúng:** B

Giải thích:


Ống thẳng đứng miệng ở dưới

Ta có $p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$, với

$$\begin{cases} p_1 = p_0 + h \\ V_1 = l_1 \cdot S = 40 \cdot S \\ p_2 = p_0 - h \\ V_2 = l_2 \cdot S \end{cases}$$

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \Leftrightarrow (p_0 + h) l_1 S = (p_0 - h) l_2 S \Leftrightarrow (76 + 20) 40 = (76 - 20) l_2$$

$$\Rightarrow l_2 = 68,57 \text{ cm}$$




Câu 54: Trong một ống nhỏ dài, một đầu kín, một đầu hở, tiết diện đều, ban đầu đặt ống thẳng đứng miệng ống hướng lên, trong ống về phía đáy có cột không khí dài 40cm và được ngăn cách với bên ngoài bằng cột thủy ngân dài $h = 20\text{cm}$. Áp suất khí quyển 76cmHg và nhiệt độ không đổi. Tính chiều cao của cột không khí trong ống của trường hợp ống đặt nghiêng góc 30° so với phương ngang, miệng ở trên?

- A. 56,128 cm B. 44,651 cm C. 58,182 cm D. 52,121 cm

⇒ **Đáp án đúng:** B

Giải thích:



Ống đặt nghiêng góc $\alpha = 30^\circ$ so với phương ngang, miệng ở trên.

Cột thủy ngân có độ dài là h nhưng khi đặt nghiêng ra thì độ cao của cột thủy ngân là $h' = h$.


$$\sin 30^\circ = \frac{h}{2}$$

$$Ta\ có\ p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2,$$

$$\begin{cases} p_1 = p_0 + h \\ V_1 = l_1 \cdot S = 40 \cdot S \\ p_2 = p_0 + h \sin \alpha \\ V_2 = l_2 \cdot S \end{cases}$$

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \Leftrightarrow (p_0 + h) l_1 S = (p_0 + h \sin \alpha) l_2 S \Rightarrow l_2 = 44,65\text{ cm}$$

Câu 55: Trong một ống nhỏ dài, một đầu kín, một đầu hở, tiết diện đều, ban đầu đặt ống thẳng đứng miệng ống hướng lên, trong ống về phía đáy có cột không khí dài 40cm và được ngăn cách với bên ngoài bằng cột thủy ngân dài $h = 20\text{cm}$. Áp suất khí quyển 76cmHg và nhiệt độ không đổi. Tính chiều cao của cột không khí trong ống của trường hợp ống đặt nghiêng góc 30° so với phương ngang, miệng ở dưới ?



A. 58,182 cm

B.

43,373 cm

C. 52,174 cm


D. 54,065 cm

⇒ Đáp án đúng: A

Giải thích:

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \Leftrightarrow (p_0 + h) l_1 S = (p_0 - h \sin \alpha) l_2 S \Rightarrow l_2 = 58,182\text{ cm}$$

Câu 56: Cho 1 ống nghiệm 1 đầu kín được đặt nằm ngang; tiết diện đều, bên trong có cột không khí cao $l = 20\text{cm}$ ngăn cách với bên ngoài bằng giọt thủy ngân dài $h = 8\text{cm}$. Cho áp suất khí quyển là $p_0 = 76\text{cmHg}$. Chiều dài cột khí là bao nhiêu khi ống đứng thẳng miệng ở dưới?



A. 21,11 cm

B. 19,69 cm

C. 22 cm

D. 22,35 cm

⇒ Đáp án đúng: D

Giải thích:

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \Leftrightarrow p_0 l_1 S = (p_0 - h) l_2 S \Rightarrow l_2 = 22,35\text{ cm}$$

2. Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

A. Mức độ NHẬN BIẾT- THÔNG HIỂU

Câu 1: Sự biến thiên của áp suất khi nấu nướng trong nồi áp suất.

A. Áp suất trong nồi áp suất tăng lên so với áp suất khí quyển bên ngoài khi nấu nướng. Điều này giúp nước đạt nhiệt độ sôi cao hơn và thực phẩm nấu chín nhanh hơn so với nấu truyền thống. $\Rightarrow$ **Đ**

B. Áp suất tăng lên trong nồi áp suất là do hơi nước được giữ lại bên trong nồi, làm tăng áp suất và nhiệt độ nấu nước $\Rightarrow$ **Đ**

C. Định luật Boyle được áp dụng để giải thích sự tăng áp suất trong nồi áp suất. $\Rightarrow$ **S**

(Thực tế là trong nồi áp suất, thể tích không phải là yếu tố quyết định chính để giải thích sự tăng áp suất, mà là do hơi nước bị giữ lại)

D. Khi sử dụng nồi áp suất, người nấu không cần phải quan tâm đến việc điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nấu. $\Rightarrow$ **S**

(Thực tế là việc điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nấu rất quan trọng để đảm bảo món ăn được nấu chín đều và an toàn.)

Câu 2: Khi bạn đóng gói hành lý vào một vali và nén chặt nó lại, bạn có thể quan sát thấy một số hiện tượng liên quan đến áp suất và thể tích không khí bên trong vali.

A. Áp suất bên trong vali tăng lên so với áp suất bên ngoài khi bạn nén hành lý bên trong vali. Điều này giúp hành lý được giữ chặt hơn và vali đóng kín hơn. $\Rightarrow$ **Đ**

(Khi thể tích không khí bên trong vali giảm do nén hành lý, áp suất tăng lên, giúp giữ chặt hành lý và đảm bảo vali đóng kín.)

B. Áp suất tăng lên trong vali là do không khí bên trong bị nén lại, làm tăng áp suất và giúp giữ hành lý chặt hơn. $\Rightarrow$ **Đ**

(Áp suất tăng là do thể tích không khí bên trong vali giảm khi bạn nén hành lý.)

C. Định luật Boyle được áp dụng để giải thích sự tăng áp suất bên trong vali khi nén hành lý. $\Rightarrow$ **Đ**

(Định luật Boyle giải thích rằng khi thể tích khí giảm, áp suất tăng lên nếu nhiệt độ không đổi.)

D. Khi đóng gói hành lý trong vali, bạn không cần phải quan tâm đến việc điều chỉnh vị trí và số lượng hành lý. $\Rightarrow$ **S**

(Việc điều chỉnh vị trí và số lượng hành lý rất quan trọng để đảm bảo vali đóng kín và hành lý không bị hư hỏng trong quá trình di chuyển.)

Câu 3. Một lượng khí được giữ ở nhiệt độ không đổi. Ban đầu khí có áp suất p_1 và thể tích V_1 . Sau đó, thể tích của khí thay đổi thành V_2 , dẫn đến áp suất thay đổi thành p_2 .

Hãy xác định nhận định nào đúng và nhận định nào sai trong các nhận định sau:

A. Khi thể tích khí tăng lên, áp suất của khí cũng tăng lên nếu nhiệt độ không đổi. $\Rightarrow$ **S**

(Theo định luật Boyle, khi nhiệt độ không đổi, áp suất và thể tích tỉ lệ nghịch với nhau. Khi thể tích tăng lên, áp suất giảm đi.)

B. Khi thể tích khí giảm, áp suất của khí tăng nếu nhiệt độ không đổi $\Rightarrow$ **Đ**

C. Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo thể tích khi nhiệt độ không đổi là một đường thẳng trong hệ tọa độ (p, V) . $\Rightarrow$ **S**

(Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo thể tích khi nhiệt độ không đổi là một nhánh của đường hyperbol trong hệ tọa độ (p, V) .)

D. Định luật Boyle chỉ áp dụng khi nhiệt độ và lượng khí không đổi. $\Rightarrow$ **Đ**

B. Mức độ VẬN DỤNG – VẬN DỤNG CAO

Câu 4: Một bóng bay chứa khí heli được thả vào không khí ở nhiệt độ không đổi. Ban đầu, bóng bay có áp suất $p_1 = 1 \text{ atm}$ và thể tích $V_1 = 2 \text{ lít}$. Khi bóng bay lên cao, áp suất bên ngoài giảm xuống còn $p_2 = 0.5 \text{ atm}$.

Giả sử nhiệt độ không thay đổi và lượng khí trong bóng bay không đổi và bóng chỉ chịu được dẫn nở tới đa đến thể tích 7,7 lít

Hãy xác định nhận định nào đúng và nhận định nào sai trong các nhận định sau:

A. Khi bóng bay lên cao, thể tích của bóng bay sẽ tăng. $\Rightarrow \mathbf{Đ}$

(Theo định luật Boyle, khi áp suất giảm, thể tích tăng nếu nhiệt độ không đổi.)

B. Khi áp suất giảm xuống còn 0.5 atm, thể tích của bóng bay sẽ tăng gấp đôi so với ban đầu. $\Rightarrow \mathbf{Đ}$

(Với áp suất giảm từ 1 atm xuống 0.5 atm, theo định luật Boyle, thể tích tăng gấp đôi từ 2 lít lên 4 lít.)

C. Đường biểu diễn sự thay đổi áp suất và thể tích của bóng bay trên hệ tọa độ (p, V) là một đường thẳng. $\Rightarrow \mathbf{S}$

(Đường biểu diễn sự thay đổi áp suất và thể tích trong hệ tọa độ (p, V) là một nhánh của đường hyperbol, không phải là một đường thẳng.)

D. Nếu áp suất bên ngoài giảm tiếp xuống còn 0.25 atm, thì bóng có tiếp tục bay lên $\Rightarrow \mathbf{S}$

(Thể tích của bóng bay tăng lên 8 lít > 7,7 lít $\Rightarrow$ bóng sẽ vỡ)

Câu 5: Một phong vũ biểu (barometer) được sử dụng để đo áp suất khí quyển ở hai độ cao khác nhau. Ban đầu, phong vũ biểu đo được áp suất khí quyển là $p_1=760$ mmHg ở mặt đất. Khi phong vũ biểu được đưa lên đỉnh núi cao, áp suất đo được là $p_2=600$ mmHg. Giả sử nhiệt độ không thay đổi và không có sự thay đổi về thể tích của chất lỏng trong phong vũ biểu. Hãy xác định nhận định nào đúng và nhận định nào sai trong các nhận định sau:

A. Khi áp suất khí quyển giảm, cột thủy ngân trong phong vũ biểu sẽ giảm xuống. $\Rightarrow \mathbf{Đ}$

(Khi áp suất khí quyển giảm, cột thủy ngân trong phong vũ biểu sẽ giảm vì áp suất bên ngoài ít hơn, làm cho cột thủy ngân không bị đẩy lên cao.)

B. Khi áp suất khí quyển ở đỉnh núi là 600 mmHg, thì áp suất ở đỉnh núi thấp hơn áp suất ở mặt đất là 150mmHg $\Rightarrow \mathbf{S}$

(Áp suất khí quyển ở đỉnh núi là 600 mmHg thấp hơn áp suất ở mặt đất là 760 mmHg $\Rightarrow$ Độ giảm là 160mmHg), điều này phản ánh đúng thực tế khi áp suất giảm theo độ cao.)

C. Giả thiết rằng cứ lên cao 10m thì áp suất giảm 1mmHg nên độ cao của đỉnh núi là 1,5km $\Rightarrow \mathbf{S}$

(Độ giảm là 160mmHg nên độ cao tương ứng là 1600m)

D. Nếu áp suất khí quyển tiếp tục giảm xuống còn 500 mmHg, cột thủy ngân trong phong vũ biểu sẽ giảm xuống dưới 600 mmHg. $\Rightarrow \mathbf{Đ}$

(Nếu áp suất khí quyển giảm xuống còn 500 mmHg, cột thủy ngân trong phong vũ biểu sẽ giảm xuống dưới mức 600 mmHg vì áp suất thấp hơn tiếp tục làm giảm độ cao của cột thủy ngân.)

Câu 6: Một bọt khí có thể tích 2 cm³ được tạo ra bởi một tàu ngầm đang lặn ở độ sâu 150 m dưới mực nước biển. Giả sử nhiệt độ của bọt khí là không đổi. Cho khối lượng riêng của nước biển là 1.03×10^3 kg/m³. Áp suất khí quyển là 1.02×10^5 Pa, $g = 9.8$ m/s².

A. Áp suất của bọt khí ở độ sâu 150m dưới mực nước biển là 16.16×10^5 Pa. $\Rightarrow \mathbf{Đ}$

$$(P = P_0 + \rho gh = 16,161.10^5)$$

B. Khi bọt khí nổi lên mặt nước, áp suất của bọt khí nhỏ hơn áp suất khí quyển $P_0=1.02 \times 10^5$ Pa $\Rightarrow \mathbf{S}$

(Khi bọt khí nổi lên mặt nước, áp suất của nó sẽ là áp suất khí quyển, không thể nhỏ hơn)

C. Vì nhiệt độ của bọt khí là không đổi nên có thể áp dụng định luật Boyle đối với trạng thái ở trên mặt nước và dưới mặt nước 150 m. $\Rightarrow \mathbf{Đ}$

D. Khi bọt khí nổi lên mặt nước thì sẽ có thể tích là 23 cm³. $\Rightarrow \mathbf{S}$

(Theo định luật Boyle: $P_1 V_1 = P_2 V_2 = P_3 V_3 = 31,686 \text{ cm}^3$)

3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm

Mức độ VẬN DỤNG – VẬN DỤNG CAO

Câu 1: Một bình chứa khí có thể tích 0.75 m³ ở áp suất 4 atm. Nếu áp suất tăng lên thêm 4 atm, thể tích sẽ là bao nhiêu lít?

Đáp án:	3	7	5	
---------	---	---	---	--

Giải thích:

Theo định luật Boyle, $V_2 = \frac{p_1 V_1}{p_2} = 0.375 \text{ m}^3 = 375 \text{ lít}$.

Câu 2: Một lượng khí có thể tích 7 lít dưới áp suất 2 atm. Nếu nhiệt độ được giữ không đổi và áp suất tăng lên 75% so với ban đầu thì thể tích của lượng khí này là bao nhiêu lít?

Đáp án:	4			
---------	---	--	--	--

Giải thích:

Áp suất tăng lên 75% có nghĩa là áp suất mới là $p_2 = p_1 + 0,75 p_1 = 3,5 \text{ atm}$.

$$V_2 = \frac{p_1 V_1}{p_2} = 4 \text{ lít}$$

Câu 3: Khí được nén đẳng nhiệt từ thể tích 40 lít đến thể tích 20 lít, áp suất khí tăng thêm 2,5 atm. Áp suất ban đầu của khí gần bằng atm?

Đáp án:	2	,	5	
---------	---	---	---	--

Giải thích:

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 = p_1 \cdot 40 = (p_1 + 2,5) \cdot 20 \Rightarrow p_1 = 2,5 \text{ atm}$$

Câu 4: Một bơm xe đạp có đường kính trong là 4 cm. Người ta dùng ngón tay bịt kín đầu vòi bơm và ấn piston từ từ để nén không khí trong bơm sao cho nhiệt độ không thay đổi. Lấy áp suất khí quyển là $p_0 = 10^5 \text{ Pa}$. Khi tác dụng lực 628N thì thể tích của không khí trong bơm giảm đi bao nhiêu lần?

Đáp án:	4			
---------	---	--	--	--

Giải thích:

Giảm thể tích n lần, áp suất tăng lên n lần $p = n p_0$. Diện tích piston $S = \frac{\pi d^2}{4}$. Lực

$$F = p \cdot S = n \cdot 10^5 \cdot \frac{3,14 \cdot 0,04^2}{4} = 628 \text{ N} \Rightarrow n = 5$$

$$\Rightarrow (V_2 - V_1) / V_1 = 4 \text{ lần}$$

Câu 5: Để bơm đầy một khí cầu đến thể tích 100 m³ có áp suất 1 atm ở nhiệt độ không đổi, người ta dùng các ống khí hêli có thể tích 10 lít ở áp suất 200 atm. Số ống khí hêli cần để bơm khí cầu bằng:

Đáp án:	5	0		
---------	---	---	--	--

Giải thích:

Sử dụng định luật Boyle: $p_1 V_1 = p_2 V_2 \cdot n$ (n : số lần bơm)

$$\Rightarrow n = \frac{p_1 V_1}{p_2 V_2} = \frac{100 \cdot 1}{0,01 \cdot 200} = 50$$

Câu 6: Dùng một bơm không khí có áp suất 0.9 atm và nhiệt độ không đổi để bơm vào bình có thể tích là 3 lít có áp suất là 0,45 atm. Mỗi lần bơm, ta đưa được 100 cm³ không khí vào trong quả bóng đó. Sau khi bơm 50 lần, áp suất bên trong quả bóng có giá trị là bao nhiêu atm?

Đáp án:	1	,	9	5
---------	---	---	---	---

Giải thích:

$$p = \frac{n \cdot V_{\text{mỗi lần bơm}} \cdot P_{\text{bơm}}}{V}$$

Áp suất tổng cộng sau khi bơm x lần có thể tính theo công thức sau:

$$P_2 = P_1 + \frac{n \cdot V_{\text{mỗi lần bơm}} \cdot P_{\text{bơm}}}{V} = 0.44 + \frac{50 \cdot 0.1 \cdot 0.9}{3} = 1.95$$

Câu 7: Một ống thủy tinh hình trụ, một đầu kín một đầu hở, dài h (cm) chứa không khí với áp suất khí quyển 10^5 N/m^2 . Ấn ống xuống chậu nước theo phương thẳng đứng, miệng ống ở dưới sao cho đầu kín ngang với mặt nước. Biết trọng lượng riêng của nước là: $d = 10^4 \text{ N/m}^3$ và nước dâng lên trong ống là 2,3cm. Chiều cao cột chứa không khí lúc đầu bao nhiêu cm?

Đáp án:

5	0	,	3
---	---	---	---


Giải thích:

+ Ta có:
$$\begin{cases} p = p_0 + (h - x)d \\ V = (h - x)S \end{cases}; \text{ Mà } p_0 V_0 = p \cdot V$$

$$\Rightarrow 10^5 \cdot hS = [10^5 + (h - 2,3) \cdot 10^4] \cdot (h - 2,3) \cdot S$$

$$\Rightarrow h \approx 0,503 \text{ m} = 50,3 \text{ cm}$$

Câu 8: Ống thủy tinh đặt thẳng đứng đầu hở ở trên, đầu kín ở dưới. Một cột không khí cao 10cm bị giam trong ống bởi một cột thủy ngân cao 30cm. Biết suất khí quyển là 76 cmHg, lật ngược ống lại để đầu kín ở trên, đầu hở ở dưới, nhiệt độ không đổi, nếu muốn lượng thủy ngân ban đầu không chảy ra ngoài chiều dài tối thiểu của ống phải là bao nhiêu mét?



Đáp án:

0	,	5	3
---	---	---	---

Giải thích:

Trước khi lật ngược, trạng thái khí là: $p_1 = p_0 + h$, $V_1 = l_1 \cdot S$

Khi lật ngược, trạng thái khí là: $p_2 = p_0 - h$, $V_2 = l_2 \cdot S$

$$\Rightarrow p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2 \Leftrightarrow (p_0 + h) \cdot l_1 = (p_0 - h) \cdot l_2 \Leftrightarrow l_2 = 23 \text{ cm.}$$

$\Rightarrow$ Ống phải dài tối thiểu là: $30 + 23 = 53 \text{ cm} = 0,53 \text{ m}$

Câu 9: Một ống thủy tinh tiết diện đều có chiều dài 60,0cm gồm một đầu kín, một đầu hở hướng lên, trong ống có cột không khí ngăn cách với bên ngoài bằng cột thủy ngân dài a , cột thủy ngân bằng miệng ống. Khi ống thẳng đứng miệng ở dưới thì một phần thủy ngân chảy ra ngoài còn lại 12,0cm. Tìm cột thủy ngân ban đầu trong ống là bao nhiêu cm? Biết áp suất khí quyển là 80cmHg.

Đáp án:

3	0	,	4
---	---	---	---

Giải thích:

Gọi S là diện tích ống thủy tinh. Chiều dài cột không khí có trong ống là

$$l_1 = 60 - a \text{ cm}$$

Áp suất không khí trong ống: $p_1 = p_0 + a = 120 \text{ cmHg}$

Khi lật ngược miệng ống phía dưới thì cột thủy ngân còn lại trong ống là $x = 12 \text{ cm}$ nên

$$p_2 = p_0 - x = 80 - x (\text{cmHg})$$

Chiều dài cột không khí $l_2 = 60 - x$

$$\text{Ta có } p_1 V_1 = p_2 V_2 \Leftrightarrow p_1 l_1 S = p_2 l_2 S \Leftrightarrow (p_0 + a)(60 - a) = (80 - x) \cdot (60 - x)$$

$$a = 30,4 \text{ cm}$$