

Bài 1: (6,0 điểm)

$$Q = \left(\frac{\sqrt{3}}{x^2 + x\sqrt{3} + 3} + \frac{3}{x^3 - \sqrt{27}} \right) \left(\frac{x}{\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{3}}{x} + 1 \right)$$

1) Cho biểu thức

a/ Tìm điều kiện của Q và rút gọn Q

b/ Tính giá trị của Q khi

$$x = \sqrt{4 + \sqrt{7}} - \sqrt{4 - \sqrt{7}}$$

2) Chứng minh rằng $A = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 100^3$ chia hết cho $B = 1 + 2 + 3 + \dots + 100$ **Bài 2: (4,0 điểm)**1) Giải phương trình: $\sqrt{x - 2013} + \sqrt{4x - 8052} = 3$ 2) Cho $abc = 1$. Tính $S = \frac{1}{1+a+ab} + \frac{1}{1+b+bc} + \frac{1}{1+c+ac}$ **Bài 3: (3,0 điểm)**1) Tìm nghiệm nguyên của phương trình: $x^2 + 2y^2 + 2xy + 3y - 4 = 0$ 2) Biết rằng a, b là các số thỏa mãn $a > b > 0$ và $a.b = 1$ Chứng minh :

$$\frac{a^2 + b^2}{a - b} \geq 2\sqrt{2}$$

Bài 3: (6,0 điểm)

Cho nửa đường tròn đường kính $BC = 2R$, tâm O cố định. Điểm A di động trên nửa đường tròn. Gọi H là hình chiếu của điểm A lên BC. Gọi D và E lần lượt là hình chiếu của H lên AC và AB.

a) Chứng minh tam giác ABC vuông

b) Chứng minh: $AB \cdot EB + AC \cdot EH = AB^2$

c) Xác định tam giác ABC sao cho tứ giác AEHD có diện tích lớn nhất? Tính diện tích lớn nhất đó theo R.

Bài 5: (1,0 điểm)Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình: $2(x + y) + 16 = 3xy$ **HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9**

Bài	Tóm tắt lời giải	Điểm
Bài 1 Câu 1a (2đ)	<p>1.a) ĐKXD: $x \neq 0; x \neq \sqrt{3}$</p> $Q = \left(\frac{\sqrt{3}}{x^2 + x\sqrt{3} + 3} + \frac{3}{x^3 - \sqrt{27}} \right) \left(\frac{x}{\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{3}}{x} + 1 \right)$	0,5

	$Q = \left(\frac{\sqrt{3}}{x^2 + x\sqrt{3} + 3} + \frac{3}{(x - \sqrt{3})(x^2 + x\sqrt{3} + 3)} \right) \left(\frac{x^2 + x\sqrt{3} + 3}{\sqrt{3}x} \right)$ $= \left(\frac{(x - \sqrt{3})\sqrt{3} + 3}{(x - \sqrt{3})(x^2 + x\sqrt{3} + 3)} \right) \left(\frac{x^2 + x\sqrt{3} + 3}{\sqrt{3}x} \right)$ $= \frac{1}{x - \sqrt{3}}$	0,5 0,5 0,5
Bài 1 Câu 1b (2 đ)	<p>1.b) Ta có: $x = \sqrt{4 + \sqrt{7}} - \sqrt{4 - \sqrt{7}}$</p> $x = \sqrt{\frac{8 + 2\sqrt{7}}{2}} - \sqrt{\frac{8 - 2\sqrt{7}}{2}}$ $x = \sqrt{\frac{(1 + \sqrt{7})^2}{2}} - \sqrt{\frac{(1 - \sqrt{7})^2}{2}}$ $x = \frac{1 + \sqrt{7}}{\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{7} - 1}{\sqrt{2}}$ $x = \sqrt{2}$ <p>Thay $x = \sqrt{2}$ vào Q ta có:</p> $Q = \frac{1}{\sqrt{2} - \sqrt{3}} = -\sqrt{2} - \sqrt{3}$	0,5 0,5 0,5 0,5
Bài 1 Câu 2 (2 đ)	<p>2. Ta có: $B = (1 + 100) + (2 + 99) + \dots + (50 + 51) = 101 \cdot 50$</p> <p>Để chứng minh A chia hết cho B ta chứng minh A chia hết cho 50 và 101</p> <p>Ta có: $A = (1^3 + 100^3) + (2^3 + 99^3) + \dots + (50^3 + 51^3)$</p> $= (1 + 100)(1^2 + 100 + 100^2) + (2 + 99)(2^2 + 2 \cdot 99 + 99^2) + \dots + (50 + 51)(50^2 + 50 \cdot 51 + 51^2) = 101(1^2 + 100 + 100^2 + 2^2 + 2 \cdot 99 + 99^2 + \dots + 50^2 + 50 \cdot 51 + 51^2)$ <p>chia hết cho 101 (1)</p> <p>Lại có: $A = (1^3 + 99^3) + (2^3 + 98^3) + \dots + (50^3 + 100^3)$</p> <p>Mỗi số hạng trong ngoặc đều chia hết cho 50 nên A chia hết cho 50 (2)</p> <p>Từ (1) và (2) suy ra A chia hết cho 101 và 50 nên A chia hết cho B</p>	0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Bài 2 (1,5 đ)	$\sqrt{x - 2013} + \sqrt{4x - 8052} = 3; DK : x \geq 2013$ <p>1. $\Rightarrow 3\sqrt{x - 2013} = 3 \Leftrightarrow x = 2014 (TMĐK)$</p> <p>2. Cho $abc = 1$.</p> $\Rightarrow ab = \frac{1}{c}$	0,5 1,0 0,5

**PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN PHÙ MỸ**

**ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN
Môn: Toán 9**

Thời gian làm bài: 150 phút

Đề gồm 01 trang

Bài 1: (3,5 điểm)

Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n ta có:

$$A = 7.5^{2n} + 12.6^n \text{ chia hết cho } 19$$

Bài 2: (2,5 điểm)

Tìm số tự nhiên n sao cho: $n + 24$ và $n - 65$ là hai số chính phương

Bài 3: (3,0 điểm)

Cho $a, b > 0$ và $a + b = 1$.

$$\text{Chứng minh rằng : } \left(a + \frac{1}{a}\right)^2 + \left(b + \frac{1}{b}\right)^2 \geq 12,5$$

Bài 4: (3,0 điểm)

Cho x, y là hai số dương thỏa mãn : $x^2 + y^2 = 4$.

$$E = \left(x + \frac{1}{y}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{x}\right)^2$$

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :

Bài 5: (4,0 điểm)

Cho tam giác ABC có D là trung điểm cạnh BC , điểm M nằm trên trung tuyến AD . Gọi I, K lần lượt là các trung điểm tương ứng của MB, MC và P, Q là các giao điểm tương ứng của các tia DI, DK với các cạnh AB, AC .

Chứng minh: $PQ \parallel IK$.

Bài 6: (4,0 điểm)

Cho tam giác ABC có $BC = a, CA = b, AB = c$. Gọi đường cao hạ từ các đỉnh A, B, C xuống các cạnh BC, CA và AB tương ứng là h_a, h_b, h_c . Gọi O là một điểm bất kỳ trong tam giác đó và khoảng cách từ O xuống ba cạnh BC, CA và AB tương ứng là x, y và z .

$$M = \frac{x}{h_a} + \frac{y}{h_b} + \frac{z}{h_c}$$

Tính

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI HSG LỚP 9 CẤP HUYỆN - MÔN TOÁN

Bài 1 (3,5đ)	<p>Với $n = 0$ ta có $A(0) = 19 \div 19$</p> <p>Giả sử A chia hết cho 19 với $n = k$ nghĩa là: $A(k) = 7.5^{2k} + 12.6^k \div 19$</p> <p>Ta phải chứng minh A chia hết cho 19 với $n = k + 1$ nghĩa là phải chứng minh:</p> $A(k+1) = 7.5^{2(k+1)} + 12.6^{k+1} \div 19$ <p>Ta có: $A(k+1) = 7.5^{2(k+1)} + 12.6^{k+1}$</p> $= 7.5^{2k}.5^2 + 12.6^n.6$ $= 7.5^{2k}.6 + 7.5^{2k}.19 + 12.6^n.6$ $= 6.A(k) + 7.5^{2k}.19 \div 19$ <p>Vậy theo nguyên lý quy nạp thì $A = 7.5^{2n} + 12.6^n$ chia hết cho 19 với mọi số tự nhiên n</p>	<p>0,5</p> <p>0,75</p> <p>0,75</p> <p>1,0</p> <p>0,5</p>
Bài 2 (2,5đ)	<p>1</p> <p>Ta có: $n+24=k^2$</p> $\Leftrightarrow k^2 - 24 = h^2 + 65$ $\Leftrightarrow (k-h)(k+h) = 89 = 1.89$ $\Leftrightarrow \begin{cases} k+h=89 \\ k-h=1 \end{cases}$ <p>Vậy:</p> $n = 45^2 - 24 = 2001$	<p>0,5</p> <p>0,5</p> <p>0,5</p> <p>0,5</p>
Bài 3 (3,0đ)	<p>Nhận xét rằng với mọi x, y ta có:</p> $(x-y)^2 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 \geq 2xy$ $\Rightarrow 2(x^2 + y^2) \geq x^2 + y^2 + 2xy$ $\Rightarrow x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}$ <p>Đặt $\begin{cases} a + \frac{1}{a} = x \\ b + \frac{1}{b} = y \end{cases}$ ta được :</p> $\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 + \left(b + \frac{1}{b}\right)^2 \geq \frac{1}{2} \left(a + \frac{1}{a} + b + \frac{1}{b}\right)^2 = \frac{1}{2} \left(a + b + \frac{a+b}{ab}\right)^2 = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{ab}\right)^2$ <p>Vì $1 = (a+b)^2 \geq 4ab \Rightarrow ab \leq \frac{1}{4}$</p> $\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 + \left(b + \frac{1}{b}\right)^2 \geq \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{ab}\right)^2 \geq \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{\frac{1}{4}}\right)^2 = 12,5$ <p>Do đó :</p>	<p>0,5</p> <p>0,5</p> <p>0,75</p> <p>0,5</p> <p>0,75</p>

$$M = \frac{S_{BOC} + S_{COA} + S_{AOB}}{S_{ABC}} = \frac{S_{ABC}}{S_{ABC}} = 1$$

Từ đó tính được :

**PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN ĐÔNG SƠN**

**ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN
Môn: Toán 9**

Thời gian làm bài: 150 phút

Đề gồm 01 trang

Bài 1: Cho biểu thức: $A = \sqrt{\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) \cdot \frac{1}{x+y+2\sqrt{xy}} + \frac{2}{(\sqrt{x} + \sqrt{y})^3} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{y}}\right) \cdot \frac{\sqrt{x} - \sqrt{y}}{xy\sqrt{xy}}}$

a, Rút gọn biểu thức A.

b, Tính giá trị biểu thức A khi $x = 3 + \sqrt{5}$; $y = 3 - \sqrt{5}$

Bài 2: Cho 3 số a, b, c $\neq 0$ thỏa mãn: $a \neq b \neq c$ và $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$.

$$P = \frac{a-b}{c} + \frac{b-c}{a} + \frac{c-a}{b} ; \quad Q = \frac{c}{a-b} + \frac{a}{b-c} + \frac{b}{c-a}$$

Chứng minh rằng : $P \cdot Q = 9$.

Bài 3: Giải phương trình : $(4x - 1)\sqrt{x^2 + 1} = 2(x^2 + 1) + 2x - 1$.

Bài 4: Giải hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} x - y + \sqrt{x} = \sqrt{y} \\ x + y + 18\sqrt{xy} = 4\sqrt{x} + 3\sqrt{y} + 13 \end{cases}$$

Bài 5: Cho 3 số x, y, z thỏa mãn $x + y + z = 3$ và $x^4 + y^4 + z^4 = 3xyz$. Hãy tính giá trị của biểu thức $M = x^{2006} + y^{2006} + z^{2006}$

Bài 6: Cho Parabol (P) có phương trình $y = x^2$ và điểm A(3;0) ; Điểm M thuộc (P) có hoành độ a.

a) Xác định a để đoạn thẳng AM có độ dài ngắn nhất .

b) Chứng minh rằng khi AM ngắn nhất thì đường thẳng AM vuông góc với tiếp tuyến của (P) tại điểm M.

Bài 7: Tìm nghiệm nguyên của phương trình : $x^3 + x^2 + x + 1 = 2003^y$

Bài 8: Cho tam giác ABC vuông ở A. I là trung điểm của cạnh BC, D là một điểm bất kỳ trên cạnh BC. Đường trung trực của AD cắt các đường trung trực của AB, AC theo thứ tự tại E và F.

a) Chứng minh rằng: 5 điểm A, E, I, D, F cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh rằng: $AE \cdot AC = AF \cdot AB$.

c) Cho $AC = b$; $AB = c$. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của diện tích tam giác AEF theo b, c

Bài 9: Cho tam giác ABC cân tại A. Một điểm P di động trên BC. Qua P vẽ $PQ \parallel AC$ ($Q \in AB$) và $PR \parallel AB$ ($R \in AC$). Tìm quỹ tích các điểm D đối xứng với P qua QR.

**Hướng dẫn chấm thi học sinh giỏi lớp 9
Môn : Toán**

Bài	Lời giải	Biểu điểm
1	<p>a) ĐKXD : $x > 0 ; y > 0 ; x \neq y$</p> $A = \sqrt{\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) \cdot \frac{1}{x+y+2\sqrt{xy}} + \frac{2}{(\sqrt{x} + \sqrt{y})^3} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{y}}\right)} \cdot \frac{\sqrt{x} - \sqrt{y}}{xy\sqrt{xy}}$ $= \sqrt{\frac{x+y}{xy(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2} + \frac{2(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{(\sqrt{x} + \sqrt{y})^3 \cdot (\sqrt{x} \cdot \sqrt{y})}} \cdot \frac{xy\sqrt{xy}}{\sqrt{x} - \sqrt{y}}$ $= \sqrt{\frac{x+y+2\sqrt{xy}}{xy(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2}} \cdot \frac{xy\sqrt{xy}}{\sqrt{x} - \sqrt{y}}$ $= \frac{1}{\sqrt{xy}} \cdot \frac{xy\sqrt{xy}}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} = \frac{xy}{\sqrt{x} - \sqrt{y}}$ <p>b) Với $x = 3 + \sqrt{5}$ và $y = 3 - \sqrt{5}$ ta có : $x > y$ do đó</p> $A = \frac{xy}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} > 0$ $\text{Mà } A^2 = \frac{(xy)^2}{x+y-2\sqrt{xy}} = \frac{[(3+\sqrt{5}) \cdot (3-\sqrt{5})]^2}{(3+\sqrt{5}) + (3-\sqrt{5}) - 2\sqrt{3^2 - (\sqrt{5})^2}} = \frac{4^2}{6-2} = 8$ <p>Vậy : $A = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$</p>	<p>0,25</p> <p>0,75</p> <p>0,25</p> <p>0,75</p>
2	<p>Ta có : $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc \Leftrightarrow a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = 0$ $\Leftrightarrow (a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc) = 0$ (1)</p> <p>Mà $a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc = \frac{1}{2}[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2] \neq 0$ (Do $a \neq b \neq c$)</p> <p>Do đó: (1) $\Leftrightarrow a+b+c = 0 \Rightarrow a+b = -c ; a+c = -b ; b+c = -a$ (2)</p> <p>Mặt khác :</p> $P = \frac{a-b}{c} + \frac{b-c}{a} + \frac{c-a}{b} = \frac{ab(b-a) + bc(b-c) + ac(c-a)}{abc}$ $P = \frac{ab(a-b) + b^2c - bc^2 + ac^2 - a^2c}{abc} = \frac{(a-b)(b-c)(a-c)}{abc} \quad (3)$ <p>Hơn nữa :</p> <p>Đặt $\begin{cases} a-b = z \\ b-c = x \\ c-a = y \end{cases}$ Ta có $\begin{cases} x-y = a+b-2c = -3c \\ y-z = b+c-2a = -3a \\ z-x = a+c-2b = -3b \end{cases}$ (do (2))</p> <p>Vì thế :</p> $Q = \frac{c}{a-b} + \frac{a}{b-c} + \frac{b}{c-a} = -\frac{1}{3} \left(\frac{x-y}{z} + \frac{y-z}{x} + \frac{z-x}{y} \right)$ $= -\frac{1}{3} \cdot \frac{(x-y)(y-z)(x-z)}{xyz}$ <p>(Biến đổi tương tự rút gọn P)</p> $= -\frac{1}{3} \cdot \frac{(-3c)(-3a)[-(-3b)]}{(a-b)(b-c)(c-a)}$	<p>0,5</p> <p>0,5</p> <p>0,75</p>

	$= \frac{-9abc}{(a-b)(b-c)(c-a)} \quad (4)$ <p>Từ (3) và (4) ta có : P.Q=</p> <p>Vậy P.Q = 9</p>	0,25
3	$(4x-1)\sqrt{x^2+1} = 2(x^2+1)+2x-1 \quad (5)$ <p>Đặt $\sqrt{x^2+1} = y$ ($y \geq 1$) Ta có :</p> <p>(5) $\Leftrightarrow (4x-1).y = 2y^2 + 2x - 1$</p> <p>$\Leftrightarrow 2y^2 - 4xy + 2x + y - 1 = 0$</p> <p>$\Leftrightarrow (2y^2 - 4xy + 2y) - (y - 2x + 1) = 0$</p> <p>$\Leftrightarrow 2y(y - 2x + 1) - (y - 2x + 1) = 0$</p> <p>$\Leftrightarrow (y - 2x + 1)(2y - 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} y = 2x - 1 \\ y = \frac{1}{2} < 1 \text{ (loại)} \end{cases}$</p> <p>$\Leftrightarrow \sqrt{x^2+1} = 2x - 1$</p> <p>$\Leftrightarrow x^2 + 1 = 4x^2 - 4x + 1$</p> <p>$\Leftrightarrow x(3x - 4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \frac{4}{3} \end{cases}$</p>	0,25 1,0 0,75
4	<p>(I) $\begin{cases} x - y + \sqrt{x} = \sqrt{y} (a) \\ x + y + 18\sqrt{xy} = 4\sqrt{x} + 3\sqrt{y} + 13 (b) \end{cases} \quad (\text{ĐKXD} : x \geq 0; y \geq 0)$</p> <p>Ta có :</p> <p>(a) $\Leftrightarrow (\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y} + 1) = 0 \Leftrightarrow \sqrt{x} - \sqrt{y} = 0 \Leftrightarrow \sqrt{x} = \sqrt{y}$</p> <p>$\Leftrightarrow x = y$ thế vào (b) ta được :</p> <p>$2x + 18x = 4\sqrt{x} + 3\sqrt{x} + 13 \Leftrightarrow 20x - 7\sqrt{x} - 13 = 0 \quad (6)$</p> <p>Đặt $\sqrt{x} = t$ ($t \geq 0$) ta có :</p> <p>$(6) \Leftrightarrow 20t^2 - 7t - 13 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = \frac{-13}{20} < 0 \text{ (loại)} \end{cases}$</p> <p>$\Leftrightarrow \sqrt{x} = 1 \Leftrightarrow x = 1$</p> <p>Vậy hệ (I) có nghiệm duy nhất $(x, y) = (1, 1)$</p>	1,0 1,0
5	$\left. \begin{aligned} \frac{x^4 + y^4}{2} &\geq \sqrt{x^4 \cdot y^4} = x^2 y^2 \\ \frac{y^4 + z^4}{2} &\geq \sqrt{y^4 \cdot z^4} = y^2 z^2 \\ \frac{z^4 + x^4}{2} &\geq \sqrt{z^4 \cdot x^4} = x^2 z^2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow$ <p>Theo BĐT Cô si ta có :</p> <p>$\Rightarrow x^4 + y^4 + z^4 \geq x^2 y^2 + y^2 z^2 + x^2 z^2 \quad (7)$</p> <p>Mặt khác : $x^2 y^2 + y^2 z^2 + x^2 z^2 \geq xy^2 z + xyz^2 + x^2 yz$ (C/M tương tự quá trình trên)</p>	0,75

	$\Leftrightarrow x^2y^2 + y^2z^2 + x^2z^2 \geq xyz(x+y+z)$ $\Leftrightarrow x^2y^2 + y^2z^2 + x^2z^2 \geq 3xyz \quad (8) \quad (\text{do } x+y+z=3)$ <p>Do đó : $x^4 + y^4 + z^4 \geq 3xyz \quad (9)$</p> <p>Dấu “=” xảy ra</p> $\Leftrightarrow \begin{cases} x^4 = y^4; y^4 = z^4; z^4 = x^4 \\ x^2y^2 = y^2z^2; y^2z^2 = z^2x^2; z^2x^2 = x^2y^2 \end{cases} \Leftrightarrow x=y=z \quad (10)$ <p>Hơn nữa $x+y+z=3$</p> <p>Từ (10) và (11) $\Rightarrow 3x=3 \Rightarrow x=1 \Rightarrow y=z=1$</p> <p>$\Rightarrow x^{2006} + y^{2006} + z^{2006} = 1+1+1=3$</p> <p>Vậy : $M=3$</p>	<p>0,75</p> <p>0,5</p>
6	<p>a) Ta có : A (3; 0) và M(a; a²) do đó :</p> $AM^2 = (a-3)^2 + (a^2-0)^2 = a^4 + a^2 - 6a + 9$ $= (a^4 - 2a^2 + 1) + 3(a^2 - 2a + 1) + 5$ $= (a^2 - 1)^2 + 3(a-1)^2 + 5 \geq 5$ <p>$\Rightarrow AM \geq \sqrt{5}$</p> <p>$\Rightarrow \text{Min } AM = \sqrt{5}$ khi và chỉ khi $a=1$</p> <p>b) Theo câu a : AM có độ dài ngắn nhất $\Leftrightarrow a=1$, Khi đó M(1;1)</p> <p>Do đó phương trình đường thẳng AM là: $y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$ (do A(3;0)) (c)</p> <p>Gọi phương trình đường thẳng đi qua điểm M (1;1) và tiếp xúc với (P) tại điểm M là (d) : $y = ax + b$ ta có : $a \cdot 1 + b = 1 \quad (12)$</p> <p>(Do M(1;1) $\in$ (d))</p> <p>và phương trình : $x^2 = ax + b$ có nghiệm kép (13) (do (d) tiếp xúc với (P))</p> <p>Mà : $x^2 = ax + b \Leftrightarrow x^2 - (ax + b) = 0 \quad (14)$</p> <p>Phương trình (14) có $\Delta = (-a)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-b) = a^2 + 4b$</p> <p>Nên : (13) $\Leftrightarrow a^2 + 4b = 0 \quad (15)$</p> <p>Từ (12) và (15) ta có hệ phương trình:</p> $\begin{cases} a + b = 1 \\ a^2 + 4b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 + 4(1-a) = 0 \\ b = 1-a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = -1 \end{cases}$ <p>Vì thế phương trình đường thẳng đi qua điểm M(1;1) và tiếp xúc với (P) tại M là : $y = 2x - 1 \quad (d)$</p> <p>Từ (c) và (d) $\Rightarrow$ $\perp$ AM (do $-\frac{1}{2} \cdot 2 = -1$)</p> <p>Vậy : Khi AM ngắn nhất thì AM vuông góc với tiếp tuyến của (P) tại M</p>	<p>1.0</p> <p>0,25</p> <p>0,5</p> <p>0,25</p>
7	<p>+) Nhận thấy (0;0) là nghiệm nguyên của phương trình :</p> $x^3 + x^2 + x + 1 = 2003 \quad (16)$ <p>+) Với $y < 0$ ta có : $2003^y \notin \mathbb{Z}$ mà $x^3 + x^2 + x + 1 \in \mathbb{Z}$</p> <p>(Với $x \in \mathbb{Z}$) $\Rightarrow$ Phương trình (16) không có nghiệm nguyên thỏa mãn $y < 0$</p> <p>+) Với $y > 0$ ta có :</p> <p>(16) $\Leftrightarrow (x+1)(x^2+1) = 2003^y \quad (*)$</p> <p>Từ (*) $\Rightarrow x+1 > 0$ (do $x^2+1 > 0$ và $2003^y > 0$)</p> <p>Đặt ƯCLN $(x+1; x^2+1) = d$ ta có :</p> <p>$(x+1) \vdots d$ và $(x^2+1) \vdots d \Rightarrow [x^2+1 + (x+1)(1-x)] \vdots d$</p>	<p>0,5</p> <p>0,25</p>

<p> $\Leftrightarrow 2:d$ $\left. \begin{array}{l} \text{Hơn nữa } d \mid 2003^y \Rightarrow 2003^y : d \Rightarrow d=1 \quad (**) \\ \text{Mặt khác : } 2003 \text{ là số nguyên tố ,nên các ước của } 2003^y \text{ chỉ có thể là } 1 \text{ hoặc } 2003^m \text{ (} m \in \mathbb{N}^* \text{)} \quad (***) \end{array} \right\} \Rightarrow d=1 \quad (**)$ </p> <p> Từ (*) , (**) và (***) $\Rightarrow \begin{cases} x+1=1 \\ x^2+1=1 \end{cases} \Rightarrow x=0 \Rightarrow y=0 \text{ (loại)}$ $\Rightarrow$ phương trình (16) cũng không có nghiệm nguyên thỏa mãn $y > 0$ Vậy : Phương trình có nghiệm nguyên duy nhất (0; 0) </p>	<p>1,0 0,25</p>
<p>8 a) Ta có : E là giao điểm của 2 đường trung trực của 2 cạnh AD,AB Nên E là tâm đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABD$. Tương tự ta có: F là tâm đường tròn ngoại tiếp $\triangle ACD$ Do đó :</p> <p> $\widehat{AED} = \frac{1}{2} \widehat{ABD} \Rightarrow \widehat{AED} = 2 \widehat{B}$ $\widehat{AFD} = \frac{1}{2} \widehat{ACD} \Rightarrow \widehat{AFD} = 2 \widehat{C}$ $\Rightarrow \widehat{AED} + \widehat{AFD} = 2(\widehat{B} + \widehat{C}) = 180^\circ \Rightarrow AEDF$ Nội tiếp (17) </p> <p> Lại có : $AI = \frac{1}{2} BC = BI \Rightarrow \triangle ABC$ cân tại I $\Rightarrow \widehat{BAI} = \widehat{B} \Rightarrow \widehat{AID} = 2 \widehat{B} \Rightarrow \widehat{AID} + \widehat{AFD} = 180^\circ$ $\Rightarrow$ Tứ Giác AIDF nội tiếp (18) </p> <p> Từ (17) ; (18) $\Rightarrow$ 5 điểm A , E , I , D , F cùng thuộc đường tròn b)Ta có EF là đường trung trực của AD nên : AE = ED ; FA =FD </p> <p> $\Rightarrow \triangle AEF = \triangle DEF$ (c. c. c) $\Rightarrow \widehat{AEF} = \widehat{DEF} = \frac{1}{2} \widehat{AED} = \frac{1}{2} \cdot 2 \widehat{B} = \widehat{B}$ +) Tương tự $\widehat{AEF} = \widehat{C}$ Suy ra $\triangle AEF \sim \triangle ABC$ (g.g) $\frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AC} \Rightarrow AE.AC = AF.AB$ </p> <p> c) Theo câu b) Ta có : $\triangle AEF \sim \triangle ABC$ $\frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AC} = k$ $\Rightarrow AE = kc ; AF = kb$. Ta có : $\triangle AEF$ vuông tại A (do $\triangle ABC$ vuông tại A và $\triangle AEF \sim \triangle ABC$) Nên diện tích $\triangle AEF$ là $S = \frac{1}{2} AE.AF \Rightarrow 2S = k^2 bc$ (19) </p>	<p>0,5 0,5 0,5</p>

	<p>Mặt khác $S = \frac{1}{2} AM.EF \Leftrightarrow 2S = AM . EF \Leftrightarrow 4S^2 = AM^2 . EF^2$</p> <p>$\Leftrightarrow 4S^2 = \left(\frac{AD}{2}\right)^2 . (k^2b^2 + k^2c^2)$ (20)</p> <p>Từ (19) và (20) $\Rightarrow 2S = \frac{AD^2}{4} \cdot \frac{b^2 + c^2}{bc} \Rightarrow S = \frac{b^2 + c^2}{8bc} . AD^2$ (21)</p> <p>Do đó : S nhỏ nhất $\Leftrightarrow AD$ nhỏ nhất</p> <p>Mà $AD \geq AH$ ($AH \perp BC$, $H \in BC$)</p> <p>Lại có $AH = \frac{AB.AC}{BC} = \frac{bc}{\sqrt{b^2 + c^2}} \Rightarrow AD \geq \frac{bc}{\sqrt{b^2 + c^2}}$ (22)</p> <p>Từ (21) ; (22) $\Rightarrow S \geq \frac{b^2 + c^2}{8bc} \cdot \frac{(bc)^2}{b^2 + c^2} = \frac{bc}{8}$</p> <p>Vậy Min $S = \frac{bc}{8}$ (Khi $D \equiv H$)</p>	
9	<p>a) Phần thuận</p> <p>Giả sử D là điểm đối xứng với P qua QR ta có :</p> <p>* $QP = QB = QD \Rightarrow P, B, D$ thuộc đường tròn (Q)</p> <p>$\Rightarrow \widehat{BDP} = \widehat{BQP} = \frac{1}{2} \widehat{BAC}$ (23)</p> <p>* Tương tự : $\widehat{CDP} = \frac{1}{2} \widehat{BAC}$ (24)</p> <p>Từ (23) ; (24) $\Rightarrow \widehat{BDC} = \widehat{BAC}$</p> <p>$\Rightarrow$ điểm D thuộc cung BAC (Của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC)</p> <p>b) Phần đảo</p> <p>Lấy điểm D' thuộc cung BAC ($D' \neq B, C$) , Gọi Q' là giao điểm của AB với đường trung trực của D'B ; qua Q' kẻ $Q'P' \parallel AC$ qua P' kẻ $P'R' \parallel AB$ ta có Q'R' là đường trung trực của D'P'</p> <p>Vậy quỹ tích các điểm D là cung BAC của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC (trừ 2 điểm B,C)</p>	<p>1,0</p> <p>1,0</p>

PHÒNG GD-ĐT CAM LỘ

KÌ THI HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA

ĐỀ THI MÔN: TOÁN

Thời gian làm bài: 120 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu 1:(1 điểm)

Phân tích đa thức sau thành nhân tử : $x^4 + 2009x^2 + 2008x + 2009$

Câu 2:(1 điểm)

Giải phương trình sau:

$$\frac{x+2}{13} + \frac{2x+45}{15} = \frac{3x+8}{37} + \frac{4x+69}{9}$$

Câu 3: (2 điểm)

a/ Chứng minh rằng $\frac{a^4+b^4}{2} \geq ab^3+a^3b-a^2b^2$
 b/ Cho hai số dương a,b và $a=5-b$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của tổng $P = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$

Câu 4: (2 điểm)

a/ Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn điều kiện :

$$a^{2006} + b^{2006} = a^{2007} + b^{2007} = a^{2008} + b^{2008}$$

Hãy tính tổng: $S = a^{2009} + b^{2009}$

$$\frac{2\sqrt{3+\sqrt{5-\sqrt{13+\sqrt{48}}}}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}}$$

b/ Chứng minh rằng : $A = \frac{2\sqrt{3+\sqrt{5-\sqrt{13+\sqrt{48}}}}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}}$ là số nguyên

Câu 5: (1 điểm) Tìm các số nguyên dương x,y thỏa mãn phương trình sau:

$$xy-2x-3y+1=0$$

Câu 6: (3 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A có cạnh $AC > AB$, đường cao AH (H thuộc BC). Trên tia HC lấy điểm D sao cho $HD=HA$. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E.

a) Chứng minh hai tam giác BEC và ADC đồng dạng

b) Chứng minh tam giác ABE cân.

c) Gọi M là trung điểm của BE và vẽ tia AM cắt BC tại G. Chứng minh rằng:

$$\frac{GB}{BC} = \frac{HD}{AH+HC}$$

PHÒNG GD-ĐT CAM LỘ

KÌ THI HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TOÁN

ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu 1: (1 điểm)

$$\begin{aligned} & x^4 + 2009x^2 + 2008x + 2009 \\ &= (x^4 + x^2 + 1) + 2008(x^2 + x + 1) && 0,25 \text{ đ} \\ &= (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1) + 2008(x^2 + x + 1) && 0,5 \text{ đ} \\ &= (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 2009) && 0,25 \text{ đ} \end{aligned}$$

Câu 2: (1 điểm)

$$\frac{x+2}{13} + \frac{2x+45}{15} = \frac{3x+8}{37} + \frac{4x+69}{9}$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{x+2}{13} + 1 \right) + \left(\frac{2x+45}{15} - 1 \right) = \left(\frac{3x+8}{37} + 1 \right) + \left(\frac{4x+69}{9} - 1 \right) \quad 0,25đ$$

$$\Leftrightarrow \frac{x+15}{13} + \frac{2(x+15)}{15} = \frac{3(x+15)}{37} + \frac{4(x+15)}{9} \quad 0,25đ$$

$$\Leftrightarrow (1-a)(1-b)=0 \quad 0,25 đ$$

$$\Leftrightarrow x=-15 \quad 0,25 đ$$

Câu 3: (2 điểm)

a/ (1 điểm)

$$\frac{a^4+b^4}{2} \geq ab^3+a^3b-a^2b^2$$

$$\Leftrightarrow a^4+b^4 \geq 2ab^3+2a^3b-2a^2b^2 \quad 0,25 đ$$

$$\Leftrightarrow a^4+b^4 - 2ab^3-2a^3b+2a^2b^2 \geq 0 \quad 0,25 đ$$

$$\Leftrightarrow (a^4-2a^3b+a^2b^2)+(b^4-2ab^3+a^2b^2) \quad 0,25 đ$$

$$\Leftrightarrow (a^2-ab)^2+(b^2-ab)^2 \geq 0 \quad 0,25 đ$$

b/ (1 điểm)

$$P = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{a+b}{ab} = \frac{5}{ab} \quad 0,25 đ$$

$$P = \frac{20}{4ab} \geq \frac{20}{(a+b)^2} = \frac{4}{5} \quad 0,5 đ$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của P là $\frac{4}{5}$ khi $a=b=\frac{5}{2}$ 0,25 đ

Câu 4 (2 điểm)

a/ (1 điểm)

$$\text{Ta có: } a^{2008}+b^{2008} = (a^{2007}+b^{2007})(a+b)-ab(a^{2006}+b^{2006}) \quad 0,25 đ$$

$$\Leftrightarrow 1 = a+b-ab \quad 0,25 đ$$

$$\Leftrightarrow (1-a)(1-b)=0 \quad 0,25 đ$$

$$\Rightarrow a=1, b=1$$

Vậy $S=1+1=2$

b/ (1 điểm)

$$A = \frac{2\sqrt{3+\sqrt{5-\sqrt{13+\sqrt{48}}}}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}}$$

$$A = \frac{2\sqrt{3+\sqrt{5-\sqrt{(2\sqrt{3}+1)^2}}}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}}$$

$$= \frac{2\sqrt{3+\sqrt{(\sqrt{3}-1)^2}}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}}$$

$$= \frac{2\sqrt{2+\sqrt{3}}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{(\sqrt{6}+\sqrt{2})^2}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}}$$

$$= 1 \in \mathbb{Z}$$

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

Câu 5 (1 điểm)

$$xy-2x-3y+1=0$$

$$\Rightarrow xy-3y=2x-1$$

$$\Rightarrow y(x-3)=2x-1$$

0,25 đ

Ta thấy $x=3$ không thỏa mãn, với $x \neq 3$ thì

$$y = 2 + \frac{5}{x-3}$$

0,25 đ

Để y nguyên thì $x-3$ phải là ước của 5

0,25 đ

Suy ra: (x,y) là $(4,7); (8,3)$

0,25 đ

Câu 6 (3 điểm)

a) (1đ điểm)

Tam giác ADC và tam giác BEC:

$$\frac{CD}{CE} = \frac{CA}{CB}$$

(vì hai tam giác CDE và CAB đồng dạng)

Góc C: chung

0,75 đ

Suy ra: Tam giác ADC đồng dạng với tam giác BEC (c-g-c)

0,25 đ

b)(1 điểm) Theo câu ta suy ra: $\angle BEC = \angle ADC$


$$\text{có: } \angle ADC = \angle EDC + \angle ADE = 135^\circ$$

$$\text{Suy ra: } \angle BEC = 135^\circ$$

0,5 đ

$$\text{Suy ra: } \angle AEB = 45^\circ$$

0,25 đ



Do đó: Tam giác ABE cân(tam giác vuông có một góc bằng 45°) 0,25 đ

c)(1 điểm)

Tam giác ABE cân tại E nên AM còn là phân giác của góc BAC

Suy ra: $\frac{GB}{GC} = \frac{AB}{AC}$, mà $\frac{AB}{AC} = \frac{ED}{DC} (\Delta ABC \sim \Delta DEC) = \frac{AH}{HC} (ED \parallel AH) = \frac{HD}{HC}$ 0,5 đ

Do đó: $\frac{GB}{GC} = \frac{HD}{HC} \Rightarrow \frac{GB}{GB+GC} = \frac{HD}{HD+HC} \Rightarrow \frac{GB}{BC} = \frac{HD}{AH+HC}$ 0,5 đ

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9

Môn: Toán

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề thi gồm có: 01 trang

ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu 1: (6 điểm)

$$M = \left(1 - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}}\right) : \left(\frac{\sqrt{x+3}}{\sqrt{x-2}} + \frac{\sqrt{x+2}}{3-\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x+2}}{x-5\sqrt{x+6}}\right)$$

a) Cho

1. Rút gọn M

2. Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức M nhận giá trị là số nguyên

b) Tính giá trị của biểu thức P

$$P = 3x^{2013} + 5x^{2011} + 2006 \quad \text{với} \quad x = \sqrt{6+2\sqrt{2}} \cdot \sqrt{3-\sqrt{2+2\sqrt{3}+\sqrt{18-8\sqrt{2}}}} - \sqrt{3}$$

Câu 2: (4 điểm) Giải phương trình

a) $(x+3)(x+4)(x+5)(x+6) = 24$

b) $|2x - x^2 - 1| = 2x - x^2 - 1$

Câu 3: (4 điểm)

a/ Cho hai số dương x, y thỏa mãn $x + y = 1$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $M = \left(x^2 + \frac{1}{y^2}\right) \left(y^2 + \frac{1}{x^2}\right)$

b/ Cho x, y, z là các số dương thỏa mãn $\frac{1}{x+y} + \frac{1}{y+z} + \frac{1}{z+x} = 6$.

Chứng minh rằng: $\frac{1}{3x+3y+2z} + \frac{1}{3x+2y+3z} + \frac{1}{2x+3y+3z} \leq \frac{3}{2}$.

Câu 4: (5 điểm)

Cho đường tròn (O; R) và hai đường kính AB và CD sao cho tiếp tuyến tại A của đường tròn (O; R) cắt các đường thẳng BC và BD tại hai điểm tương ứng là E và F. Gọi P và Q lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AE và AF.

1. Chứng minh rằng trực tâm H của tam giác BPQ là trung điểm của đoạn thẳng OA.

2. Gọi α là số đo của góc BFE. Hai đường kính AB và CD thỏa mãn điều kiện gì thì biểu

thức $P = \sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha$. Đạt giá trị nhỏ nhất? tìm giá trị nhỏ nhất đó.

3. Chứng minh các hệ thức sau: $CE \cdot DF \cdot EF = CD^3$ và $\frac{BE^3}{BF^3} = \frac{CE}{DF}$.

Câu 5: (1 điểm)

Tìm $n \in \mathbb{N}^*$ sao cho: $n^4 + n^3 + 1$ là số chính phương.

- Hết -

Lưu ý: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI

HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9

Môn: Toán

Câu 1: (6 điểm)

a) (4,5đ)

ĐKXD: $x \geq 0; x \neq 4; x \neq 9$ (*)

1) Rút gọn M : Với $x \geq 0; x \neq 4; x \neq 9$

(0,5đ)

$$\begin{aligned} M &= \left(\frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{\sqrt{x+1}} \right) : \left[\frac{\sqrt{x+3}}{\sqrt{x-2}} - \frac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{x-3}} + \frac{\sqrt{x+2}}{(\sqrt{x-2})(\sqrt{x-3})} \right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{x+1}} : \left[\frac{(\sqrt{x+3})(\sqrt{x-3}) - (\sqrt{x-2})(\sqrt{x+2}) + (\sqrt{x+2})}{(\sqrt{x-2})(\sqrt{x-3})} \right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{x+1}} : \frac{x-9 - (x-4) + \sqrt{x+2}}{(\sqrt{x-2})(\sqrt{x-3})} \\ &= \frac{\sqrt{x-2}}{\sqrt{x+1}} \end{aligned}$$

Vậy $M = \frac{\sqrt{x-2}}{\sqrt{x+1}}$ (với $x \geq 0; x \neq 4; x \neq 9$) (*)

(2,5đ)

2) $M = \frac{\sqrt{x-2}}{\sqrt{x+1}} = \frac{\sqrt{x+1}-3}{\sqrt{x+1}} = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x+1}} - \frac{3}{\sqrt{x+1}} = 1 - \frac{3}{\sqrt{x+1}}$

(0,75đ)

Biểu thức M có giá trị nguyên khi và chỉ khi: $3 : \sqrt{x+1} \Leftrightarrow \sqrt{x+1} \in U(3)$

$U(3) \in \{\pm 1; \pm 3\}$ Vì $x \geq 0 \Rightarrow \sqrt{x} \geq 0 \Rightarrow \sqrt{x+1} \geq 1$

Nên $\sqrt{x+1} \in \{1; 3\}$ xảy ra các trường hợp sau:

(0,5đ)

$\sqrt{x+1} = 1 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (TMĐK (*))

$\sqrt{x+1} = 3 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 2 \Leftrightarrow x = 4$ (không TMĐK (*) loại)

(0,25đ)

Vậy $x = 0$ thì M nhận giá trị nguyên.

b_

$$x = \sqrt{6+2\sqrt{2} \cdot \sqrt{3-\sqrt{\sqrt{2+2\sqrt{3}+\sqrt{18-8\sqrt{2}}}-\sqrt{3}}}}$$

$$\text{Có } \sqrt{18-8\sqrt{2}} = \sqrt{(4-\sqrt{2})^2} = |4-\sqrt{2}| = 4-\sqrt{2} \quad (0,5đ)$$

$$\sqrt{\sqrt{2+2\sqrt{3}+4}-\sqrt{2}} = \sqrt{2\sqrt{3}+4} = \sqrt{(\sqrt{3}+1)^2} = |\sqrt{3}+1| \quad (0,25đ)$$

$$x = \sqrt{6+2\sqrt{2} \cdot \sqrt{3-\sqrt{3}-1}} - \sqrt{3} = \sqrt{6+2\sqrt{2} \cdot \sqrt{2-\sqrt{3}}} - \sqrt{3} = \sqrt{6+2\sqrt{4-2\sqrt{3}}} - \sqrt{3}$$

$$x = \sqrt{6+2\sqrt{(\sqrt{3}-1)^2}} - \sqrt{3} = \sqrt{6+2\sqrt{3}-1} - \sqrt{3} = \sqrt{4+2\sqrt{3}} - \sqrt{3}$$

$$x = \sqrt{(\sqrt{3}+1)^2} - \sqrt{3} = |\sqrt{3}+1| - \sqrt{3} = \sqrt{3}+1-\sqrt{3}=1 \quad (0,75đ)$$

Với $x = 1$. Ta có $P = 3 \cdot 1^{2013} + 5 \cdot 1^{2011} + 2006 = 3 + 5 + 2006 = 2014$

Vậy với $x = 1$ thì $P = 2014$

Câu 2: (4 điểm)

$$\text{a. } (x+3)(x+6)(x+4)(x+5)=24 \quad 0,25 \text{ đ}$$

$$\Leftrightarrow (x^2+9x+18)(x^2+9x+20)=24 \quad (1) \quad 0,25 \text{ đ}$$

$$\text{Đặt } x^2+9x+19=y \quad 0,5 \text{ đ}$$

$$(1) \Leftrightarrow (y+1)(y-1)-24=0 \quad 0,25 \text{ đ}$$

$$\Leftrightarrow y^2-25=0 \quad 0,5 \text{ đ}$$

$$\Leftrightarrow (x^2+9x+24)(x^2+9x+14)=0 \quad 0,5 \text{ đ}$$

$$\Leftrightarrow (x+2)(x+7)(x^2+9x+24)=0$$

$$\text{Chứng tỏ } x^2+9x+24>0 \quad 0,25 \text{ đ}$$

$$\text{Vậy nghiệm của phương trình : } x=-2; x=-7 \quad 0,25 \text{ đ}$$

$$\text{b. Ta có } 2x-x^2-1=-(x^2-2x+1)=-(x-1)^2<0 \quad 0,5 \text{ đ}$$

$$\text{pt trở thành : } 2x-x^2-1=x^2-2x+1$$

$$\Leftrightarrow x=1$$

Câu 3: (4 điểm)

a Cho hai số dương thỏa mãn: $x+y=1$. 2đ

$$\text{Tìm GTNN của biểu thức: } M = \left(x^2 + \frac{1}{y^2}\right) \left(y^2 + \frac{1}{x^2}\right)$$

$$M = \left(x^2 + \frac{1}{y^2}\right) \left(y^2 + \frac{1}{x^2}\right) = x^2 y^2 + 1 + 1 + \frac{1}{x^2 y^2} = \frac{x^4 y^4 + 2x^2 y^2 + 1}{x^2 y^2}$$

$$= \frac{(x^2 y^2 + 1)^2}{x^2 y^2} = \left(\frac{x^2 y^2 + 1}{xy}\right)^2 = \left(xy + \frac{1}{xy}\right)^2 \quad 0,5$$

Ta có: $xy + \frac{1}{xy} = \left(xy + \frac{1}{16xy}\right) + \frac{15}{16xy}$

* Ta có: $xy + \frac{1}{16xy} \geq 2\sqrt{xy \cdot \frac{1}{16xy}} = 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ (1) * 0,5

$\sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2} = \frac{1}{2} \Rightarrow xy \leq \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{1}{xy} \geq 4 \Rightarrow \frac{1}{16xy} \geq \frac{4}{16} = \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{15}{16xy} \geq \frac{15}{4}$ (2) 0,25

Từ (1) và (2) $\Rightarrow \left(xy + \frac{1}{xy}\right) = \left(xy + \frac{1}{16xy}\right) + \frac{15}{16xy} \geq \frac{1}{2} + \frac{15}{4} = \frac{17}{4}$ 0,25

Vậy $M = \left(xy + \frac{1}{xy}\right)^2 \geq \left(\frac{17}{4}\right)^2 = \frac{289}{16}$

Dấu “=” xảy ra $\Leftrightarrow \begin{cases} xy = \frac{1}{16xy} \\ x = y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} xy = \frac{1}{4} \\ x = y \end{cases} \Leftrightarrow x = y = \frac{1}{2}$ (Vì $x, y > 0$) 0,5

Vậy min $M = \frac{289}{16}$ tại $x = y = \frac{1}{2}$

b

Cho x, y là các số dương thỏa mãn: $\frac{1}{x+y} + \frac{1}{y+z} + \frac{1}{z+x} = 6$ 2d

Chứng minh rằng: $\frac{1}{3x+3y+2z} + \frac{1}{3x+2y+3z} + \frac{1}{2x+3y+3z} \leq \frac{3}{2}$

Áp dụng BĐT $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{4}{a+b}$ (với $a, b > 0$) 0,5

$\Rightarrow \frac{1}{a+b} \leq \frac{1}{4} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)$

Ta có: $\frac{1}{3x+3y+2z} = \frac{1}{(2x+y+z) + (x+2y+z)} \leq \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2x+y+z} + \frac{1}{x+2y+z} \right)$

$\leq \frac{1}{4} \left[\frac{1}{(x+y) + (x+z)} + \frac{1}{(x+y) + (y+z)} \right] \leq \frac{1}{4} \left[\frac{1}{4} \left(\frac{1}{x+y} + \frac{1}{x+z} + \frac{1}{x+y} + \frac{1}{y+z} \right) \right]$ 0,5


$\leq \frac{1}{16} \left(\frac{2}{x+y} + \frac{1}{x+z} + \frac{1}{y+z} \right)$

Tương tự: $\frac{1}{3x+2y+3z} \leq \frac{1}{16} \left(\frac{2}{x+z} + \frac{1}{x+y} + \frac{1}{y+z} \right)$

$\frac{1}{2x+3y+3z} \leq \frac{1}{16} \left(\frac{2}{y+z} + \frac{1}{x+y} + \frac{1}{x+z} \right)$ 0,5

$$\begin{aligned} \frac{1}{3x+3y+2z} + \frac{1}{3x+2y+3z} + \frac{1}{2x+3y+3z} &\leq \frac{1}{16} \left(\frac{4}{x+y} + \frac{4}{x+z} + \frac{4}{y+z} \right) \\ &\leq \frac{4}{16} \left(\frac{1}{x+y} + \frac{1}{x+z} + \frac{1}{y+z} \right) = \frac{1}{4} \cdot 6 = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Caai 4: (5 điểm)



0,75d.

$$\frac{AE}{AB} = \frac{AB}{AF} \Rightarrow \frac{AE}{\frac{1}{2}AB} = \frac{AB}{\frac{1}{2}AF} \Rightarrow \frac{AE}{OA} = \frac{AB}{AQ}$$

Vậy $\Delta AEO \cong \Delta ABQ$ (c.g.c). Suy ra $\widehat{ABQ} = \widehat{AEO}$ mà $\widehat{ABQ} = \widehat{P_1}$ (góc có các cạnh tương ứng vuông góc) nên $\widehat{AEO} = \widehat{P_1}$, mà hai góc đồng vị $\Rightarrow PH \parallel OE$.

2. Ta cã:

0,75đ.

$$P = \sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha = (\sin^2 \alpha)^3 + (\cos^2 \alpha)^3$$

$$P = (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) [\sin^4 \alpha - \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha + \cos^4 \alpha]$$

$$P = (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^2 - 3 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha = 1 - 3 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha$$

Ta cã:

$$\left(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha\right)^2 \geq 4 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha \Leftrightarrow 1 \geq 4 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha \Leftrightarrow \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha \leq \frac{1}{4}$$

0,25đ

$$P = 1 - 3 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha \geq 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

0,25đ

Do ②: $P_{\min} = \frac{1}{4}$ khi và chỉ khi: $\sin^2 \alpha = \cos^2 \alpha \Leftrightarrow \sin \alpha = \cos \alpha$ (vì α là góc nhọn) $\Leftrightarrow \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = 1 \Leftrightarrow \tan \alpha = 1 \Leftrightarrow \alpha = 45^\circ$ 0,25đ
 Khi đó CD vuông góc với AB 0,25đ

3. Ta có $\triangle ACB$ và $\triangle ADB$ nội tiếp đường tròn (O) có AB là đường kính nên $\angle ACB = \angle ADB = 90^\circ \Rightarrow ADBC$ là hình chữ nhật. 0,25đ
 Ta có: $CD^2 = AB^2 = AE \cdot AF \Rightarrow CD^4 = AB^4 = AE^2 \cdot AF^2$
 $= (EC \cdot EB)(DF \cdot BF) = (EC \cdot DF)(EB \cdot BF) = EC \cdot DF \cdot AB \cdot EF$
 $\Rightarrow AB^3 = CE \cdot DF \cdot EF$. Vậy $CD^3 = CE \cdot DF \cdot EF$

Ta có:

$$\frac{BE^2}{BF^2} = \frac{EA \cdot EF}{FA \cdot EF} = \frac{AE}{AF} \Rightarrow \frac{BE^4}{BF^4} = \frac{AE^2}{AF^2} = \frac{CE \cdot BE}{DF \cdot BF} \Rightarrow \frac{BE^3}{BF^3} = \frac{CE}{DF}$$

Câu 5: Giả sử $n^4 + n^3 + 1$ là số chính phương vì $n^4 + n^3 + 1 > n^4 = (n^2)^2$

$$\rightarrow n^4 + n^3 + 1 = (n^2 + K)^2 = n^4 + 2Kn^2 + K^2 \quad (K \in \mathbb{N}^+)$$

$$\rightarrow n^3 - 2Kn^2 = K^2 - 1 \rightarrow n^2(n - 2K) = K^2 - 1 \geq 0$$

$$\text{Mà } K^2 - 1 : n^2 \rightarrow K^2 = 1 \text{ hoặc } n^2 \leq K^2 - 1$$

$$\text{Nếu } K^2 = 1 \rightarrow K = 1 \rightarrow n^2(n - 2) = 0 \rightarrow n = 2$$

$$\text{Thử lại } 2^4 + 2^3 + 1 = 5^2 \quad (\text{thỏa mãn})$$

$$\text{Khi } K > 1 \rightarrow K^2 > K^2 - 1 \geq n^2 \rightarrow K > n$$

$$\rightarrow n - 2K < 0 \quad \text{mâu thuẫn với điều kiện } n^2(n - 2K) = K^2 - 1 \geq 0 \quad (1đ)$$

Vậy $n = 2$

PHÒNG GD&ĐT



KÌ THI HỌC SINH GIỎI

Môn: TOÁN

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

ĐỀ RA

Câu 1 (2.0 điểm). Cho biểu thức:

$$P = \left(\frac{\sqrt{a} + 1}{\sqrt{a} - 1} - \frac{\sqrt{a} - 1}{\sqrt{a} + 1} + 4\sqrt{a} \right) \left(\sqrt{a} - \frac{1}{\sqrt{a}} \right)$$

a) Rút gọn P .

$$\text{b) Tính giá trị của } P \text{ tại } a = (2 + \sqrt{3})(\sqrt{3} - 1)\sqrt{2 - \sqrt{3}}.$$

Câu 2 (1.5 điểm). Giải phương trình: $\sqrt{x - 2\sqrt{x - 1}} - \sqrt{x - 1} = 1.$

Câu 3 (2.5 điểm). Cho x, y là các số dương.

$$\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2$$

a) Chứng minh: $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2$.

$$M = \frac{x}{y} + \frac{y}{x} + \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Câu 4 (3.0 điểm). Cho điểm M nằm trên nửa đường tròn tâm O đường kính $AB = 2R$ (M không trùng với A và B). Trong nửa mặt phẳng chứa nửa đường tròn có bờ là đường thẳng AB , kẻ tiếp tuyến Ax . Đường thẳng BM cắt Ax tại I ; tia phân giác của $\angle HAM$ cắt nửa đường tròn O tại E , cắt IB tại F ; đường thẳng BE cắt AI tại H , cắt AM tại K .

a) Chứng minh 4 điểm F, E, K, M cùng nằm trên một đường tròn.

b) Chứng minh $HF \perp BI$.

c) Xác định vị trí của M trên nửa đường tròn O để chu vi $\triangle AMB$ đạt giá trị lớn nhất và tìm giá trị đó theo R ?

Câu 5 (1.0 điểm). Tìm các số tự nhiên x, y biết rằng:

$$(2^x + 1)(2^x + 2)(2^x + 3)(2^x + 4) - 5^y = 11879$$

----- Hết -----

***Ghi chú:** Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

PHÒNG GD&ĐT

KÌ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9

Môn: TOÁN

ĐÁP ÁN,

CÂU	NỘI DUNG	ĐIỂM
1	$\begin{cases} a \geq 0 \\ \sqrt{a} \neq 1 \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ a \neq 1 \end{cases} \\ \sqrt{a} \neq 0 \end{cases}$ <p>Điều kiện</p>	0.25
a	$P = \frac{(\sqrt{a} + 1)^2 - (\sqrt{a} - 1)^2 + 4\sqrt{a}(a - 1)}{a - 1} \cdot \frac{a - 1}{\sqrt{a}}$	0.25
	$= \frac{4\sqrt{a} + 4\sqrt{a}(a - 1)}{\sqrt{a}} = \frac{4\sqrt{a}(1 + a - 1)}{\sqrt{a}} = 4a$	0.25
	Vậy $P = 4a$	0.25
b	$a = \sqrt{(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3})(2 + \sqrt{3})} \cdot (\sqrt{3} - 1)$	0.25
	$= \sqrt{(2 + \sqrt{3})} \cdot (\sqrt{3} - 1) = \sqrt{(2 + \sqrt{3})(\sqrt{3} - 1)^2} = \sqrt{(2 + \sqrt{3})(4 - 2\sqrt{3})}$	0.25

		$= \sqrt{2(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})} = \sqrt{2}$	0.25
		Vậy $a = \sqrt{2}$ do đó $P = 4a = 4\sqrt{2}$	0.25
2		Điều kiện $x \geq 1$	0.25
		$\sqrt{x-2}\sqrt{x-1} - \sqrt{x-1} = 1 \Leftrightarrow \sqrt{(\sqrt{x-1}-1)^2} - \sqrt{x-1} = 1$ $\Leftrightarrow \sqrt{x-1}-1 - \sqrt{x-1} = 1$ (1)	0.5
		Khi $\sqrt{x-1} \geq 1 \Leftrightarrow x-1 \geq 1 \Leftrightarrow x \geq 2$: Ta có (1) $\Leftrightarrow \sqrt{x-1}-1 - \sqrt{x-1} = 1$. Phương trình vô nghiệm	0.25
		Khi $0 \leq \sqrt{x-1} < 1 \Leftrightarrow 0 \leq x-1 < 1 \Leftrightarrow 1 \leq x < 2$: Ta có (1) $\Leftrightarrow (1) \Leftrightarrow 1 - \sqrt{x-1} - \sqrt{x-1} = 1 \Leftrightarrow -2\sqrt{x-1} = 0 \Leftrightarrow x = 1$	0.25
		Vậy $x = 1$ là nghiệm của phương trình đã cho.	0.25
3	a	$\frac{x}{y} > 0 \quad \frac{y}{x} > 0$ Vì $x > 0, y > 0$ nên $\frac{x}{y}$ và $\frac{y}{x}$	0.25
		Áp dụng bất đẳng thức $a+b \geq 2\sqrt{ab}$ dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow a=b$	0.25
		ta có $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2\sqrt{\frac{x}{y} \cdot \frac{y}{x}} = 2$	0.25
		Vậy $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2$	0.25
		Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow \frac{x}{y} = \frac{y}{x} \Leftrightarrow x^2 = y^2 \Leftrightarrow x = y$ (vì $x > 0, y > 0$)	0.25
	b	Đặt $a = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$, ta có $M = a + \frac{1}{a} = \frac{3a}{4} + \frac{a}{4} + \frac{1}{a}$	0.25
		Vì $a = \frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2$ nên $\frac{3a}{4} \geq \frac{3}{2}$;	0.25
		Ta có $\frac{a}{4} + \frac{1}{a} \geq 2\sqrt{\frac{a}{4} \cdot \frac{1}{a}} = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$	0.25
		Do đó $M = a + \frac{1}{a} = \frac{3a}{4} + \frac{a}{4} + \frac{1}{a} \geq \frac{3}{2} + 1 = \frac{5}{2}$; $M = \frac{5}{2} \Leftrightarrow a = 2 \Leftrightarrow x = y$	0.25
		Vậy giá trị nhỏ nhất của M bằng $\frac{5}{2}$ khi và chỉ khi $x = y$.	0.25

	Hình vẽ	
a	Ta có M, E nằm trên nửa đường tròn đường kính AB nên $\angle FMK = 90^\circ$ và $\angle FEK = 90^\circ$. Vậy 4 điểm F, E, K, M cùng nằm trên đường tròn đường kính FK	0.5 0.25
b	Ta có $\triangle HAK$ cân tại A nên $AH = AK$ (1) K là trực tâm của $\triangle AFB$ nên ta có $FK \perp AB$ suy ra $FK \parallel AH$ (2) Do đó $\angle FAH = \angle AFK$ mà $\angle FAH = \angle FAK$ (gt) cho nên $\angle AFK = \angle FAK$ Suy ra $AK = KF$, kết hợp với (1) ta được $AH = KF$ (3) Từ (2) và (3) ta có $AKFH$ là hình bình hành nên $HF \parallel AK$. Mà $AK \perp IB$ suy ra $HF \perp IB$.	0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
c	Chu vi của $\triangle AMB = C_{\triangle AMB} = MA + MB + AB$ lớn nhất khi chỉ khi $MA + MB$ lớn nhất (vì AB không đổi). Áp dụng bất đẳng thức $(a+b)^2 \leq 2(a^2+b^2)$ dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow a=b$, ta có $(MA+MB)^2 \leq 2(MA^2+MB^2) = 2AB^2$ Nên $MA + MB$ đạt giá trị lớn nhất bằng $AB\sqrt{2}$ khi và chỉ khi $MA = MB$ hay M nằm chính giữa cung AB. Vậy khi M nằm chính giữa cung AB thì $C_{\triangle AMB}$ đạt giá trị lớn nhất. Khi đó $C_{\triangle AMB} = MA + MB + AB = AB\sqrt{2} + AB = (1+\sqrt{2})AB = 2R(1+\sqrt{2})$	0.25 0.25 0.25 0.25
5	Đặt $A = (2^x+1)(2^x+2)(2^x+3)(2^x+4)$, ta có $2^x \cdot A$ là tích của 5 số tự nhiên liên tiếp nên $2^x \cdot A$ chia hết cho 5. Nhưng 2^x không chia hết cho 5, do đó A chia hết cho 5. Nếu $y \geq 1$, ta có $(2^x+1)(2^x+2)(2^x+3)(2^x+4) - 5^y$ chia hết cho 5 mà 11879 không chia hết cho 5 nên $y \geq 1$ không thỏa mãn, suy ra $y = 0$. Khi đó, ta có $(2^x+1)(2^x+2)(2^x+3)(2^x+4) - 5^y = 11879$ $\Leftrightarrow (2^x+1)(2^x+2)(2^x+3)(2^x+4) - 1 = 11879$ $\Leftrightarrow (2^x+1)(2^x+2)(2^x+3)(2^x+4) = 11880$	0.25 0.25 0.25

	$\Leftrightarrow (2^x + 1)(2^x + 2)(2^x + 3)(2^x + 4) = 9.10.11.12 \Leftrightarrow x = 3$ <p>Vậy $x = 3; y = 0$ là hai giá trị cần tìm.</p>	0.25
--	--	------

**PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN KRÔNG PẮC**

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 120 phút

Đề gồm 01 trang

Bài 1: (3,0 điểm)

Cho $A = 4 - \sqrt{x} - \frac{\sqrt{x+x}}{\sqrt{x}} + x$

a) Rút gọn A.

b) Tìm x để A nhận giá trị nhỏ nhất.

Bài 2: (2,0 điểm)

Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} \sqrt{x+2007} + \sqrt{y} = \sqrt{2007} \\ \sqrt{x} + \sqrt{y+2007} = \sqrt{2007} \end{cases}$$

Bài 3: (3,0 điểm)

Giải phương trình: $\sqrt{2x-3} + \sqrt{5-2x} = 3x^2 - 12x + 14$

Bài 4: (3,0 điểm)

Cho $x > 0, y > 0$ và $x + y = 4$

Tìm giá trị nhỏ nhất của $A = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{y}\right)^2 + 1994,5$

Bài 5: (3,0 điểm)

Cho hình chữ nhật ABCD. Kẻ BM vuông góc với AC, gọi N là trung điểm của AM, P là trung điểm của CD. Chứng minh: $\angle BNP = 90^\circ$.

Bài 6: (3,0 điểm)

Cho $\triangle ABC$ ($AB = AC$). Đường cao AH, kẻ HE vuông góc với AC, gọi O là trung điểm của EH. Chứng minh: $AO \perp BE$

Bài 7: (3,0 điểm)

Cho $\triangle ABC$ Có $AB = c, AC = b, BC = a$.

Chứng minh rằng: $\sin \frac{A}{2} \cdot \sin \frac{B}{2} \cdot \sin \frac{C}{2} \leq \frac{1}{8}$

***** Hết *****

PGD KRÔNG PẮC

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN – NĂM

Môn : Toán- Lớp 9

Thời gian làm bài : 150 phút

Bài 1: a) Đ/K: $x > 0$
điểm

$$A = 4 - \sqrt{x} - 1 - \sqrt{x} + x$$

điểm

$$= x - 2\sqrt{x} + 3$$

điểm

$$\text{b) } A = (\sqrt{x} - 1)^2 + 2 \geq 2 \quad \forall x > 0$$

điểm

$$\text{Min} A = 2 \Leftrightarrow x = 1 \text{ (TMĐK)}$$

điểm

Bài 2:

$$\begin{cases} \sqrt{x+2007} + \sqrt{y} = \sqrt{2007} \\ \sqrt{x} + \sqrt{y+2007} = \sqrt{2007} \end{cases}$$

ĐK: $x \geq 0; y \geq 0$

điểm

$$\Rightarrow \sqrt{x+2007} + \sqrt{y} \geq \sqrt{2007}$$

điểm

$$\sqrt{x} + \sqrt{2007+y} \geq \sqrt{2007}$$

điểm

Do đó hệ phương trình có nghiệm duy nhất $\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$

điểm

Bài 3: $\sqrt{2x-3} + \sqrt{5-2x} = 3x^2 - 12x + 14$

$$\text{ĐK: } \frac{3}{2} \leq x \leq \frac{5}{2}$$

điểm

Áp dụng Bunnhiacopski

$$\text{VT: } 1 \cdot \sqrt{2x-3} + 1 \cdot \sqrt{5-2x} \leq \sqrt{(1^2 + 1^2)(2x-3+5-2x)} = 2 \quad (1)$$

điểm

$$\text{VP: } 3x^2 - 12x + 14 = 3(x-2)^2 + 2 \geq 2 \quad \forall x \quad (2)$$

điểm

$\Rightarrow$ Phương trình: $\sqrt{2x-3} + \sqrt{5-2x} = 3x^2 - 12x + 14$ có nghiệm $\Leftrightarrow$ Dấu “=” xảy ở (1) và (2) đồng thời xảy ra.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{2x-3} = \sqrt{5-2x} \\ x-2=0 \end{cases} \Leftrightarrow x=2$$

điểm

1.5

Bài 4: $\forall a, b \in \mathbb{R}^+$ thì $a^2 + b^2 \geq \frac{1}{2}(a+b)^2$ dấu “=” $\Leftrightarrow a = b$
 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{4}{a+b}$ Dấu “=” xảy ra $\Leftrightarrow a = b$.

0.5

điểm

$$\begin{aligned} A &= \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{y}\right)^2 + 1994,5 \geq \frac{1}{2} \left(x + y + \frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right)^2 + 1994,5 \\ &\geq \frac{1}{2} \left(x + y + \frac{4}{x+y}\right)^2 + 1994,5 = \frac{1}{2} \left(4 + \frac{4}{4}\right)^2 + 1994,5 \\ &= 2007 \end{aligned}$$

1.0


điểm

$$\Rightarrow A \geq 2007 \text{ Do đó Min} A = 2007 \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = 4 \\ x = y \end{cases} \Leftrightarrow x = y = 2$$

0.5

điểm

Bài 5:



Gọi I là trung điểm của BM.

NI cắt BC tại E.

Ta có NI là đường trung bình của $\triangle BMA$.

$$\Rightarrow NI \parallel AB \text{ và } NI = \frac{1}{2} AB.$$

0.5 điểm

$$AB \perp BC \Rightarrow NI \perp BC \text{ tại E}$$

điểm

0.5

$$\Rightarrow I \text{ là trực tâm của } \triangle BCN \Rightarrow CI \perp BN \text{ (1)} \quad 0.5 \text{ điểm}$$

Ta có:

$$\left. \begin{aligned} IN &= \frac{1}{2} AB \\ CP &= \frac{1}{2} CD \end{aligned} \right\} \text{ mà } AB = CD \Rightarrow IN = CP \quad \Rightarrow \text{CINM là hình bình hành} \Rightarrow CI \parallel NP \text{ (2)}$$

0.5 điểm

$$\left. \begin{aligned} IN &\parallel AB \\ AB &\parallel CP \end{aligned} \right\} \Rightarrow IN \parallel CP$$

0.5

điểm

$$\text{Từ (1) và (2)} \Rightarrow NP \perp BN \text{ tại N} \Rightarrow \angle BNP = 90^\circ$$

0.5

điểm

Bài 6:


$$\text{Kẻ } BD \perp AC \Rightarrow \angle CBD = \angle HAC \text{ (cùng phụ với } \angle C)$$

$$\Rightarrow \triangle BDC \sim \triangle EAH \text{ (gg)} \Rightarrow \frac{BC}{AH} = \frac{CD}{EH}$$

0.5

điểm

$\triangle BDC$ có $BH = HC$ ($\triangle ABC$ cân tại A) $\Rightarrow$ $DE = EC = \frac{CD}{2}$ 0.5
điểm
 $HE \parallel BD$ (cùng $\perp AC$)



$$\Rightarrow \frac{BC}{AH} = \frac{CD}{EH} = \frac{2CE}{2HO} = \frac{CE}{HO} \quad 0.5$$

điểm

$\triangle CBE$ và $\triangle HAO$ có $\angle BCE = \angle AHO$ ($\triangle DBC$ và $\triangle EAH$)

$$\Rightarrow \frac{BC}{AH} = \frac{CE}{HO}$$

$$\Rightarrow \triangle CBE \sim \triangle HAO \text{ (c.g.c)} \quad 0.5$$

điểm

Gọi K là giao điểm của AH và BE.

Ta có: $\angle CBE + \angle K_1 = 90^\circ$


$$\Rightarrow \angle HAO + \angle K_1 = 90^\circ \text{ (Vì } \angle K_1 = \angle K_2, \angle CBE = \angle HAO \text{)} \quad 0.5$$

điểm

$$\Rightarrow AO \perp BE. \quad 0.5$$

điểm

Bài 7:



Kẻ phân giác AD của $\angle BAC$

kẻ $BE \perp AD$; $CF \perp AD$

$\triangle BED$ vuông tại E $\Rightarrow BE \leq BD$

$\triangle CFD$ vuông tại F $\Rightarrow CF \leq CD$

$$\Rightarrow BE + CF \leq BD + CD = a \quad 0.5$$

điểm

$$\triangle ABE (\angle E = 90^\circ) \Rightarrow BE = AB \cdot \sin \frac{A}{2} = c \cdot \sin \frac{A}{2} \quad 0.5$$

điểm

$$\triangle ACF (\angle F = 90^\circ) \Rightarrow CF = AC \cdot \sin \frac{A}{2} = b \cdot \sin \frac{A}{2} \quad 0.5 \text{ điểm}$$

$$\Rightarrow BE + CF = (b + c) \sin \frac{A}{2} \leq a \Rightarrow \sin \frac{A}{2} \leq \frac{a}{b + c} \quad 0.5$$

điểm

$$b > 0; c > 0 \text{ áp dụng bất đẳng thức Côsi: } b + c \geq 2\sqrt{bc} \Rightarrow \frac{a}{b + c} \leq \frac{a}{2\sqrt{bc}} \Rightarrow \sin \frac{A}{2} \leq \frac{a}{2\sqrt{bc}} \quad 0.5 \text{ điểm}$$

$$\text{Tương tự ta cũng có: } \sin \frac{B}{2} \leq \frac{b}{2\sqrt{ac}}; \sin \frac{C}{2} \leq \frac{c}{2\sqrt{ab}}$$

$$\Rightarrow \sin \frac{A}{2} \cdot \sin \frac{B}{2} \cdot \sin \frac{C}{2} \leq \frac{a}{2\sqrt{bc}} \cdot \frac{b}{2\sqrt{ac}} \cdot \frac{c}{2\sqrt{ab}} = \frac{1}{8}$$

điểm

0.5

**PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN NGHĨA HÀNH**

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 150 phút

Đề gồm 01 trang

Bài 1: (6,0 điểm)

- a) Với n là số nguyên dương. Hãy tìm ƯCLN($21n+4$, $14n+3$)
b) Cho a, b, c là các số nguyên sao cho $2a + b$; $2b + c$; $2c + a$ là các số chính phương, biết rằng trong ba số chính phương nói trên có một số chia hết cho 3. Chứng minh rằng: $(a - b)(b - c)(c - a)$ chia hết cho 27.
c) Tìm nghiệm nguyên của phương trình: $x^2 + y^2 = xy + x + y$.

Bài 2: (3,0 điểm)

- a) Tính giá trị của biểu thức $P = \sqrt{1 + 2013^2 + \frac{2013^2}{2014^2}} + \frac{2013}{2014}$
b) Giải phương trình: $\sqrt{x-7} + \sqrt{9-x} = x^2 - 16x + 66$

Bài 3: (4,0 điểm)

- a) Cho $x > 0$, $y > 0$ và $x + y \leq 1$. Chứng minh bất đẳng thức $\frac{1}{x^2 + xy} + \frac{1}{y^2 + xy} \geq 4$.
 $A = \frac{2x}{3} + \frac{x+3}{x-1}$, với $x > 1$.
b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Bài 4: (5,0 điểm)

Cho tam giác đều ABC có độ dài cạnh bằng a . Gọi M là một điểm nằm ở miền trong của tam giác. MI, MP, MQ theo thứ tự là khoảng cách từ M đến các cạnh BC, AB, AC. Gọi O là trung điểm của cạnh BC. Các điểm D và E thứ tự chuyển động trên các cạnh AB và AC sao cho $\angle DOE = 60^\circ$.

- a) Chứng minh $MI + MP + MQ$ không đổi
b) Chứng minh rằng đường thẳng DE luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định.
c) Xác định vị trí của các điểm D và E để diện tích tam giác DOE đạt giá trị nhỏ nhất và tính giá trị nhỏ nhất đó theo a .

Bài 5: (2,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết rằng $AB = CH$.

Chứng minh rằng: $\cos B = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

.....Hết.....
(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)

Họ và tên thí sinh:..... Số báo danh:.....
Giám thị 1:..... Giám thị 2:


HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9

Bài	Câu	Đáp án	Điểm
-----	-----	--------	------

Bài 1: (6,0đ)	a) (2,0đ)	Đặt $d = \text{ƯCLN}(21n+4, 14n+3)$, với $n \in \mathbb{N}^*$. Ta có : $(21n + 4) \vdots d$ và $(14n + 3) \vdots d$ $\Rightarrow 2(21n + 4) \vdots d$ và $3(14n + 3) \vdots d$ $\Rightarrow [3(14n + 3) - 2(21n + 4)] \vdots d$ $\Rightarrow (42n + 9 - 42n - 8) \vdots d \Rightarrow 1 \vdots d \Rightarrow d = 1$	0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ																																																			
	b) (2,0đ)	Vì $2a + b; 2b + c; 2c + a$ là các số chính phương nên ta có thể đặt $2a + b = m^2; 2b + c = n^2; 2c + a = p^2$ với m, n, p là các số tự nhiên. Vì trong các số $m^2; n^2; p^2$ có một số chia hết cho 3 nên không mất tính tổng quát có thể giả sử m^2 chia hết cho 3 (1). Ta lại có $m^2 + n^2 + p^2 = 3a + 3b + 3c$ chia hết cho 3 (2) Từ (1) và (2) suy ra $n^2 + p^2$ chia hết cho 3. Dễ thấy n và p đều chia hết cho 3. Do đó $2a + b; 2b + c; 2c + a$ đều chia hết cho 3. Từ đó suy ra a, b, c đều chia hết cho 3. Vậy $(a - b)(b - c)(c - a)$ chia hết cho 27.	0,5																																																			
	c) (2,0đ)	$x^2 + y^2 = xy + x + y \Leftrightarrow (x - y)^2 + (x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$. Vì $x, y \in \mathbb{Z}$ nên : <table><tr><td>$x+y$</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>-1</td><td>-1</td><td>-1</td><td>-1</td></tr><tr><td>$x-1$</td><td>1</td><td>-1</td><td>1</td><td>-1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>-1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>-1</td></tr><tr><td>$y-1$</td><td>1</td><td>1</td><td>-1</td><td>-1</td><td>1</td><td>-1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>-1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>$(x;y)$</td><td>$(0;0)$</td><td></td><td></td><td>$(0;0)$</td><td></td><td>$(1;0)$</td><td>$(2;1)$</td><td></td><td>$(1;2)$</td><td></td><td></td><td>$(0;1)$</td></tr></table>	$x+y$	0	0	0	0	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	$x-1$	1	-1	1	-1	0	0	1	-1	0	0	1	-1	$y-1$	1	1	-1	-1	1	-1	0	0	1	-1	0	0	$(x;y)$	$(0;0)$			$(0;0)$		$(1;0)$	$(2;1)$		$(1;2)$			$(0;1)$
$x+y$	0	0	0	0	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1																																										
$x-1$	1	-1	1	-1	0	0	1	-1	0	0	1	-1																																										
$y-1$	1	1	-1	-1	1	-1	0	0	1	-1	0	0																																										
$(x;y)$	$(0;0)$			$(0;0)$		$(1;0)$	$(2;1)$		$(1;2)$			$(0;1)$																																										

Bài 2: (3,0đ)	a) (1,0đ)	$\sqrt{1+a^2 + \frac{a^2}{(a+1)^2}} + \frac{a}{a+1} = \sqrt{(a+1)^2 - 2a + \left(\frac{a}{a+1}\right)^2} + \frac{a}{a+1}$ <p>P=</p> $= \sqrt{(a+1)^2 - 2.(a+1).\frac{a}{a+1} + \left(\frac{a}{a+1}\right)^2} + \frac{a}{a+1}$ $= \sqrt{\left[(a+1) - \frac{a}{a+1}\right]^2} + \frac{a}{a+1}$ $= (a+1) - \frac{a}{a+1} + \frac{a}{a+1} = a+1$ <p>Vậy P = 2014</p>	0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ
	b) (2,0đ)	Điều kiện $7 \leq x \leq 9$ $x^2 - 16x + 66 = (x-8)^2 + 2 \geq 2$ (1) $1.\sqrt{x-7} + 1.\sqrt{9-x} \leq \frac{1+(x-7)}{2} + \frac{1+(9-x)}{2} = 2$ (2) $(1) \text{ và } (2) \Rightarrow \sqrt{x-7} + \sqrt{9-x} = x^2 - 16x + 66 = 2$ $\begin{cases} x-8=0 \\ 1=x-7 \Leftrightarrow x=8 \\ 1=9-x \end{cases}$ <p>Khi $x=8$ (thỏa mãn điều kiện) vậy $x=8$ là nghiệm của phương trình</p>	0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ

Bài 3: (4,0đ)	a) (2đ)	<p>Áp dụng bất đẳng thức $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{4}{a+b}$, với mọi $a > 0; b > 0$.</p> <p>Ta có :</p> $\frac{1}{x^2+xy} + \frac{1}{y^2+xy} \geq \frac{4}{x^2+xy+y^2+xy}$ $\frac{4}{(x+y)^2} \geq 4$ $0 < x+y \leq 1 \Rightarrow \frac{1}{x+y} \geq 1 \Rightarrow \frac{4}{x+y} \geq 4$ <p>(vì $\begin{cases} x^2+xy = y^2+xy \\ x+y = 1 \end{cases} \Leftrightarrow x=y=\frac{1}{2} > 0$).</p> <p>Đẳng thức xảy ra khi $\begin{cases} x^2+xy = y^2+xy \\ x+y = 1 \end{cases} \Leftrightarrow x=y=\frac{1}{2} > 0$.</p>	1,0đ
	b) (2đ)	<p>Ta có : $A = \frac{2x}{3} + \frac{x+3}{x-1} = \frac{2x-2+2}{3} + \frac{x-1+4}{x-1} = \frac{2(x-1)}{3} + \frac{4}{x-1} + \frac{5}{3}$.</p> <p>Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho 2 số dương ta được:</p> $\frac{2(x-1)}{3} + \frac{4}{x-1} \geq 2\sqrt{\frac{2(x-1)}{3} \cdot \frac{4}{x-1}} = \frac{4\sqrt{6}}{3}$ $\frac{2(x-1)}{3} = \frac{4}{x-1} \Rightarrow x = 1 + \sqrt{6}$ <p>Đẳng thức xảy ra khi $\frac{2(x-1)}{3} = \frac{4}{x-1} \Rightarrow x = 1 + \sqrt{6}$ (thỏa mãn điều kiện $x > 1$).</p> <p>Vậy min $A = \frac{4\sqrt{6}+5}{3}$ khi $x = 1 + \sqrt{6}$.</p>	0,5đ
Bài 4 (5,0đ)	a) (1,0đ)	<p>Tính được $S_{ABC} = S_{MBC} + S_{MAC} + S_{MAB}$</p> $\Rightarrow \frac{1}{2} a.MI + \frac{1}{2} a.MP + \frac{1}{2} a.MQ = \frac{1}{2} ah$ $\Rightarrow MI + MP + MQ = h \text{ (không đổi)}$	0,5đ
	b) (2,0đ)	<p>Vì $\angle DOE = 60^\circ$ nên $\angle BOD + \angle COE = 120^\circ$ (1).</p> <p>Tam giác BOD có $\angle B = 60^\circ$ nên $\angle BOD + \angle BDO = 120^\circ$ (2).</p> <p>Từ (1) và (2) suy ra $\angle BDO = \angle COE$.</p> <p>Do đó $\triangle BOD \sim \triangle CEO$ (g-g).</p> $\frac{BD}{OC} = \frac{OD}{EO} \Rightarrow \frac{BD}{OB} = \frac{OD}{EO}$ <p>Suy ra $\triangle BDO \sim \triangle ODE$ (c-g-c).</p> $\Rightarrow \angle BDO = \angle ODE$ <p>Vẽ $OH \perp AB$; $OK \perp DE$ $\Rightarrow \triangle OHD = \triangle OKD$ (ch-gn) $\Rightarrow OH = OK$.</p> <p>Mà OH không đổi nên DE luôn tiếp xúc với đường tròn $(O; OH)$</p>	0,5đ

		cố định.	
	c) (2,0đ)	c) Vẽ $OI \perp AC$, dễ thấy $DH = DK = x$; $EK = EI = y$ (T/c hai tiếp tuyến cắt nhau). Do đó $DE = x + y$; $BD = x + \frac{a}{4}$; $CE = y + \frac{a}{4}$ (Dễ thấy $BH = CI = \frac{a}{4}$). Vì $\triangle BOD \sim \triangle CEO$ (g-g) $\Rightarrow \frac{OB}{EC} = \frac{DB}{OC}$. $\Rightarrow DB \cdot EC = OB \cdot OC = \frac{a^2}{4}$	0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ
Bài 5: (2,0đ)	(2,0đ)	.  Vì tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có: $AB^2 = BH \cdot BC = (BC - CH) \cdot BC = (BC - AB) \cdot BC = BC^2 - AB \cdot BC$ (vì $AB = CH$). Chia hai vế cho BC^2 ta được: $\frac{AB^2}{BC^2} = 1 - \frac{AB}{BC} \Leftrightarrow \frac{AB^2}{BC^2} + \frac{AB}{BC} = 1$ $\Leftrightarrow \left(\frac{AB}{BC} + \frac{1}{2} \right)^2 = \frac{5}{4} \Rightarrow \frac{AB}{BC} + \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{5}}{2}$ $\Leftrightarrow \frac{AB}{BC} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$ Tam giác ABC vuông tại A nên ta có $\cos B = \frac{AB}{BC} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$ (đpcm).	0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 9

Thời gian: 150 phút.

Bài 1. (5 điểm)

Cho biểu thức: $P = \frac{x\sqrt{x}-1}{x-\sqrt{x}} - \frac{x\sqrt{x+1}}{x+\sqrt{x}} + \left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) \cdot \left(\frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x+1}} \right)$
với $x > 0$; $x \neq 1$.

1. Tìm điều kiện xác định và rút gọn P.

2. Tính P khi $x = \sqrt{9+4\sqrt{5}} - \sqrt{9-4\sqrt{5}}$.

3. Tìm x để $P < \frac{21}{2}$.

Bài 2. (4 điểm)

1. Cho x, y là 2 số thực dương thỏa mãn:

$$(x+y)^2 + 7(x+y) + y^2 + 10 = 0.$$

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = x + y + 1$.

2. Giải phương trình:

$$\frac{2+\sqrt{x}}{\sqrt{2}+\sqrt{2+\sqrt{x}}} + \frac{2-\sqrt{x}}{\sqrt{2}-\sqrt{2-\sqrt{x}}} = \sqrt{2}.$$

Bài 3. (4 điểm)

1. Cho $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} = 1$. Tính giá trị biểu thức

$$Q = \frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b}.$$

2. Tìm nghiệm nguyên của phương trình:

$$2x^2 + y^2 + 3xy + 3x + 2y + 2 = 0.$$

Bài 4. (6 điểm)

Cho điểm A nằm ngoài đường tròn (O, R). Kẻ hai tiếp tuyến AB, AC và cát tuyến ADE tới đường tròn đó (B, C là 2 tiếp điểm, D nằm giữa A và E). Gọi H là giao điểm của AO và BC.

1. Chứng minh 4 điểm A, B, O, C cùng thuộc 1 đường tròn.

2. Chứng minh $AH \cdot AO = AD \cdot AE$.

3. Tiếp tuyến tại D của (O) cắt AB, AC lần lượt tại M và N. Biết $OA = 6\text{cm}$; $R = 3,6\text{cm}$. Tính chu vi ΔAMN .

4. Qua O kẻ đường thẳng vuông góc với OA cắt AB, AC lần lượt tại I và K. Chứng minh $MI + NK \leq IK$.

Bài 5. (1 điểm)

Cho $x, y \in \mathbb{R}$, $x \neq 0$, $y \neq 0$. Chứng minh:

$$\frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2} + 4 \geq 3 \left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \right).$$


Bài	Nội dung	Điểm
Bài 1 (5 điểm)	<p>1. $P = \frac{(\sqrt{x}-1)(x+\sqrt{x}+1)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)} - \frac{(\sqrt{x}+1)(x-\sqrt{x}+1)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} + \frac{x-1}{\sqrt{x}} \cdot \frac{(\sqrt{x}+1)^2 + (\sqrt{x}-1)^2}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)}$</p> <p>$= \dots = \frac{2(x+\sqrt{x}+1)}{\sqrt{x}}$</p> <p>2. Tìm $x = \dots = 4$ Thay $x = 4$ tính $P = 7$</p> <p>3. $P < \frac{21}{2} \Leftrightarrow \frac{2(x+\sqrt{x}+1)}{\sqrt{x}} < \frac{21}{2}$ và $x > 0$, $x \neq 1$.</p> <p>$\Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow (\sqrt{x}-4)(4\sqrt{x}-1) < 0$</p>	<p>2đ</p> <p>0,5đ</p> <p>1đ</p> <p>1đ</p> <p>0,5đ</p>

	Lập bảng xét dấu Kết luận $\frac{1}{4} < x < 4$ và $x \in \mathbb{R}$.	
Bài 2 (4 điểm)	<p>1. $(x+y)^2 + 7(x+y) + y^2 + 10 = 0$.</p> <p>$\Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow x^2 + y^2 + 1 + 2xy + 2x + 2y + 5x + 5y + 5 + 4 = -y^2$</p> <p>$\Leftrightarrow (x+y+1)^2 + 5(x+y+1) + 4 = -y^2$</p> <p>$\Rightarrow A^2 + 5A + 4 = -y^2$</p> <p>Vì $-y^2 \leq 0$ nên $A^2 + 5A + 4 \leq 0$.</p> <p>$\Leftrightarrow (A+1)(A+4) \leq 0$</p> <p>$\left \begin{array}{l} A+1 \leq 0 \\ A+4 \geq 0 \end{array} \right. \Rightarrow -4 \leq A \leq -1$.</p> <p>Vậy $\max A = -1, \min A = -4$.</p> <p>2. ĐK $0 < x < 4$</p> <p>Đặt $\sqrt{2+\sqrt{x}} = a, \sqrt{2-\sqrt{x}} = b \Rightarrow a^2 + b^2 = 4. (a > 0, b > 0)$</p> <p>$\Rightarrow \frac{a^2}{\sqrt{2+a}} + \frac{b^2}{\sqrt{2-b}} = \sqrt{2}$.</p> <p>$\Rightarrow \dots \Rightarrow \sqrt{2}(2+ab) = (a-b)(2+ab)$</p> <p>Vì $a > 0, b > 0 \Rightarrow 2+ab > 0$</p> <p>$\Rightarrow a-b = \sqrt{2} \Rightarrow a^2 - 2ab - b^2 = 2 \Rightarrow 2ab = 2 \Rightarrow ab = 1$</p> <p>$\sqrt{(2+\sqrt{x})(2-\sqrt{x})} = 1$</p> <p>$\Rightarrow \sqrt{4-x} = 1 \Rightarrow 4-x = 1 \Rightarrow x = 3 \text{ (TM)}$.</p>	<p>0,5đ</p> <p>0,5đ</p> <p>0,5đ $\Rightarrow$ 0,5đ</p> <p>0,5đ</p> <p>0,5đ</p> <p>0,5đ</p> <p>0,5đ</p>
Bài 3 (4 điểm)	<p>1. Ta có $a+b+c \in \mathbb{R}$ vì nếu $a+b+c = 0$ thế vào giả thiết ta có</p> <p>$\frac{a}{-a} + \frac{b}{-b} + \frac{c}{-c} = 1 \Leftrightarrow -3 = 1$ (vô lí).</p> <p>Khi $a+b+c \in \mathbb{R}$ ta có</p> <p>$\left(\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \right) (a+b+c) = a+b+c$.</p> <p>$\Rightarrow \frac{a^2}{b+c} + \frac{a(b+c)}{b+c} + \frac{b(c+a)}{c+a} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c(a+b)}{a+b} + \frac{c^2}{a+b} = a+b+c$</p> <p>$\Rightarrow \frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} + a+b+c = a+b+c$</p> <p>$\Rightarrow \frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} = 0 \Rightarrow Q = 0$.</p> <p>2. Giải phương trình nghiệm nguyên.</p> <p>$2x^2 + y^2 + 3xy + 3x + 2y + 2 = 0$.</p> <p>$\Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow (2x+y+1)(x+y+1) = -1$</p> <p>$2x+y+1$ và $x+y+1$ là các ước của -1</p> <p>TH 1: $\left \begin{array}{l} 2x+y+1=1 \\ x+y+1=-1 \end{array} \right. \Rightarrow \dots \Rightarrow x=2, y=-4$</p>	<p>0,5đ</p> <p>0,5đ</p> <p>0,5đ</p> <p>0,5đ</p> <p>0,75đ</p> <p>0,5 đ</p> <p>0,5 đ</p> <p>0,25 đ</p>

TH 2: $2x+y+1=-1 \Rightarrow \dots \Rightarrow x=-2, y=2$

Kết luận $(x,y) = (2; -4)$ hoặc $(-2; 2)$

Bài 4



1. Chứng minh $OB \perp AB$, $OC \perp AC$ (theo tính chất tiếp tuyến)

$$\Rightarrow \angle OBA = \angle OCA = 90^\circ$$

$\Rightarrow B$ và C cùng thuộc đường tròn đường kính OA

$\Rightarrow 4$ điểm A, B, O, C cùng thuộc một đường tròn.

2. Chứng minh $OB \perp AB$

Chứng minh $OA \perp BC$ tại H

$$\Rightarrow AB^2 = AH \cdot AO \quad (1)$$

Chứng minh $\triangle ABD$ đồng dạng với $\triangle AEB$

$$\frac{AB}{AE} = \frac{AD}{AB}$$

$$\Rightarrow \frac{AB}{AE} = \frac{AD}{AB} \Rightarrow AB^2 = AE \cdot AD \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2)} \Rightarrow AH \cdot AO = AE \cdot AD$$

3. Tính $AB = 4,8\text{cm}$

Áp dụng tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau suy ra

$$AB = AC, MD = MB, ND = NC$$

$\Rightarrow$ Chu vi $\triangle AMN$ là:

$$\begin{aligned} AM + AN + MN &= AM + AN + MD + DN \\ &= AM + AN + MB + NC \\ &= AB + AC = 2AB = 9,6\text{cm}. \end{aligned}$$

4. Chứng minh $IK \parallel BC$

$$\text{Và } AB = AC \Rightarrow AI = AK$$

$$\Rightarrow \triangle AIK \text{ cân tại } A \Rightarrow \angle AIK = \angle AKI \text{ và } OI = OK = \frac{IK}{2}$$

Theo t/c hai tiếp tuyến cắt nhau suy ra:

1,25đ

0,75đ

0,75đ

0,25đ

0,5đ

0,25đ

0,75đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	$\angle NMO = \angle OMI = \frac{1}{2} \angle NMI$ $\angle MNO = \angle ONK = \frac{1}{2} \angle MNK$ <p>Tứ giác MNKI có</p> $\angle IMN + \angle MNK + \angle NKO + \angle KIM = 360^0$ $\Rightarrow 2 \angle IMO + 2 \angle ONK + 2 \angle NKO = 360^0$ $\Rightarrow \angle IMO + \angle ONK + \angle NKO = 180^0$ <p>Đồng thời ΔNOK có: $\angle NOK + \angle ONK + \angle NKO = 180^0$</p> $\Rightarrow \angle IMO = \angle NOK$ $\Rightarrow \Delta MIO \text{ đồng dạng với } \Delta OKN$ $\Rightarrow \frac{MI}{OK} = \frac{OI}{NK} \Rightarrow MI \cdot NK = OI \cdot OK = \frac{IK^2}{4}$ $\frac{MI + NK}{2} \geq \sqrt{MI \cdot NK} = \sqrt{\frac{IK^2}{4}} = \frac{IK}{2}$ <p>Áp dụng BĐT Cosi: $\Rightarrow MI + NK \geq IK$</p>	
Bài 5 (1 điểm)	$\frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2} + 4 \geq 3 \left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \right) \quad (1)$ $\Leftrightarrow \frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2} + 4 - 3 \left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \right) \geq 0 \quad (2)$ <p>Đặt $a = \frac{x}{y} + \frac{y}{x} \Rightarrow a = \left \frac{x}{y} + \frac{y}{x} \right = \left \frac{x}{y} \right + \left \frac{y}{x} \right \geq 2 \Rightarrow \begin{cases} a \geq 2 \\ a \leq -2 \end{cases}$</p> $\Rightarrow a^2 = \frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2} + 2$ <p>BĐT (2) trở thành $a^2 - 3a + 2 \geq 0 \Leftrightarrow (a - 2)(a + 1) \geq 0$.</p> <p>Lập bảng xét dấu suy ra: $-1 \leq a \leq 2$</p> <p>Từ $\begin{cases} a \geq 2 \\ a \leq -2 \end{cases} \Rightarrow a$ nằm trong miền nghiệm của bất phương trình đã xét. Vậy a thỏa mãn $a^2 - 3a + 2 \geq 0$</p> $\Rightarrow (1) \text{ đúng}$ <p>Vậy $\frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2} + 4 \geq 3 \left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \right)$</p> <p>Lưu ý: HS làm cách khác đúng cho điểm tối đa Chứng minh hình phải có lập luận, căn cứ chặt chẽ mới cho điểm tối đa.</p>	<p>0,5đ</p> <p>0,5đ</p>

$$P = \frac{x}{x - \sqrt{x}} + \frac{2}{x + 2\sqrt{x}} + \frac{x + 2}{(\sqrt{x} - 1)(x + 2\sqrt{x})}$$

Câu 1. Cho biểu thức:

- Rút gọn P .
- Tính P khi $x = 3 + 2\sqrt{2}$.
- Tìm giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên.

Câu 2. Giải phương trình:

- $x^2 - 10x + 27 = \sqrt{6 - x} + \sqrt{x - 4}$
- $x^2 - 2x - x\sqrt{x} - 2\sqrt{x} + 4 = 0$

Câu 3.

- Tìm các số nguyên $x; y$ thỏa mãn: $y^2 + 2xy - 3x - 2 = 0$
- Cho $x > 1; y > 0$, chứng minh: $\frac{1}{(x-1)^3} + \left(\frac{x-1}{y}\right)^3 + \frac{1}{y^3} \geq 3\left(\frac{3-2x}{x-1} + \frac{x}{y}\right)$
- Tìm số tự nhiên n để: $A = n^{2012} + n^{2002} + 1$ là số nguyên tố.

Câu 4.

Cho hình vuông ABCD, có độ dài cạnh bằng a. E là một điểm di chuyển trên CD (E khác C, D). Đường thẳng AE cắt đường thẳng BC tại F, đường thẳng vuông góc với AE tại A cắt đường thẳng CD tại K.

- Chứng minh: $\frac{1}{AE^2} + \frac{1}{AF^2}$ không đổi
- Chứng minh: $\cos \angle AKE = \sin \angle EKF \cdot \cos \angle EFK + \sin \angle EFK \cdot \cos \angle EKF$
- Lấy điểm M là trung điểm đoạn AC. Trình bày cách dựng điểm N trên DM sao cho khoảng cách từ N đến AC bằng tổng khoảng cách từ N đến DC và AD.

Câu 5.

Cho ABCD là hình bình hành. Đường thẳng d đi qua A không cắt hình bình hành, ba điểm H, I, K lần lượt là hình chiếu của B, C, D trên đường thẳng d. Xác định vị trí đường thẳng d để tổng: $BH + CI + DK$ có giá trị lớn nhất.

Hết./.

PHÒNG GD & ĐT CẨM THỦY


HD CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP

Môn thi: TOÁN 9.

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu	Ý	Nội dung cần đạt	Điểm
-----	---	------------------	------

1	a	$P = \frac{x}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)} + \frac{2}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+2)} + \frac{x+2}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+2)}$ $= \frac{x(\sqrt{x}+2) + 2(\sqrt{x}-1) + x+2}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+2)} = \frac{x\sqrt{x} + 2x + 2\sqrt{x} - 2 + x + 2}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+2)}$ $= \frac{x\sqrt{x} + 2x + 2\sqrt{x} + x}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+2)} = \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}+2)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+2)} = \frac{(\sqrt{x}+1)}{(\sqrt{x}-1)}$	0,25	2,25
	b	$x = 3 + 2\sqrt{2} \Leftrightarrow \sqrt{x} = \sqrt{2 + 2\sqrt{2} + 1} = \sqrt{(\sqrt{2} + 1)^2} = \sqrt{2} + 1$ $P = \frac{(\sqrt{x}+1)}{(\sqrt{x}-1)} = \frac{\sqrt{2} + 1 + 1}{\sqrt{2} + 1 - 1} = \frac{\sqrt{2} + 2}{\sqrt{2}} = 1 + \sqrt{2}$	0,25	
	c	<p>ĐK: $x > 0; x \neq 1$;</p> $P = \frac{(\sqrt{x}+1)}{(\sqrt{x}-1)} = \frac{\sqrt{x}-1+2}{\sqrt{x}-1} = 1 + \frac{2}{\sqrt{x}-1}$ <p>Học sinh lập luận để tìm ra $x = 4$ hoặc $x = 9$</p>	0,25	
2	a	<p>ĐK: $4 \leq x \leq 6$;</p> $VT = x^2 - 10x + 27 = (x-5)^2 + 2 \geq 2, \text{ dấu "}" xảy ra } \Leftrightarrow x = 5$ $VP = \sqrt{6-x} + \sqrt{x-4} \leq \sqrt{(1^2 + 1^2)((\sqrt{6-x})^2 + (\sqrt{x-4})^2)} \Leftrightarrow VP \leq 2, \text{ dấu "}" xảy ra } \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{6-x}} = \frac{1}{\sqrt{x-4}} \Rightarrow 6-x = x-4 \Leftrightarrow x = 5$ <p>$VT = VP \Leftrightarrow x = 5$ (TMĐK), Vậy nghiệm của phương trình: $x = 5$</p>	0,25	1,75
	b	<p>ĐK: $x \geq 0$. Nhận thấy: $x = 0$ không phải là nghiệm của phương trình, chia cả hai vế cho x ta có:</p> $x^2 - 2x - x\sqrt{x} - 2\sqrt{x} + 4 = 0 \Leftrightarrow x - 2 - \sqrt{x} - \frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{4}{x} = 0 \Leftrightarrow (x + \frac{4}{x}) - (\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}}) = 0$ <p>Đặt $\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} = t > 0 \Leftrightarrow t^2 = x + 4 + \frac{4}{x} \Leftrightarrow x + \frac{4}{x} = t^2 - 4$, thay vào ta có:</p> $(t^2 - 4) - t - 2 = 0 \Leftrightarrow t^2 - t - 6 = 0 \Leftrightarrow (t-3)(t+2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 3 \\ t = -2 \end{cases}$ <p>Đối chiếu ĐK của t</p> $\Rightarrow t = 3 \Leftrightarrow \sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} = 3 \Leftrightarrow x - 3\sqrt{x} + 2 = 0 \Leftrightarrow (\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} - 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ x = 1 \end{cases}$	0,75	
3	a	$y^2 + 2xy - 3x - 2 = 0 \Leftrightarrow x^2 + 2xy + y^2 = x^2 + 3x + 2 \Leftrightarrow (x+y)^2 = (x+1)(x+2)$ <p>(*)</p> <p>VT của (*) là số chính phương; VP của (*) là tích của 2 số nguyên liên</p>		2.0

		$\Leftrightarrow \begin{cases} x+1=0 \\ x+2=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-1 \Rightarrow y=1 \\ x=-2 \Rightarrow y=2 \end{cases}$ <p>tiếp nên phải có 1 số bằng 0.</p> <p>Vậy có 2 cặp số nguyên $(x; y) = (-1; 1)$ hoặc $(x; y) = (-2; 2)$</p>	0.5	
	b	$x > 1; y > 0 \Leftrightarrow x-1 > 0; y > 0 \Leftrightarrow \frac{1}{(x-1)^3} > 0; \frac{x-1}{y} > 0; \frac{1}{y^3} > 0$ <p>Áp dụng BĐT Côsi cho 3 số dương:</p> $\frac{1}{(x-1)^3} + 1 + 1 \geq 3 \cdot \sqrt[3]{\frac{1}{(x-1)^3} \cdot 1 \cdot 1} \Leftrightarrow \frac{1}{(x-1)^3} \geq \frac{3}{x-1} - 2 \quad (1)$ $\left(\frac{x-1}{y}\right)^3 + 1 + 1 \geq 3 \cdot \sqrt[3]{\left(\frac{x-1}{y}\right)^3 \cdot 1 \cdot 1} \Leftrightarrow \left(\frac{x-1}{y}\right)^3 \geq \frac{3(x-1)}{y} - 2 \quad (2)$ $\frac{1}{y^3} + 1 + 1 \geq 3 \cdot \sqrt[3]{\frac{1}{y^3} \cdot 1 \cdot 1} \Leftrightarrow \frac{1}{y^3} \geq \frac{3}{y} - 2 \quad (3)$ <p>Từ (1); (2); (3):</p> $\frac{1}{(x-1)^3} + \left(\frac{x-1}{y}\right)^3 + \frac{1}{y^3} \geq \frac{3}{x-1} - 6 + \frac{3(x-1)}{y} + \frac{3}{y}$ $\Leftrightarrow \frac{1}{(x-1)^3} + \left(\frac{x-1}{y}\right)^3 + \frac{1}{y^3} \geq \frac{3-6x+6}{x-1} + \frac{3x}{y} = 3\left(\frac{3-2x}{x-1} + \frac{x}{y}\right)$	0.75	
	c	<p>Xét $n = 0$ thì $A = 1$ không phải nguyên tố; $n = 1$ thì $A = 3$ nguyên tố.</p> <p>Xét $n > 1$: $A = n^{2012} - n^2 + n^{2002} - n + n^2 + n + 1$</p> $= n^2((n^3)^{670} - 1) + n((n^3)^{667} - 1) + (n^2 + n + 1)$ <p>Mà $(n^3)^{670} - 1$ chia hết cho $n^3 - 1$, suy ra $(n^3)^{670} - 1$ chia hết cho $n^2 + n + 1$</p> <p>Tương tự: $(n^3)^{667} - 1$ chia hết cho $n^2 + n + 1$</p> <p>Vậy A chia hết cho $n^2 + n + 1 > 1$ nên A là hợp số. Số tự nhiên cần tìm $n = 1$.</p>	0.25 0.5	
4			0.25	
	a	<p>Học sinh c/m: $\triangle ABF = \triangle ADK$ (g.c.g) suy ra $AF = AK$</p> <p>Trong tam giác vuông: KAE có AD là đường cao nên:</p>	0.5 0,5	3.0

$$\text{Câu 1: (3 điểm)} \text{ Cho } A = \left(\frac{\sqrt{x}-2}{x-1} - \frac{\sqrt{x}+2}{x+2\sqrt{x}+1} \right) \cdot \frac{x^2-2x+1}{2}$$

- Rút gọn A.
- Tìm x để $A > 0$.
- Tìm giá trị lớn nhất của A.

Câu 2: (6 điểm)

a) Giải phương trình: $2x^2 - 8x - 3\sqrt{x^2 - 4x - 8} = 18$

b) Giải bất phương trình: $|2x-7| < x^2 + 2x + 2$

c) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} (x+y)(x^2-y^2)=45 \\ \end{cases}$

Câu 3: (4 điểm)

a) Cho $a+b+c=0$, tính giá trị của biểu thức:

$$P = \frac{1}{b^2+c^2-a^2} + \frac{1}{a^2+c^2-b^2} + \frac{1}{a^2+b^2-c^2}$$

b) Tìm số tự nhiên n sao cho $A = n^2 + n + 6$ là số chính phương.

Câu 4: (5 điểm)

a) Từ một điểm A nằm ngoài (O;R) kẻ hai tiếp tuyến AM, AN ($M, N \in (O;R)$). Trên cung nhỏ MN lấy điểm P khác M và N. Tiếp tuyến tại P cắt AM tại B, cắt AN tại C. Cho A cố định và $AO = a$. Chứng minh chu vi tam giác ABC không đổi khi P di động trên cung nhỏ MN. Tính giá trị không đổi ấy theo a và R.


b) Cho tam giác ABC có diện tích bằng 36 (đơn vị diện tích). Trên cạnh BC và cạnh CA lần lượt lấy điểm D và E sao cho $DC = 3DB$ và $EA = 2EC$; AD cắt BE tại I. Tính diện tích tam giác BID.

Câu 5: (2 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$Q = \frac{1}{2} \left(\frac{x^{10}}{y^2} + \frac{y^{10}}{x^2} \right) + \frac{1}{4} (x^{16} + y^{16}) - (1 + x^2 y^2)^2$$

Hết

Câu	ý	Đáp án và hướng dẫn chấm	Điểm
1	a	ĐKXD: $x \geq 0, x \neq 1$ $A = -\sqrt{x}(\sqrt{x} - 1)$	0.25đ 0.75đ
	b	$A > 0 \Leftrightarrow -\sqrt{x}(\sqrt{x} - 1) > 0 \Leftrightarrow \sqrt{x}(\sqrt{x} - 1) < 0$ $\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x} > 0 \\ \sqrt{x} - 1 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow 0 < x < 1$ (vì $\sqrt{x} > \sqrt{x} - 1$)	0.25đ 0.75đ
	c	$A = -\sqrt{x}(\sqrt{x} - 1) = -x + \sqrt{x} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = -(\sqrt{x} - \frac{1}{2})^2 + \frac{1}{4} \leq \frac{1}{4}$ $\Rightarrow A \leq \frac{1}{4}$ Vậy GTLN của A = $\frac{1}{4}$ khi $\sqrt{x} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \frac{1}{4} (t/m)$	0.75đ 0.25đ
2	a	$2x^2 - 8x - 3\sqrt{x^2 - 4x - 8} = 18$ $\Leftrightarrow 2(x^2 - 4x - 8) - 3\sqrt{x^2 - 4x - 8} - 2 = 0$ Đặt $\sqrt{x^2 - 4x - 8} = y, y \geq 0$ ta được phương trình: $2y^2 - 3y - 2 = 0 \Leftrightarrow 2y^2 + y - 4y - 2 = 0 \begin{cases} y = 2 \\ y = -\frac{1}{2} \end{cases}$ $\Leftrightarrow (y - 2)(2y + 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} y = 2 \\ y = -\frac{1}{2} \end{cases}$ $y = -\frac{1}{2} < 0$ (loại); với $y = 2$ ta có $\sqrt{x^2 - 4x - 8} = 2 \Leftrightarrow x^2 - 4x - 12 = 0$ $\Leftrightarrow (x - 6)(x + 2) = 0$ $\Leftrightarrow x = 6$ hoặc $x = -2$ (thỏa mãn phương trình đã cho) Vậy pt đã cho có 2 nghiệm: $x = 6, x = -2$	0.25đ 0.25đ 0.5đ 0.25đ 0.5đ 0.25đ
	b	Vì $x^2 + 2x + 2 = (x+1)^2 + 1 > 0$ Nên: $ 2x - 7 < x^2 + 2x + 2 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 7 < x^2 + 2x + 2 \\ 2x - 7 > x^2 + 2x + 2 \end{cases}$ $\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 9 > 0 \\ x^2 + 4x + 4 > 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x+2)^2 > 9 \\ x+2 > 3 \end{cases}$ $\Leftrightarrow \begin{cases} x+2 > 3 \\ x+2 < -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 1 \\ x < -5 \end{cases}$ Kết luận nghiệm bất phương trình	0.25đ 0.5đ 0.25đ 0.25đ 0.5đ 0.25đ

		<p>Biến đổi $((x+y)(x^2-y^2)=45) \Leftrightarrow ((x-y)(x+y)^2=45) \quad (1)$</p> <p>Từ hệ ta có $x-y > 0$</p> <p>Nhân hai vế của (1) với 17 và nhân hai vế của (2) với 9 rồi đồng nhất sau khi nhân ta được:</p> <p>$17(x-y)(x+y)^2 = 9(x-y)(x^2+y^2) \Leftrightarrow 4x^2 + 17xy + 4y^2 = 0$</p> <p>Nếu $y = 0$ thì $x = 0 \Rightarrow$ không thỏa mãn hệ.</p> <p>Nếu $y \neq 0$, chia hai vế của $4x^2 + 17xy + 4y^2 = 0$ cho y^2 và đặt $t = x/y$ được: $4t^2 + 17t + 4 = 0 \Leftrightarrow (t+4)(4t+1) = 0$</p> <p>$\Leftrightarrow t = -4$ hoặc $t = -1/4$</p> <p>$\Leftrightarrow x = -4y$ hoặc $y = -4x$</p> <p>thay vào hệ phương trình trên được nghiệm của phương trình đã cho là:</p> <p>$(x; y) \in \{(4;-1);(1;-4)\}$</p>	<p>0.25đ</p> <p>0.25đ</p> <p>0.5đ</p> <p>0.5đ</p> <p>0.25đ</p> <p>0.25đ</p>
	a	$P = \frac{1}{b^2 + c^2 - a^2} + \frac{1}{a^2 + c^2 - b^2} + \frac{1}{a^2 + b^2 - c^2}$ $= \frac{1}{b^2 + c^2 - (b+c)^2} + \frac{1}{a^2 + c^2 - (a+c)^2} + \frac{1}{a^2 + b^2 - (a+b)^2} \quad (dk : abc \neq 0)$ $= \frac{1}{-2bc} + \frac{1}{-2ac} + \frac{1}{-2ab} = \frac{a+b+c}{-2abc} = 0 \quad (voi : abc \neq 0)$	<p>1đ</p> <p>1đ</p>
3	b	<p>$A = n^2 + n + 6$ là số chính phương nên A có dạng</p> <p>$A = n^2 + n + 6 = k^2 \quad (k \in \mathbb{N}^*)$</p> <p>$\Leftrightarrow 4n^2 + 4n + 24 = 4k^2 \Leftrightarrow (2k)^2 - (2n+1)^2 = 23$</p> <p>$\Leftrightarrow (2k+2n+1)(2k-2n-1) = 23 \Leftrightarrow \begin{cases} 2k+2n+1 = 23 \\ 2k-2n-1 = 1 \end{cases}$</p> <p>(Vì 23 là số nguyên tố và $2k+2n+1 > 2k-2n-1$)</p> <p>$\Leftrightarrow \begin{cases} 2k+2n+1 = 23 \\ 2k-2n-1 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k = 6 \\ n = 5 \end{cases}$</p> <p>Vậy với $n = 5$ thì A là số chính phương</p>	<p>0.5đ</p> <p>0.5đ</p> <p>0.75đ</p> <p>0.25đ</p>
4	a	<p>$C_{\triangle ABC} = AB+BC+CA$</p> <p>$= AB+BP+PC+CA$</p> <p>$= (AB+BM)+(CN+CA)$</p> <p>(t/c 2 tt cắt nhau)</p> <p>$= AM + AN = 2AM$</p> <p>(t/c 2 tt cắt nhau)</p> <p>$= 2\sqrt{OA^2 - OM^2} = 2\sqrt{a^2 - R^2}$</p> <p>Vì A cố định nên OA=a không đổi vậy khi P di chuyển trên cung nhỏ MN thì chu vi tam giác ABC không đổi.</p> <p>$C_{\triangle ABC} = 2\sqrt{a^2 - R^2}$</p> <p>Ghi chú:</p> <p>- Không có điểm vẽ hình.</p> <p>- Chứng minh mà không có hình vẽ hoặc hình vẽ sai thì không được công nhận (không có điểm).</p>	 <p>0.25đ</p> <p>0.5đ</p> <p>0.25đ</p> <p>0.5đ</p> <p>0.25đ</p> <p>0.25đ</p>

		<p>(Các đường nét đứt được vẽ thêm để gợi ý chứng minh khi chấm, học sinh phải trình bày kẻ thêm đường phụ khi chứng minh - nếu cần)</p> <p>Trình bày c/m: $S_{\Delta BID} = \frac{1}{4} S_{\Delta BIC}$</p> <p>Trình bày c/m: $S_{\Delta BIC} = \frac{1}{2} S_{\Delta BIA}$</p> <p>$\Rightarrow S_{\Delta BID} = \frac{1}{8} S_{\Delta BIA} = \frac{1}{9} S_{\Delta ABD}$</p> <p>Trình bày c/m: $S_{\Delta ABD} = \frac{1}{4} S_{\Delta ABC}$</p> <p>$\Rightarrow S_{\Delta BID} \frac{1}{36} S_{\Delta ABC} = \frac{36}{36} = 1$</p> <p>Ghi chú: - Không có điểm vẽ hình. - Chứng minh mà không có hình vẽ hoặc hình vẽ sai thì không được công nhận (không có điểm).</p>	<p>0.5đ</p> <p>1.0đ</p> <p>0.5đ</p> <p>0.5đ</p> <p>0.5đ</p>
5	b	<p>ĐK: $x \neq 0, y \neq 0$</p> <p>$Q = \frac{1}{2} \left(\frac{x^{10}}{y^2} + \frac{y^{10}}{x^2} \right) + \frac{1}{4} (x^{16} + y^{16}) - (1 + x^2 y^2)^2$</p> <p>$= \frac{1}{2} \left(\frac{x^{10}}{y^2} + \frac{y^{10}}{x^2} + 1 + 1 \right) + \frac{1}{4} (x^{16} + y^{16} + 1 + 1) - (1 + x^2 y^2)^2 - \frac{3}{2}$</p> <p>Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho bốn số dương ta có:</p> <p>$\frac{1}{2} \left(\frac{x^{10}}{y^2} + \frac{y^{10}}{x^2} + 1 + 1 \right) \geq 2 x^2 y^2$</p> <p>$\frac{1}{4} (x^{16} + y^{16} + 1 + 1) \geq x^4 y^4$</p> <p>$\Rightarrow Q \geq 2 x^2 y^2 + x^4 y^4 - 1 - 2 x^2 y^2 - x^4 y^4 - \frac{3}{2} = -\frac{5}{2}$</p> <p>Vậy giá trị nhỏ nhất của Q là $Q = -5/2$ khi $x^2 = y^2 = 1$</p>	<p>0.5đ</p> <p>0.25đ</p> <p>0.25đ</p> <p>0.5đ</p> <p>0.5đ</p>

Chú ý: HS có thể giải theo cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.

ĐỀ ÔN THI CHỌN HỌC SINH GIỎI DỰ THI CẤP HUYỆN MÔN: TOÁN - LỚP 9

Thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề

Bài 1: (4,0 điểm) Cho biểu thức

$$A = \left(\frac{1}{1-\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) : \left(\frac{2x + \sqrt{x} - 1}{1-x} + \frac{2x\sqrt{x} + x - \sqrt{x}}{1+x\sqrt{x}} \right) \text{ Với } x > 0; x \neq \frac{1}{4}; x \neq 1$$

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tính giá trị của A khi $x = 17 - 12\sqrt{2}$

c) So sánh A với $\sqrt{A}$.

Bài 2: (4,0 điểm) Thu gọn các biểu thức

a) $A = \sqrt{8 + 2\sqrt{10 + 2\sqrt{5}}} + \sqrt{8 - 2\sqrt{10 + 2\sqrt{5}}}$

$$b) B = \left(\frac{15}{\sqrt{6}+1} + \frac{4}{\sqrt{6}-2} - \frac{12}{3-\sqrt{6}} \right) (\sqrt{6}+11)$$

Bài 3: (3,0 điểm)

a) Giải phương trình $\sqrt{x^2-3x+2} + \sqrt{x+3} = \sqrt{x-2} + \sqrt{x^2+2x-3}$

b) Cho hàm số $f(x) = (x^3 + 6x - 5)^{2012}$. Tính $f(a)$, với $a = \sqrt[3]{3+\sqrt{17}} + \sqrt[3]{3-\sqrt{17}}$

Bài 4: (6,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Trên cạnh AC lấy điểm

M sao cho $\frac{MC}{MA} = \frac{1}{3}$. Kẻ đường thẳng vuông góc với AC tại C, cắt tia BM tại K, kẻ $BE \perp CK$

a) Chứng minh tứ giác ABEC là hình vuông

b) Chứng minh: $\frac{1}{AB^2} = \frac{1}{BM^2} + \frac{1}{BK^2}$

c) Biết $BM = 6\text{cm}$. Tính các cạnh của tam giác MCK

Bài 5: (1,5 điểm) Cho tam giác đều ABC, các điểm D, E lần lượt thuộc các cạnh AC, AB, sao cho BD, CE cắt nhau tại P và diện tích tứ giác ADPE bằng diện tích tam giác BPC. Tính $\angle BPE$.

Bài 6: (1,5 điểm) Cho hai số dương a và b thỏa mãn $a \cdot b = 1$. Tìm giá trị nhỏ


nhất của biểu thức $B = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{2}{a+b}$

----- Hết -----

Bài 1 (4 điểm)	
a) Rút gọn biểu thức (2 điểm)	
$A = \left(\frac{1}{1-\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) : \left(\frac{2x+\sqrt{x}-1}{1-x} + \frac{2x\sqrt{x}+x-\sqrt{x}}{1+x\sqrt{x}} \right) \left(x > 0; x \neq \frac{1}{4}; x \neq 1 \right)$	0.5
$= \frac{\sqrt{x}-1+\sqrt{x}}{\sqrt{x}(1-\sqrt{x})} : \left[\frac{2x+2\sqrt{x}-\sqrt{x}-1}{(1-\sqrt{x})(1+\sqrt{x})} + \frac{\sqrt{x}(2x+\sqrt{x}-1)}{(1+\sqrt{x})(1-\sqrt{x}+x)} \right]$	0.5
$= \frac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)} : \left[\frac{(\sqrt{x}+1)(2\sqrt{x}-1)}{(1-\sqrt{x})(1+\sqrt{x})} + \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)(2\sqrt{x}-1)}{(1+\sqrt{x})(1-\sqrt{x}+x)} \right]$	0.2 5
$= \frac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)} : \left[(2\sqrt{x}-1) \left(\frac{1}{1-\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}+x} \right) \right]$	0.2 5
$= \frac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)} : (2\sqrt{x}-1) : \frac{1-\sqrt{x}+x+\sqrt{x}(1-\sqrt{x})}{(1-\sqrt{x})(1-\sqrt{x}+x)}$	0.2 5
$= \frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)} : \frac{1}{(1-\sqrt{x})(1-\sqrt{x}+x)} = \frac{1-\sqrt{x}+x}{\sqrt{x}}$	0.2 5
b) Tính giá trị của A khi $x = 17 - 12\sqrt{2}$ (1 điểm).	
Tính $x = 17 - 12\sqrt{2} = (3 - 2\sqrt{2})^2 \Rightarrow \sqrt{x} = \sqrt{(3 - 2\sqrt{2})^2} = 3 - 2\sqrt{2} = 3 - 2\sqrt{2}$	0.5
$A = \frac{1 - (3 - 2\sqrt{2}) + 17 - 12\sqrt{2}}{3 - 2\sqrt{2}} = \frac{15 - 10\sqrt{2}}{3 - 2\sqrt{2}} = \frac{5(3 - 2\sqrt{2})}{3 - 2\sqrt{2}} = 5$	0.5
c) So sánh A với $\sqrt{A}$ (1 điểm).	
Biến đổi $A = \frac{1-\sqrt{x}+x}{\sqrt{x}} = \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} - 1$	0.2 5
Chứng minh được $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} > 2$ với mọi $x > 0; x \neq \frac{1}{4}; x \neq 1$	0.2 5
$\Rightarrow A = \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} - 1 > 1 \Rightarrow \sqrt{A} > 1 \Rightarrow \sqrt{A} - 1 > 0 \Rightarrow \sqrt{A}(\sqrt{A} - 1) > 0$	
$\Rightarrow A - \sqrt{A} > 0 \Rightarrow A > \sqrt{A}$	

	0.5
Bài 2 (4 điểm)	
<p>a) $A = \sqrt{8 + 2\sqrt{10 + 2\sqrt{5}}} + \sqrt{8 - 2\sqrt{10 + 2\sqrt{5}}}$</p> $A^2 = 8 + 2\sqrt{10 + 2\sqrt{5}} + 2\sqrt{64 - 4(10 + 2\sqrt{5})} + 8 - 2\sqrt{10 + 2\sqrt{5}}$ $= 16 + 2\sqrt{64 - 40 - 8\sqrt{5}}$ $= 16 + 2\sqrt{24 - 8\sqrt{5}}$ $= 16 + 2\sqrt{(2\sqrt{5} - 2)^2}$ $= 12 + 4\sqrt{5}$ $= (\sqrt{10} + \sqrt{2})^2$ $\Rightarrow A = \sqrt{10} + \sqrt{2}$	<p>0.5</p> <p>0.2</p> <p>5</p> <p>0.2</p> <p>5</p> <p>0.5</p> <p>0.2</p> <p>5</p>
<p>b) $B = \left(\frac{15}{\sqrt{6}+1} + \frac{4}{\sqrt{6}-2} - \frac{12}{3-\sqrt{6}} \right) (\sqrt{6}+11)$</p> $= \left[\frac{15(\sqrt{6}-1)}{(\sqrt{6})^2-1} + \frac{4(\sqrt{6}+2)}{(\sqrt{6})^2-2^2} - \frac{12(3+\sqrt{6})}{3^2-(\sqrt{6})^2} \right] (\sqrt{6}+11)$ $= [3(\sqrt{6}-1) + 2(\sqrt{6}+2) - 4(3+\sqrt{6})] (\sqrt{6}+11)$ $= (3\sqrt{6} - 3 + 2\sqrt{6} + 4 - 12 - 4\sqrt{6}) (\sqrt{6}+11)$ $= (\sqrt{6} - 11) (\sqrt{6}+11)$ $= 6 - 11^2 = -115$	<p>0.5</p> <p>0.5</p> <p>0.5</p> <p>0.2</p> <p>5</p> <p>0.2</p> <p>5</p>
Bài 3 (3 điểm) Giải phương trình	
<p>a) $\sqrt{x^2 - 3x + 2} + \sqrt{x + 3} = \sqrt{x - 2} + \sqrt{x^2 + 2x - 3}$</p> $\Leftrightarrow \sqrt{(x-1)(x-2)} + \sqrt{x+3} = \sqrt{x-2} + \sqrt{(x-1)(x+3)} \quad (1)$ $\begin{cases} (x-1)(x-2) \geq 0 \\ x+3 \geq 0 \\ x-2 \geq 0 \\ (x-1)(x+3) \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow x \geq 2$ <p>Điều kiện</p> $(1) \Leftrightarrow \sqrt{x-2}(\sqrt{x-1}-1) - \sqrt{x+3}(\sqrt{x-1}-1) = 0$	<p>0.5</p> <p>0.2</p> <p>5</p> <p>0.5</p>

$\Leftrightarrow (\sqrt{x-1}-1)(\sqrt{x-2}-\sqrt{x+3})=0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x-1}-1=0 \\ \sqrt{x-2}-\sqrt{x+3}=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x-1}=1 \\ \sqrt{x-2}=\sqrt{x+3} \end{cases}$	0.5
<p>$x = 2$ thỏa mãn điều kiện xác định. Vậy phương trình có nghiệm duy nhất $x = 2$.</p>	0.2 5
<p>b) Từ $a = \sqrt[3]{3+\sqrt{17}} + \sqrt[3]{3-\sqrt{17}}$</p> $\Rightarrow a^3 = \left(\sqrt[3]{3+\sqrt{17}} + \sqrt[3]{3-\sqrt{17}} \right)^3$ $\Leftrightarrow a^3 = 6 + 3\sqrt[3]{3+\sqrt{17}} \cdot \sqrt[3]{3-\sqrt{17}} \left(\sqrt[3]{3+\sqrt{17}} + \sqrt[3]{3-\sqrt{17}} \right)$ $\Leftrightarrow a^3 = 6 - 6a$ $\Leftrightarrow a^3 + 6a - 6 = 0$	0.2 5
<p>Vậy: $f(a) = (a^3 + 6a - 5)^{2012} = (a^3 + 6a - 6 + 1)^{2012} = 1^{2012} = 1$</p>	0.2 5
	0.2 5
Bài 4 (8 điểm)	
	0.5

<p>c) Từ $\frac{MC}{MA} = \frac{1}{3} \Rightarrow MA = 3MC; AB = AC = 4MC$</p> <p>Đặt $MC = x \Rightarrow MA = 3x; AB = 4x$</p> <p>Áp dụng định lý Py-ta-go vào tam giác vuông ABM</p> $AB^2 + AC^2 = BM^2 \Rightarrow (4x)^2 + (3x)^2 = 6^2$ $\Leftrightarrow 25x^2 = 36 \Leftrightarrow x = \frac{6}{5}$ $\Rightarrow MC = 1\frac{1}{5}(cm); AB = 4x = \frac{24}{5} = 4\frac{4}{5}(cm)$ <p>Vì $CK \parallel AB$ nên $\triangle MCK$ đồng dạng $\triangle MAB$</p> $\Rightarrow \frac{MK}{MB} = \frac{KC}{AB} = \frac{CM}{CA} = \frac{1}{3}$ $\Rightarrow MK = 2(cm); KC = \frac{24}{5} : 3 = 1\frac{3}{5}(cm)$	<p>0.7 5</p> <p>0.7 5</p> <p>0.2 5</p> <p>0.2 5</p> <p>0.5</p> <p>0.2 5</p>
<p>Bài 5 (1,5 điểm)</p>	
	<p>0.2 5</p>
<p>Kẻ $EF \perp AC$ tại F, $DG \perp BC$ tại G.</p> <p>Theo giả thiết $S_{(ADPE)} = S_{(BPC)}$</p> $\Rightarrow S_{(ACE)} = S_{(BCD)}.$ <p>Mà $AC = BC \Rightarrow EF = DG$ và $\angle A = \angle C$</p> <p>Suy ra $\triangle AEF = \triangle CDG \Rightarrow AE = CG$.</p> <p>Do đó $\triangle AEC = \triangle CDB(c - g - c) \Rightarrow \angle ECB = \angle ECA$</p> $\Rightarrow \angle BPE = \angle PBC + \angle PCB = \angle PCD + \angle PCB = 60^\circ$	<p>0.5</p> <p>0.5</p> <p>0.2 5</p>
<p>Bài 5 (1,5 điểm)</p>	
<p>Vì $ab=1, a>0, b>0$ và theo BĐT Côsi ta có :</p>	<p>0.2</p>

$B = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{2}{a+b}$	5
$= \frac{a+b}{ab} + \frac{2}{a+b}$	0.5
$= \frac{a+b}{2} + \left(\frac{a+b}{2} + \frac{2}{a+b} \right)$	0.5
$\geq \sqrt{ab} + 2\sqrt{\frac{a+b}{2} \cdot \frac{2}{a+b}} = 3$	
$B_{\min} = 3 \Leftrightarrow \begin{cases} a = b \\ \frac{a+b}{2} = \frac{2}{a+b} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = b = 1(nhan) \\ a = b = -1(loai) \end{cases} \Leftrightarrow a = b = 1$	0.2
	5

Chú ý: 1. Nếu thí sinh làm bài bằng cách khác đúng thì vẫn cho điểm tương đương.

2. Điểm toàn bài không được làm tròn.

ĐỀ ÔN THI CHỌN HỌC SINH GIỎI DỰ THI CẤP HUYỆN MÔN: TOÁN - LỚP 9

Thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề

Bài 1. (5,0 điểm) Cho biểu thức: $A = \left(\frac{3x + \sqrt{9x-3}}{x + \sqrt{x-2}} + \frac{1}{\sqrt{x-1}} + \frac{1}{\sqrt{x+2}} - 2 \right) : \frac{1}{x-1}$ với $a > 0, a \neq 1$.

a) Chứng minh rằng $M > 4$.

b) Với những giá trị nào của a thì biểu thức $N = \frac{6}{M}$ nhận giá trị nguyên?

Bài 2. (4,0 điểm)

a) Giải phương trình: $\sqrt{2x^2 - 9x + 4} + 3\sqrt{2x-1} = \sqrt{2x^2 + 21x - 11}$

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của

$A = \frac{xy}{z} + \frac{yz}{x} + \frac{zx}{y}$ với x, y, z là các số dương và $x^2 + y^2 + z^2 = 1$

Bài 3. (4 điểm)

a) Tìm các nghiệm nguyên của phương trình : $2x^6 + y^2 - 2x^3y = 320$

b) Cho x, y, z là các số dương thỏa mãn $\frac{1}{x+y} + \frac{1}{y+z} + \frac{1}{z+x} = 6$.

Chứng minh rằng: $\frac{1}{3x+3y+2z} + \frac{1}{3x+2y+3z} + \frac{1}{2x+3y+3z} \leq \frac{3}{2}$.

Bài 4. (6 điểm)

a. Cho tam giác nhọn ABC có trục tâm H, trọng tâm I; Giao điểm 3 đường trung trực là O, trung điểm của BC là M.

Tính giá trị biểu thức: $\sqrt{\frac{IO^2 + OM^2}{IH^2 + HA^2}}$

b. Cho góc $\angle xOy$. Một đường thẳng d thay đổi luôn cắt các tia Ox; Oy tại M và N. Biết giá trị biểu thức $\frac{1}{OM} + \frac{1}{ON}$ không thay đổi khi đường thẳng d thay đổi.

Chứng minh rằng đường thẳng d luôn đi qua một điểm cố định.

Bài 5. (1 điểm)

Tìm các số nguyên dương x, y thỏa mãn: $2xy + x + y = 83$



-----Hết-----

HƯỚNG DẪN CHẤM THI

BÀI	ĐỀ -ĐÁP ÁN	ĐIỂM
Bài 1	<p>Cho biểu thức: $M = \frac{a+1}{\sqrt{a}} + \frac{a\sqrt{a}-1}{a-\sqrt{a}} + \frac{a^2-a\sqrt{a}+\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}-a\sqrt{a}}$ với $a > 0, a \neq 1$.</p> <p>a) Chứng minh rằng $M > 4$.</p> <p>b) Với những giá trị nào của a thì biểu thức $N = \frac{6}{M}$ nhận giá trị nguyên.</p>	
a	<p>Do $a > 0, a \neq 1$ nên: $\frac{a\sqrt{a}-1}{a-\sqrt{a}} = \frac{(\sqrt{a}-1)(a+\sqrt{a}+1)}{\sqrt{a}(\sqrt{a}-1)} = \frac{a+\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}}$ và</p> <p>$\frac{a^2-a\sqrt{a}+\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}-a\sqrt{a}} = \frac{(a+1)(a-1)-\sqrt{a}(a-1)}{\sqrt{a}(1-a)} = \frac{(a-1)(a-\sqrt{a}+1)}{\sqrt{a}(1-a)} = \frac{-a+\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}}$</p>	

	$\Rightarrow M = \frac{a+1}{\sqrt{a}} + 2$	
	Do $a > 0$; $a \neq 1$ nên: $(\sqrt{a}-1)^2 > 0 \Leftrightarrow a+1 > 2\sqrt{a}$	
	$\Rightarrow M > \frac{2\sqrt{a}}{\sqrt{a}} + 2 = 4$	
b	Ta có $0 < N = \frac{6}{M} < \frac{3}{2}$ do đó N chỉ có thể nhận được một giá trị nguyên là 1	
	$\text{Mà } N = 1 \Leftrightarrow \frac{6\sqrt{a}}{a+1+2\sqrt{a}} = 1 \Leftrightarrow a-4\sqrt{a}+1=0 \Leftrightarrow (\sqrt{a}-2)^2 = 3$ $\Leftrightarrow \sqrt{a} = 2+\sqrt{3} \text{ hay } \sqrt{a} = 2-\sqrt{3} \text{ (phù hợp)}$	
	Vậy, N nguyên $\Leftrightarrow a = (2 \pm \sqrt{3})^2$	
Bài 2	a) ĐK: $x \geq 4$ hoặc $x = 0,5$	
	<p>Biến đổi:</p> $\sqrt{2x^2-9x+4} + 3\sqrt{2x-1} = \sqrt{2x^2+21x-11}$ $\Leftrightarrow \sqrt{(x-4)(2x-1)} + 3\sqrt{2x-1} = \sqrt{(x+11)(2x-1)}$ $\Leftrightarrow \sqrt{(x-4)(2x-1)} + 3\sqrt{2x-1} - \sqrt{(x+11)(2x-1)} = 0$ $\Leftrightarrow \sqrt{2x-1}(\sqrt{x-4} + 3 - \sqrt{x+11}) = 0$ $\Leftrightarrow \sqrt{2x-1} = 0(1)$ <p>Hoặc $\sqrt{x-4} + 3 - \sqrt{x+11} = 0(2)$</p> <p>Giải (1) được $x = 0,5$ (thỏa mãn), giải (2) được $x = 5$ (thỏa mãn)</p>	
	<p>b) $A = \frac{xy}{z} + \frac{yz}{x} + \frac{zx}{y}$</p> $\text{Nên } A^2 = \frac{x^2 y^2}{z^2} + \frac{y^2 z^2}{x^2} + \frac{z^2 x^2}{y^2} + 2 \quad (\text{vì } x^2+y^2+z^2=1)$ $= B + 2$ <p>Áp dụng bất đẳng thức Cô si cho 2 số dương ta có</p> $\frac{x^2 y^2}{z^2} + \frac{y^2 z^2}{x^2} \geq \sqrt{\frac{x^2 y^2 y^2 z^2}{z^2 x^2}} = 2y^2$ $\frac{y^2 z^2}{x^2} + \frac{z^2 x^2}{y^2} \geq 2z^2$ <p>Tương tự</p> $\frac{x^2 y^2}{z^2} + \frac{z^2 x^2}{y^2} \geq 2x^2$ <p>Cộng vế với vế ta được $2B \geq 2 \Rightarrow B \geq 1$</p> <p>Do đó $A^2 = B + 2 \geq 3$ nên $A \geq \sqrt{3}$</p>	

	$\text{Vậy Min } A = \sqrt{3} \Leftrightarrow x = y = z = \frac{\sqrt{3}}{3}$	
Bài 3		
a	$\text{Từ } 2x^6 + y^2 - 2x^3y = 320 \Leftrightarrow (x^3 - y)^2 + (x^3)^2 = 320$ $\Rightarrow (x^3)^2 \leq 320$	
	$\text{mà } x \text{ nguyên nên } x \leq 2$	
	$\text{Nếu } x=1 \text{ hoặc } x=-1 \text{ thì } y \text{ không nguyên (loại)}$	
	$\text{Nếu } x=2 \Rightarrow y=-2 \text{ hoặc } y=6$	
	$\text{Nếu } x=-2 \Rightarrow y=-6 \text{ hoặc } y=2$	
	$\text{Vậy phương trình đã cho có 4 cặp nghiệm } (x,y) \text{ là:}$ $(2;-2); (2;6); (-2;-6); (-2;2)$	
	$\text{Từ } 2x^6 + y^2 - 2x^3y = 320 \Leftrightarrow (x^3 - y)^2 + (x^3)^2 = 320$ $\Rightarrow (x^3)^2 \leq 320$	
b	$\text{Áp dụng BĐT } \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{4}{a+b} \quad (\text{với } a, b > 0)$ $\Rightarrow \frac{1}{a+b} \leq \frac{1}{4} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)$	
	$\text{Ta có: } \frac{1}{3x+3y+2z} = \frac{1}{(2x+y+z)+(x+2y+z)} \leq \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2x+y+z} + \frac{1}{x+2y+z} \right)$	
	$\leq \frac{1}{4} \left[\frac{1}{(x+y)+(x+z)} + \frac{1}{(x+y)+(y+z)} \right] \leq \frac{1}{4} \left[\frac{1}{4} \left(\frac{1}{x+y} + \frac{1}{x+z} + \frac{1}{x+y} + \frac{1}{y+z} \right) \right]$	
	$\leq \frac{1}{16} \left(\frac{2}{x+y} + \frac{1}{x+z} + \frac{1}{y+z} \right)$	
	$\text{Tương tự: } \frac{1}{3x+2y+3z} \leq \frac{1}{16} \left(\frac{2}{x+z} + \frac{1}{x+y} + \frac{1}{y+z} \right)$ $\frac{1}{2x+3y+3z} \leq \frac{1}{16} \left(\frac{2}{y+z} + \frac{1}{x+y} + \frac{1}{x+z} \right)$	
	$\text{Cộng vế theo vế, ta có:}$ $\frac{1}{3x+3y+2z} + \frac{1}{3x+2y+3z} + \frac{1}{2x+3y+3z} \leq \frac{1}{16} \left(\frac{4}{x+y} + \frac{4}{x+z} + \frac{4}{y+z} \right)$ $\leq \frac{4}{16} \left(\frac{1}{x+y} + \frac{1}{x+z} + \frac{1}{y+z} \right) = \frac{1}{4} \cdot 6 = \frac{3}{2}$	
Bài 4		

<p>a</p>	<p>a) Ta có $MO \parallel HA$ (cùng vuông góc với BC) $OK \parallel BH$ (cùng vuông góc với AC) $\Rightarrow \angle KOM = \angle BHA$ (góc có cạnh tương ứng song song) $MK \parallel AB$ (M, K là trung điểm BC và AC) $\Rightarrow \angle HAB = \angle OKM$ (góc có cạnh tương ứng song song) $\Rightarrow \triangle ABH$ đồng dạng với $\triangle MKO$ $\frac{MO}{AH} = \frac{MK}{AB} = \frac{1}{2}$ $\Rightarrow \frac{MO}{AH} = \frac{MI}{AI} = \frac{1}{2}$ và $\angle OMI = \angle HAI$ (so le trong) $\Rightarrow \triangle AIH$ đồng dạng với $\triangle MIO \Rightarrow \frac{IO}{IH} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{IO}{IH} = \frac{OM}{HA} = \frac{1}{2}$ $\Rightarrow \frac{IO^2}{IH^2} = \frac{OM^2}{HA^2} = \frac{IO^2 + OM^2}{IH^2 + HA^2} = \frac{1}{4} \Rightarrow \sqrt{\frac{IO^2 + OM^2}{IH^2 + HA^2}} = \frac{1}{2}$</p> 	
<p>b</p>	 <p>Giả sử $\frac{1}{OM} + \frac{1}{ON} = \frac{1}{a}$ (1) (a là số dương cho trước). Lấy điểm D trên Oy sao cho $OD = a$ thì $OD < ON$. Vẽ DI song song với Ox ($I \in$ đoạn MN). Lấy E trên Ox sao cho $OE = ID$. Khi đó $OEID$ là hình bình hành. Ta có $\frac{OE}{OM} + \frac{OD}{ON} = \frac{NI}{NM} + \frac{EI}{ON} = \frac{NI}{NM} + \frac{MI}{MN} = 1 \Rightarrow \frac{1}{ON} + \frac{OE}{OD \cdot OM} = \frac{1}{OD} = \frac{1}{a}$ (2) Từ (1) và (2) $\Rightarrow \frac{1}{OM} = \frac{OE}{OD \cdot OM} \Rightarrow \frac{OE}{OD} = 1 \Rightarrow OE = OD = a$ không đổi, mà $D \in Oy$; $E \in Ox$ nên D, E cố định. Mặt khác O cố định và $OEID$ là hình bình hành nên I cố định. Vậy d luôn đi qua I cố định (ĐPCM)</p>	
<p>Bài 5</p>	<p>Tìm x, y nguyên dương thỏa mãn: $2xy + x + y = 83$ $\Leftrightarrow 4xy + 2x + 2y + 1 = 167$ $\Leftrightarrow (2x+1)(2y+1) = 167$ Do x, y nguyên dương $\Rightarrow (2x+1); (2y+1) \in \mathbb{Z}$ $\Rightarrow (2x+1); (2y+1) \in U(167)$ Lập bảng tìm được $(x, y) = (0; 83); (83; 0)$.</p>	

Tìm x,y nguyên dương thỏa mãn: $2xy + x + y = 83$ $\Leftrightarrow 4xy + 2x + 2y + 1 = 167$ $\Leftrightarrow (2x+1)(2y+1) = 167$	
--	--

ĐỀ ÔN THI CHỌN HỌC SINH GIỎI DỰ THI CẤP HUYỆN
MÔN: TOÁN - LỚP 9

Thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề

Bài 1: (3 điểm)

Cho biểu thức $A = \frac{x^2 - 2x}{x^3 + 1} + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{1 + \sqrt{x+2}} + \frac{1}{1 - \sqrt{x+2}} \right)$

- Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa.
- Rút gọn biểu thức A.
- Tìm giá trị nhỏ nhất của A.

Bài 2: (6 điểm)

a) Giải phương trình: $x^2 + 2015x - 2014 = 2\sqrt{2017x - 2016}$.

b) Chứng minh rằng: $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \leq -2$ biết $x^3 + y^3 + 3(x^2 + y^2) + 4(x + y) + 4 = 0$ và $x, y > 0$.

c) Cho x, y, z thỏa mãn $\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right) : \left(\frac{1}{x+y+z} \right) = 1$.

Tính giá trị của biểu thức $B = (x^{21} + y^{21})(y^{11} + z^{11})(z^{2017} + x^{2017})$.

Bài 3: (4 điểm)

a) Với n chẵn ($n \in \mathbb{N}$) chứng minh rằng: $(20^n + 16^n - 3^n - 1)$ chia hết cho 323

b) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn: $(y+2)x^{2017} - y^2 - 2y - 1 = 0$

Bài 4: (4 điểm)

Cho ABC vuông ở C. Lấy D đối xứng C qua AB, CD cắt AB tại M, lấy điểm E đối xứng với A qua M.

a) Tứ giác ACED là hình gì? Vì sao?

b) Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của M trên BC và AC. Chứng minh rằng:

$$\frac{HM}{HK} \cdot \frac{MK}{MC} = \frac{CD}{4R}$$

Bài 5:(3 điểm)

Cho a, b, c là ba số dương thỏa mãn: $a + b + c = 1$. Chứng minh rằng:

$$\frac{c+ab}{a+b} + \frac{a+bc}{b+c} + \frac{b+ac}{a+c} \geq 2$$


.....**HẾT**.....

HƯỚNG DẪN CHẤM

Bài	Nội dung	Điểm
1a (1đ)	<p><i>a) Điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa:</i></p> $\begin{cases} x+2 \geq 0 \\ x^3+1 \neq 0 \\ \sqrt{x+2} \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -2 \\ x \neq -1 \\ x \neq -1 \end{cases}$	1,0đ
1b (1đ)	<p><i>b) Rút gọn biểu thức A</i></p> $A = \frac{x^2-2x}{x^3+1} + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{1+\sqrt{x+2}} + \frac{1}{1-\sqrt{x+2}} \right) = \frac{x(x-2)}{(x+1)(x^2-x+1)} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{1-(x+2)}$ $= \frac{x(x-2)}{(x+1)(x^2-x+1)} - \frac{1}{x+1} = \frac{x(x-2)-(x^2-x+1)}{(x+1)(x^2-x+1)}$ $= \frac{-(x+1)}{(x+1)(x^2-x+1)} = \frac{-1}{x^2-x+1}$	1,0đ
1c (1đ)	<p><i>c) Tìm giá trị nhỏ nhất của A.</i></p> $A = \frac{-1}{x^2-x+1} = \frac{-1}{(x-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}}$ <p>Ta có $(x-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}$ đạt giá trị nhỏ nhất khi $x = \frac{1}{2}$. Vậy: Giá trị nhỏ nhất của A là $-\frac{4}{3}$ khi $x = \frac{1}{2}$ $\Leftrightarrow$</p>	1,0đ
2a (2đ)	<p><i>a) Giải phương trình:</i> $x^2 + 2015x - 2014 = 2\sqrt{2017x - 2016}$ ĐK</p> $x \geq \frac{2016}{2017}$ $\Rightarrow x^2 - 2x + 1 + 2017x - 2016 - 2\sqrt{2017x - 2016} + 1 = 0$	1,0đ

	$\Leftrightarrow (x-1)^2 + (\sqrt{2017x-2016}-1)^2 = 0 \quad \Leftrightarrow \begin{cases} x-1=0 \\ \sqrt{2017x-2016}-1=0 \end{cases}$ $\Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ 2017x-2016=1 \Leftrightarrow x=1 \end{cases} \text{ (thỏa mãn điều kiện). Vậy } x=1 \text{ là nghiệm của phương trình đã cho.}$	
2b (2đ)	<p>Chứng minh: $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \leq -2$ biết $x^3 + y^3 + 3(x^2+y^2) + 4(x+y) + 4 = 0$ và $x, y > 0$.</p> <p>Ta có: $x^3 + y^3 + 3(x^2+y^2) + 4(x+y) + 4 = 0$ $\Leftrightarrow (x+y)(x^2-xy+y^2) + 2(x^2-xy+y^2) + (x^2+2xy+y^2) + 4(x+y) + 4 = 0$ $\Leftrightarrow (x^2-xy+y^2)(x+y+2) + (x+y+2)^2 = 0$ $\Leftrightarrow (x+y+2)(x^2-xy+y^2+x+y+2) = 0$ $\Leftrightarrow \frac{1}{2} \cdot (x+y+2)(2x^2-2xy+2y^2+2x+2y+4) = 0$ $\Leftrightarrow \frac{1}{2} \cdot (x+y+2) \cdot [(x-y)^2 + (x+1)^2 + (y+1)^2 + 2] = 0$ $\Leftrightarrow x+y+2=0 \Leftrightarrow x+y=-2$ mà $x, y > 0$ nên $x < 0, y < 0$</p>	1,0đ
	<p>Áp dụng BĐT CauChy ta có $\sqrt{(-x)(-y)} \leq \frac{(-x)+(-y)}{2} = \frac{-(x+y)}{2} = \frac{2}{2} = 1$</p> <p>Do đó $xy \leq 1$ suy ra $1 \leq \frac{1}{xy}$ hay $\frac{-2}{xy} \leq -2$ Mà $M = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{x+y}{xy} = \frac{-2}{xy}$</p> <p>Vậy $M = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \leq -2$ (đpcm)</p>	1,0đ
2c (2đ)	<p>a) Cho x, y, z thỏa mãn $\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right) : \left(\frac{1}{x+y+z}\right) = 1$</p> <p>Tính giá trị của biểu thức $B = (x^{21} + y^{21})(y^{11} + z^{11})(z^{2017} + x^{2017})$</p> <p>Ta có: $\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right) : \left(\frac{1}{x+y+z}\right) = 1 \Leftrightarrow \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right)(x+y+z) = 1$ $\Leftrightarrow (yz + xz + xy)(x+y+z) = xyz$ $\Leftrightarrow xyz + zy^2 + yz^2 + zx^2 + xyz + xz^2 + yx^2 + xy^2 + xyz = xyz$ $\Leftrightarrow (xyz + zx^2 + xy^2 + yx^2) + (zy^2 + yz^2 + xz^2 + xyz) = 0$ $\Leftrightarrow x(yz + zx + y^2 + yx) + z(y^2 + yz + xz + xy) = 0$</p>	1,0đ
	$\Leftrightarrow (yz + zx + y^2 + yx)(x+z) = 0 \Leftrightarrow (x+y)(y+z)(x+z) = 0$ $\Leftrightarrow \begin{cases} x = -y \\ y = -z \\ z = -x \end{cases}$ <p>Thay vào B tính được $B = 0$</p>	1,0đ
	<p>a) Với n chẵn ($n \in \mathbb{N}$) chứng minh rằng: $20^n + 16^n - 3^n - 1 : 323$</p>	

3a (2đ)	Ta có: $323=17.19$ $\bullet \quad 20^n + 16^n - 3^n - 1 = (20^n - 1) + (16^n - 3^n)$ $20^n - 1 \vdots 19$ $16^n - 3^n \vdots 19 \quad (n \text{ chẵn})$ Do đó $20^n + 16^n - 3^n - 1 \vdots 19 \quad (1)$	1,0đ
	$\bullet \quad 20^n + 16^n - 3^n - 1 = (20^n - 3^n) + (16^n - 1)$ $20^n - 3^n \vdots 17$ $16^n - 1 \vdots 17 \quad (n \text{ chẵn})$ Do đó $20^n + 16^n - 3^n - 1 \vdots 17 \quad (2)$ Mà $(17;19) = 1$ nên từ (1) và (2) suy ra $20^n + 16^n - 3^n - 1 \vdots 323$	1,0đ
3b (2đ)	$(y+2)x^{2017} - y^2 - 2y - 1 = 0$ b) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn: Nếu $y+2=0 \Leftrightarrow y=-2$ lúc đó phương trình có dạng $0x^{2017} - 1 = 0$ (vô nghiệm). $x^{2017} = \frac{y^2 + 2y + 1}{y + 2} = y + \frac{1}{y + 2}$ Nếu $y \neq -2$ thì ta có	1,0đ
	$\frac{1}{y+2} \text{ nguyên } \quad y+2 \in U(1) = \{-1; 1\}$ Vì x, y nguyên nên $y+2 = -1 \Rightarrow y = -3 \Rightarrow x^{2017} = -4$ (loại). Với $y+2 = 1 \Rightarrow y = -1 \Rightarrow x^{2017} = 0 \Leftrightarrow x = 0$ Vậy số nguyên x,y thỏa mãn đề bài là : $x=0, y=-1$	1,0đ

	<p>a) Vì $CD \perp AB \Rightarrow CM = MD$ Tứ giác ACED có AE cắt CD tại trung điểm của mỗi đường nên là HBH Mà $AE \perp CD \Rightarrow$ tứ giác ACED là hình thoi b) Vì tam giác ABC có AB là đường kính (O) nên ΔABC vuông tại C, suy ra tứ giác CHMK là hình chữ nhật Áp dụng hệ thức lượng vào các tam giác vuông ta có:</p> $MH.AC = MA.MC \Rightarrow MH = \frac{MA.MC}{AC}$ $\text{Tương tự ta có: } MK = \frac{MB.MC}{BC} \Rightarrow MH.MK = \frac{MA.MB.MC^2}{AC.BC}$ <p>Mà $MA.MB = MC^2$; $AC.BC = MC.AB$ (do ΔABC vuông tại C) $\Rightarrow MH.MK = \frac{MC^2.MC^2}{MC.AB} = \frac{MC^3}{AB} \Rightarrow \frac{MH.MK}{MC^2} = \frac{MC}{AB}$ Mà $MC = MK$ (do CHMK là hình chữ nhật) $\Rightarrow \frac{MH.MK}{HK.MC} = \frac{MC}{AB} = \frac{2MC}{2AB} = \frac{CD}{4R}$ <p>Vậy: $\frac{HM}{HK} \cdot \frac{MK}{MC} = \frac{CD}{4R}$ (đpcm)</p> </p>	 <p>1,0đ</p>
<p>4 (4đ)</p> <p>5 (3đ)</p>	<p>Vì $a + b + c = 1$ nên $c + ab = c(a + b + c) + ab = (c + a)(c + b)$ $a + bc = a(a + b + c) + bc = (b + a)(b + c)$ $b + ac = b(a + b + c) + ac = (a + b)(a + c)$ nên BĐT cần chứng minh tương đương với:</p> $\frac{(c+a)(c+b)}{a+b} + \frac{(b+a)(b+c)}{a+c} + \frac{(a+b)(a+c)}{b+c} \geq 2$ $\Leftrightarrow \sqrt{\left(\frac{(c+a)(c+b)}{a+b}\right)^2} + \sqrt{\left(\frac{(b+a)(b+c)}{a+c}\right)^2} + \sqrt{\left(\frac{(a+b)(a+c)}{b+c}\right)^2} \geq 2$ <p>Mặt khác dễ thấy: $x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + yz + zx$, với mọi x, y, z (*) Áp dụng (*) ta có: $VT \geq b + c + a + b + c + a = 2$</p> <p>Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c = \frac{1}{3} \Rightarrow$ đpcm</p>	<p>2,0đ</p>

ĐỀ ÔN THI CHỌN HỌC SINH GIỎI DỰ THI CẤP HUYỆN
MÔN: TOÁN - LỚP 9

Thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề
(Đề thi số 04)

Bài 1: (6 điểm)

1. Cho $M = \left(1 - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}\right) : \left(\frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2} + \frac{\sqrt{x}+2}{3-\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}+2}{x-5\sqrt{x}+6}\right)$

a) Rút gọn M

b) Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức M nhận giá trị là số nguyên

2. Tính giá trị của biểu thức P

$$P = 3x^{2013} + 5x^{2011} + 2006 \text{ với } x = \sqrt{6 + 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{3 - \sqrt{\sqrt{2} + 2\sqrt{3} + \sqrt{18 - 8\sqrt{2}}}} - \sqrt{3}}$$

Bài 2: (4 điểm)

a) Giải phương trình: $\sqrt{(1+x^2)^3} - 4x^3 = 1 - 3x^4$

b) Tìm tất cả các số nguyên n sao cho $n^2 + 2014$ là một số chính phương.

Bài 3: (4 điểm)

a) Cho đường thẳng: $(m-2)x + (m-1)y = 1$ (m là tham số) (1)

CMR: đường thẳng (1) luôn đi qua một điểm cố định với mọi giá trị của m

b) Chứng minh rằng: nếu a, b, c là ba số thỏa mãn $a + b + c = 2013$

và $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{2013}$ thì một trong ba số phải có một số bằng 2013

Bài 4: (5 điểm)

Cho hai đoạn thẳng AB và CD vuông góc với nhau tại trung điểm O của mỗi đoạn. Lấy M trong góc AOC sao cho $OM = OA = OB$. Gọi K và H lần lượt là hình chiếu của M trên CD và AB.

a) Tính $\sin^2 \angle MBA + \sin^2 \angle MAB + \sin^2 \angle MCD + \sin^2 \angle MDC$

b) Chứng minh: $OK^2 = AH(2R - AH)$

c) Tìm vị trí điểm H để giá trị của: $P = MA \cdot MB \cdot MC \cdot MD$ lớn nhất.

Bài 5: (1 điểm)

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{4a}{b+c-a} + \frac{9b}{a+c-b} + \frac{16c}{a+b-c}$

(Trong đó a, b, c là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác)

- Hết -

ĐÁP ÁN THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9

Đề số 04.

Bài 1:

b) (4,5đ)

ĐKXĐ: $x \geq 0; x \neq 4; x \neq 9$ (*)

1) Rút gọn M: Với $x \geq 0; x \neq 4; x \neq 9$

8Vây $M = \frac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x} + 1}$ (với $x \geq 0; x \neq 4; x \neq 9$) (*) (2,5đ)

$$2) \quad M = \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1} = \frac{\sqrt{x}+1-3}{\sqrt{x}+1} = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+1} - \frac{3}{\sqrt{x}+1} = 1 - \frac{3}{\sqrt{x}+1} \quad (0,75đ)$$

Biểu thức M có giá trị nguyên khi và chỉ khi: $3: \sqrt{x}+1 \Leftrightarrow \sqrt{x}+1 \in U(3)$

$$U(3) \in \{\pm 1; \pm 3\} \quad \forall x \geq 0 \Rightarrow \sqrt{x}+1 \geq 1 \Rightarrow \sqrt{x}+1 \geq 1$$

$$\text{Nên } \sqrt{x}+1 \in \{1; 3\}$$

Xảy ra các trường hợp sau: (0,5đ)

$$\sqrt{x}+1=1 \Leftrightarrow \sqrt{x}=0 \Leftrightarrow x=0 \quad (\text{TMĐK } (*))$$

$$\sqrt{x}+1=3 \Leftrightarrow \sqrt{x}=2 \Leftrightarrow x=4$$

(không TMĐK (*) loại) (0,25đ)

Vậy $x=0$ thì M nhận giá trị nguyên.

$$b) \quad x = \sqrt{6+2\sqrt{2}} \cdot \sqrt{3-\sqrt{2}} + \sqrt{18-8\sqrt{2}} - \sqrt{3}$$

$$\text{Có } \sqrt{18-8\sqrt{2}} = \sqrt{(4-\sqrt{2})^2} = |4-\sqrt{2}| = 4-\sqrt{2} \quad (0,5đ)$$

$$\sqrt{2} + 2\sqrt{3} + 4 - \sqrt{2} = \sqrt{2\sqrt{3}+4} = \sqrt{(\sqrt{3}+1)^2} = |\sqrt{3}+1| \quad (0,25đ)$$

$$x = \sqrt{6+2\sqrt{2}} \cdot \sqrt{3-\sqrt{2}} + 1 = \sqrt{6+2\sqrt{2}} \cdot \sqrt{2-\sqrt{3}} = \sqrt{6+2\sqrt{4-2\sqrt{3}}} - \sqrt{3}$$

$$x = \sqrt{6+2\sqrt{(\sqrt{3}-1)^2}} - \sqrt{3} = \sqrt{6+2\sqrt{3}-1} - \sqrt{3} = \sqrt{4+2\sqrt{3}} - \sqrt{3}$$

$$x = \sqrt{(\sqrt{3}+1)^2} - \sqrt{3} = |\sqrt{3}+1| - \sqrt{3} = \sqrt{3}+1 - \sqrt{3} = 1 \quad (0,75đ)$$

$$\text{Với } x=1. \text{ Ta có } P = 3 \cdot 1^{2013} + 5 \cdot 1^{2011} + 2006 = 3 + 5 + 2006 = 2014$$

Vậy với $x=1$ thì $P=2014$

Bài 2:

a (2,5đ)

$$\sqrt{(1+x^2)^3} - 4x^3 = 1 - 3x^4 \quad (1)$$

$$\text{Ta có: } 4x^3 + 1 - 3x^4 = -3x^4 + 4x^3 + x^2 - x^2 + 1 = 1 + x^2 - x^2(3x^2 - 4x + 1) \quad (2)$$

Thay (2) vào (1) ta có:

$$(1) \Leftrightarrow \sqrt{(1+x^2)^3} - (1+x^2) = -x^2(3x^2 - 4x + 1) \quad (3) \quad (0,5đ)$$

Đặt $y = \sqrt{1+x^2}$, với $y \geq 1$. Suy ra $x^2 = y^2 - 1$

$$\text{Thay vào (3): } y^3 - y^2 = (1 - y^2)(3x^2 - 4x + 1) \quad (0,5đ)$$

$$\Leftrightarrow y^2(y-1) - (1-y^2)(3x^2 - 4x + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (y-1)[y^2 + (y+1)(3x^2 - 4x + 1)] = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} y-1=0 \\ y+(y+1)(3x^2 - 4x + 1)=0 \end{cases}$$

* Với $y=1$ thì $x=0$ thỏa mãn phương trình.

$$* \text{ Với } y \neq 1 \text{ và } y \geq 1, \text{ ta có: } y^2 + (y+1)(3x^2 - 4x + 1) = 0 \quad (4) \quad (1đ)$$

$$\text{Vì } 3x^2 - 4x + 1 = 3\left(x - \frac{2}{3}\right)^2 - \frac{1}{3} \geq -\frac{1}{3} \text{ và } y > 1 \text{ thay vào vế trái của (4)}$$

$$y^2 - (y+1)\frac{1}{3} = \left(y - \frac{1}{6}\right)^2 - \frac{13}{36} > \left(1 - \frac{1}{6}\right)^2 - \frac{13}{36} = \frac{1}{3} \text{ lớn hơn.} \quad (0,25đ)$$

Do đó (4) vô nghiệm

Vậy phương trình (1) có nghiệm duy nhất $x = 0$ (0,25đ)

$$n^2 + 2014 = k^2 \quad (k^2 \in \mathbb{N})$$

$$b_+ \quad (1,5đ) \quad \text{Giả sử } \Leftrightarrow 2014 = k^2 - n^2 \Leftrightarrow 2014 = (k+n)(k-n) \quad (1) \quad (0,5đ)$$

Suy ra $(k+n)$ và $(k-n) = 2k$ là số chẵn nên $(k+n)$ và $(k-n)$ cùng tính chẵn lẻ

Do 2014 là số chẵn nên $(k+n)$ và $(k-n)$ đều là số chẵn (0,5đ)

$$\Rightarrow (k+n)(k-n) : 4$$

Khi đó từ (1) suy ra ta lại có $2014 : 4$ (điều này vô lí)

Vậy không có số nguyên n nào để $n^2 + 2014$ là số chính phương (0,5đ)

Bài 3:

a) (2đ) Điều kiện cần và đủ để đường thẳng $(m-2)x + (m-1)y = 1$ đi qua điểm

cố định $N(x_0; y_0)$ với mọi m là : (0,5đ)

$$(m-2)x_0 + (m-1)y_0 = 1 \quad \text{với mọi } m$$

$$\Leftrightarrow mx_0 - 2x_0 + my_0 - y_0 - 1 = 0 \quad \text{với mọi } m$$

$$\Leftrightarrow (x_0 + y_0)m - (2x_0 + y_0 + 1) = 0 \quad \text{với mọi } m \quad (0,75đ)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_0 + y_0 = 0 \\ 2x_0 + y_0 + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = -1 \\ y_0 = 1 \end{cases} \quad (0,5đ)$$

Vậy các đường thẳng (1) luôn đi qua điểm cố định $N(-1; 1)$ (0,25đ)

b) Điều kiện $a, b, c \neq 0$

$$\text{Từ } \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{a+b+c} \quad \text{Suy ra } (bc+ac+ab)(a+b+c) - abc = 0 \quad (0,25đ)$$

$$\Leftrightarrow (a+b)(b+c)(c+a) = 0 \Leftrightarrow a+b=0 \text{ hoặc } b+c=0 \text{ hoặc } c+a=0 \quad (0,5đ)$$


Nếu $a+b=0$ mà $a+b+c=2013$ nên $c=2013$

Nếu $b+c=0$ mà $a+b+c=2013$ nên $a=2013$

Nếu $a+c=0$ mà $a+b+c=2013$ nên $b=2013$ (0,5đ)

Vậy 1 trong các số a, c, b bằng 2013 (0,25đ)

Bài 4:



(0,5đ)

a) Vì M nằm trong góc AOC và OM = OA = OB nên các tam giác BMA và CMD vuông tại M nên:

$$\sin^2 \angle MBA + \sin^2 \angle MAB + \sin^2 \angle MCD + \sin^2 \angle MDC =$$

$$(\sin^2 \angle MBA + \cos^2 \angle MBA) + (\sin^2 \angle MCD + \cos^2 \angle MCD) = 1 + 1 = 2 \quad (1,5đ)$$

b) Chứng minh: $OK^2 = AH(2R - AH)$

Thật vậy: KOHM là hình chữ nhật nên: OK = MH

Mà $MH^2 = HA.HB$ (Hệ thức lượng trong tam giác vuông MAB có MH đường cao) (1đ)

và $BH = AB - AH = 2R - AH$

Suy ra: $OK^2 = MH^2 = AH(2R - AH)$ (1đ)

c) $P = MA \cdot MB \cdot MC \cdot MD = AB \cdot MH \cdot CD \cdot MK = 4R^2 \cdot OH \cdot MH$ (Vì MK = OH) (0,25đ)

$$\text{Mà } OH \cdot MH \leq \frac{OH^2 + MH^2}{2} = \frac{OM^2}{2} = \frac{R^2}{2} \quad (\text{Pitago}) \quad (0,25đ)$$

$$\text{Vậy } P \leq 4R^2 \cdot \frac{R^2}{2} = 2R^4 \quad \text{đẳng thức xảy ra} \Leftrightarrow MH = OH \quad (0,25đ)$$

$$\Leftrightarrow OH = \frac{R\sqrt{2}}{2} \quad (0,25đ)$$

Bài 5: Đặt $x = b + c - a$, $y = a + c - b$, $z = a + b - c$ thì $x, y, z > 0$,

$$\begin{cases} b + c - a = x \\ a + c - b = y \\ a + b - c = z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{z + y}{2} \\ b = \frac{x + z}{2} \\ c = \frac{x + y}{2} \end{cases}$$

Ta có

(0,25đ)

Vậy

$$P = \frac{2y + 2z}{x} + \frac{9z + 9x}{2y} + \frac{8x + 8y}{z}$$

$$= \left(\frac{2y}{x} + \frac{9x}{2y} \right) + \left(\frac{2z}{x} + \frac{8x}{z} \right) + \left(\frac{9z}{2y} + \frac{8y}{z} \right) \geq 2\sqrt{9} + 2\sqrt{16} + 2\sqrt{36} = 26 \quad (0,25đ)$$

$$\text{Dấu đẳng thức xảy ra khi } \begin{cases} \frac{2y}{x} = \frac{9x}{2y} \\ \frac{2z}{x} = \frac{8x}{z} \\ \frac{9z}{2y} = \frac{8y}{z} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4y^2 = 9x^2 \\ 2z^2 = 8x^2 \\ 9z^2 = 8y^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{z}{2} \\ y = \frac{3}{2}x \\ z = \frac{4}{3}y \end{cases} \quad (0,25đ)$$

$$\text{Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức P là 26 khi và chỉ khi } \begin{cases} x = \frac{z}{2} \\ y = \frac{3}{2}x \\ z = \frac{4}{3}y \end{cases} \quad (0,25đ)$$

ĐỀ ÔN THI CHỌN HỌC SINH GIỎI DỰ THI CẤP HUYỆN
MÔN: TOÁN - LỚP 9

Thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề
(Đề thi số 05)

Bài 1: (4,0 điểm) Cho biểu thức $P = \frac{3x + \sqrt{9x} - 3}{x + \sqrt{x} - 2} - \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} + 2} - \frac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x} - 1}$

a) Tìm ĐKXĐ và rút gọn P.

b) Tìm x để $P < 0$.

Bài 2: (4,0 điểm)

a) Giải phương trình: $x^2 - 7x = 6\sqrt{x+5} - 30$.

b) Cho hai số dương a và b. Chứng minh rằng $(a+b) \cdot \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) \geq 4$.

Bài 3: (4,0 điểm)

a) Tìm số tự nhiên n sao cho $A = n^2 + n + 6$ là số chính phương.

b) Cho các số nguyên dương x, y, z thỏa mãn $x^2 + y^2 = z^2$.

Chứng minh $A = xy$ chia hết cho 12.

Bài 4: (6,0 điểm)

Cho tam giác ABC nhọn, ba đường cao AA', BB', CC'.

a) Chứng minh $\triangle AC'C \sim \triangle AB'B$

b) Trên BB' lấy M, trên CC' lấy N sao cho $\angle AMC = \angle ANB = 90^\circ$.

Chứng minh rằng $AM = AN$.

c) Gọi S, S' lần lượt là diện tích của tam giác ABC và tam giác A'B'C'.

Chứng minh rằng $\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C = 1 - \frac{S'}{S}$

Bài 5: (2,0 điểm) Cho x, y là các số dương thỏa mãn $x + y \geq \frac{34}{35}$. Tìm giá


trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$A = 3x + 4y + \frac{2}{5x} + \frac{8}{7y}$$

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 9

Bài	Nội dung cần đạt	Điểm
1	Câu a: (2,0 điểm) - Tìm được ĐKXD: $x \geq 0, x \neq 1$ - Ta có $\frac{3x + \sqrt{9x} - 3}{x + \sqrt{x} - 2} - \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} + 2} - \frac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x} - 1}$ $= \frac{3x + 3\sqrt{x} - 3}{(\sqrt{x} + 2)(\sqrt{x} - 1)} - \frac{(\sqrt{x} + 1)(\sqrt{x} - 1)}{(\sqrt{x} + 2)(\sqrt{x} - 1)} - \frac{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}{(\sqrt{x} + 2)(\sqrt{x} - 1)}$ $= \frac{3x + 3\sqrt{x} - 3 - x + 1 - x + 4}{(\sqrt{x} + 2)(\sqrt{x} - 1)}$ $= \frac{x + 3\sqrt{x} + 2}{(\sqrt{x} + 2)(\sqrt{x} - 1)}$ $= \frac{(\sqrt{x} + 2)(\sqrt{x} + 1)}{(\sqrt{x} + 2)(\sqrt{x} - 1)} = \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 1}$	0,5
		0,5
		0,5
		0,5
	Câu b: (2,0 điểm) - Ta có: $P < 0$ $\Rightarrow \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 1} < 0$ $\Rightarrow \sqrt{x} - 1 < 0 \text{ (do } \sqrt{x} + 1 > 0)$ $\Rightarrow \sqrt{x} < 1$ $\Rightarrow x < 1$ - Kết hợp với ĐKXD ta được: Với $0 \leq x < 1$ thì $P < 0$.	0,5
		1,0
		0,5
	Câu a: (2,0 điểm) Giải phương trình: $x^2 - 7x = 6\sqrt{x+5} - 30$. - ĐKXD $x \geq -5$. - Ta có	0,25
		1,0

	$x^2 - 7x = 6\sqrt{x+5} - 30$ $\Leftrightarrow x^2 - 8x + 16 + x + 5 - 6\sqrt{x+5} + 9 = 0$ $\Leftrightarrow (x-4)^2 + (\sqrt{x+5} - 3)^2 = 0$ <p>- Vì $(x-4)^2 \geq 0; (\sqrt{x+5} - 3)^2 \geq 0$ nên</p> $\begin{cases} (x-4)^2 = 0 \\ (\sqrt{x+5} - 3)^2 = 0 \end{cases}$ $\Leftrightarrow \begin{cases} x-4 = 0 \\ \sqrt{x+5} - 3 = 0 \end{cases}$ $\Leftrightarrow x = 4$ <p>(thỏa mãn ĐKXD). Nghiệm của phương trình đã cho là $x = 4$</p>	0,5 0,25
2	<p>Câu b: (2,0 điểm)</p> <p>Cho hai số dương a và b. Chứng minh rằng $(a+b) \cdot \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) \geq 4$</p> <p>- Ta có $(a+b) \cdot \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) = 2 + \frac{a}{b} + \frac{b}{a}$</p> <p>- Vì a, b > 0 nên áp dụng bất đẳng thức cosi cho hai số dương</p> $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2\sqrt{\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a}} = 2 \quad (a+b) \cdot \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) \geq 4$ <p>. Do đó</p>	0,75 0,75 0,5
3	<p>Câu a: (2,0 điểm)</p> <p>Tìm số tự nhiên n sao cho $A = n^2 + n + 6$ là số chính phương</p> <p>- Để A là số chính phương thì $A = n^2 + n + 6 = a^2$ ($a \in \mathbb{N}$)</p> <p>- Ta có: $n^2 + n + 6 = a^2 \Leftrightarrow x = 5$</p> <p>- Vì a, n là các số tự nhiên nên $(2a + 2n + 1)$ là số tự nhiên và $2a + 2n + 1 > 2a - 2n - 1$. Do đó</p> $\begin{cases} 2a + 2n + 1 = 23 \\ 2a - 2n - 1 = 1 \end{cases}$ $\Leftrightarrow \begin{cases} 4a = 24 \\ 4n = 20 \end{cases}$ $\Leftrightarrow \begin{cases} a = 6 \\ n = 5 \end{cases}$ <p>- Vậy $n = 5$</p>	0,25 0,5 0,5 0,25
	<p>Câu b: (2,0 điểm)</p> <p>Cho các số nguyên dương x, y, z thỏa mãn $x^2 + y^2 = z^2$</p> <p>Chứng minh $A = xy$ chia hết cho 12</p> <p>- Xét phép chia của xy cho 3</p> <p>Nếu xy không chia hết cho 3 thì</p>	1,0

	$\begin{cases} x \equiv \pm 1 \pmod{3} \\ y \equiv \pm 1 \pmod{3} \end{cases}$ $\Rightarrow \begin{cases} x^2 \equiv 1 \pmod{3} \\ y^2 \equiv 1 \pmod{3} \end{cases}$ $\Rightarrow z^2 = x^2 + y^2 \equiv 2 \pmod{3}$ <p>(Vô lí)</p> <p>Vậy xy chia hết cho 3 (1)</p> <p>- Xét phép chia của xy cho 4</p> <p>Nếu xy không chia hết cho 4 thì</p> $\begin{cases} x \equiv \pm 1 \pmod{4} \\ y \equiv \pm 1 \pmod{4} \end{cases}$ $\Rightarrow \begin{cases} x^2 \equiv 1 \pmod{4} \\ y^2 \equiv 1 \pmod{4} \end{cases}$ $\Rightarrow z^2 = x^2 + y^2 \equiv 2 \pmod{4}$ <p>TH1: (vô lí)</p> <p>TH2: Trong hai số x,y một số chia 4 dư 2, một số chia 4 dư 1 hoặc -1. Không mất tính tổng quát giả sử</p> $\begin{cases} x \equiv \pm 1 \pmod{4} \\ y \equiv 2 \pmod{4} \end{cases}$ $\Rightarrow \begin{cases} x^2 \equiv 1 \pmod{8} \\ y^2 \equiv 4 \pmod{8} \end{cases}$ $\Rightarrow z^2 = x^2 + y^2 \equiv 5 \pmod{8}$ <p>(vô lí)</p> <p>- Vậy xy chia hết cho 4 (2)</p> <p>- Từ (1) và (2): Vậy xy chia hết cho 12</p>	<p>0,5</p> <p>0,5</p>
4	 <p>Câu a (2,0 điểm): Chứng minh $\triangle AC'C \square \triangle AB'B$</p>	

	<p>- Xét $\triangle AC'C; \triangle AB'B$ có Góc A chung $\angle B' = \angle C' = 90^\circ$ Suy ra: $\triangle AC'C \sim \triangle AB'B$</p>	2,0
	<p>Câu b (2,0 điểm): Chứng minh $AM = AN$.</p> <p>- Xét $\triangle AMC$ vuông tại M đường cao MB' $AM^2 = AB' \cdot AC$</p> <p>- Xét $\triangle ANB$ vuông tại N đường cao NC' $AN^2 = AC' \cdot AB$</p> <p>- Theo câu a ta có $AB' \cdot AC = AC' \cdot AB$ - Do đó: $AM = AN$</p>	0,5 0,5 0,5 0,5
	<p>Câu c: (2,0 điểm) Chứng minh $\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C = 1 - \frac{S'}{S}$</p> <p>- Chỉ ra được $\frac{S_{AB'C'}}{S_{ABC}} = \left(\frac{AB'}{AB}\right)^2 = \cos^2 A$</p> <p>$\frac{S_{B'A'C'}}{S_{ABC}} = \cos^2 B$</p> <p>- Tương tự $\frac{S_{C'A'B'}}{S_{ABC}} = \cos^2 C$</p> <p>- Do đó:</p> $\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C = \frac{S_{AB'C'} + S_{B'A'C'} + S_{C'A'B'}}{S_{ABC}}$ $= \frac{S_{ABC} - S_{A'B'C'}}{S_{ABC}} = 1 - \frac{S'}{S}$	0,5 0,5 0,5 0,5
5	<p>Cho x, y là các số dương thỏa mãn $x + y \geq \frac{34}{35}$</p> <p>Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A = 3x + 4y + \frac{2}{5x} + \frac{8}{7y}$</p> <p>- Ta có:</p> $A = 3x + 4y + \frac{2}{5x} + \frac{8}{7y}$ $= \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y + \frac{2}{5x} + \frac{5x}{2} + \frac{8}{7y} + \frac{7y}{2}$ <p>- Áp dụng bất đẳng thức cosi cho hai số dương ta được</p> $\frac{2}{5x} + \frac{5x}{2} \geq 2\sqrt{\frac{2 \cdot 5x}{5x \cdot 2}} = 2$ $\frac{8}{7x} + \frac{7x}{2} \geq 2\sqrt{\frac{8 \cdot 7x}{7x \cdot 2}} = 4$ <p>- Vì $x + y \geq \frac{34}{35}$ nên $A \geq \frac{1}{2} \cdot \frac{34}{35} + 2 + 4 = 6\frac{17}{35}$</p>	0,5 0,5 0,25 0,5

	$\begin{cases} \frac{2}{5x} = \frac{5x}{2} \\ \frac{8}{7y} = \frac{7y}{2} \\ x + y = \frac{34}{35} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{2}{5} \\ y = \frac{4}{7} \end{cases}$ <p>- Dấu "=" xảy ra khi</p> <p>- A đạt giá trị nhỏ nhất là $6\frac{17}{35}$ khi $\begin{cases} x = \frac{2}{5} \\ y = \frac{4}{7} \end{cases}$</p>	0,25
--	---	------

ĐỀ ÔN THI CHỌN HỌC SINH GIỎI DỰ THI CẤP HUYỆN
MÔN: TOÁN - LỚP 9

Thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề
(Đề thi số 05)

Bài 1: (4,0 điểm)

Cho biểu thức $P = \frac{x\sqrt{x} - 3}{x - 2\sqrt{x} - 3} - \frac{2(\sqrt{x} - 3)}{\sqrt{x} + 1} + \frac{\sqrt{x} + 3}{3 - \sqrt{x}}$

- Rút gọn biểu thức P.
- Tính giá trị của P với $x = 14 - 6\sqrt{5}$
- Tìm GTNN của P.

Bài 2: (3,0 điểm)

a) Cho biểu thức $A = x - 2\sqrt{xy} + 3y - 2\sqrt{x} + 1$

Tìm giá trị nhỏ nhất mà A có thể đạt được.

b) Tìm số tự nhiên n sao cho $n^2 + 17$ là số chính phương?

Bài 3: (4,0 điểm)

Giải các phương trình sau:

a) $\sqrt{1-x} + \sqrt{4+x} = 3$

b) $x^2 + 4x + 5 = 2\sqrt{2x+3}$

Bài 4: (3,0 điểm)

a) Tìm x; y thỏa mãn: $2(x\sqrt{y-4} + y\sqrt{x-4}) = xy$

b) Cho a; b; c là các số thuộc đoạn $[-1; 2]$ thỏa mãn: $a^2 + b^2 + c^2 = 6$ hãy chứng minh rằng: $a + b + c \geq 0$

Bài 5: (6,0 điểm)

Cho tam giác ABC nhọn; các đường cao AK; BD; CE cắt nhau tại H.

a) Chứng minh: $\frac{KC}{KB} = \frac{AC^2 + CB^2 - BA^2}{CB^2 + BA^2 - AC^2}$

b) Giả sử: $HK = \frac{1}{3} AK$. Chứng minh rằng: $\tan B \cdot \tan C = 3$

c) Giả sử $S_{ABC} = 120 \text{ cm}^2$ và $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Hãy tính diện tích tam giác ADE?

- Hết -

ĐÁP ÁN ĐỀ 05**Câu 1: (4 điểm)**

a) Rút gọn biểu thức $A = \frac{2\sqrt{x}-9}{x-5\sqrt{x}+6} - \frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2} - \frac{2\sqrt{x}+1}{3-\sqrt{x}}$

ĐKXD: $x \neq 4; x \neq 9$

$$\begin{aligned} A &= \frac{2\sqrt{x}-9}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}-3)} - \frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2} + \frac{2\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-3} = \frac{2\sqrt{x}-9-x+9+2x-3\sqrt{x}-2}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}-3)} = \frac{x-\sqrt{x}-2}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}-3)} \\ &= \frac{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-2)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}-3)} = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-3} \end{aligned}$$

b) Cho x, y, z thỏa mãn: $xy + yz + xz = 1$.

Hãy tính: $A = x\sqrt{\frac{(1+y^2)(1+z^2)}{(1+x^2)}} + y\sqrt{\frac{(1+z^2)(1+x^2)}{(1+y^2)}} + z\sqrt{\frac{(1+x^2)(1+y^2)}{(1+z^2)}}$

Gợi ý: $xy + yz + xz = 1$

$\Leftrightarrow 1 + x^2 = xy + yz + xz + x^2 = y(x+z) + x(x+z) = (x+z)(x+y)$

Tương tự: $1 + y^2 = \dots; 1 + z^2 = \dots$

Câu 2: (3 điểm)

a) Cho hàm số: $f(x) = (x^3 + 12x - 31)^{2018}$

Tính $f(a)$ tại $a = \sqrt[3]{16-8\sqrt{5}} + \sqrt[3]{16+8\sqrt{5}}$

b) Tìm số tự nhiên n sao cho $n^2 + 17$ là số chính phương?

Giải

a) Từ $a = \sqrt[3]{16-8\sqrt{5}} + \sqrt[3]{16+8\sqrt{5}}$
 $\Rightarrow a^3 = 32 + 3\sqrt[3]{(16-8\sqrt{5})(16+8\sqrt{5})} \left[\sqrt[3]{16+8\sqrt{5}} + \sqrt[3]{16-8\sqrt{5}} \right] = 32 - 12a$ nên $a^3 + 12a = 32$

Vậy $f(a) = 1$

b/ Giả sử: $n^2 + 17 = k^2$ ($k \in \mathbb{Z}$) và $k > n \Rightarrow (k-n)(k+n) = 17 \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} k-n=1 \\ k+n=17 \end{cases} \Rightarrow n=8$$

Vậy với $n = 8$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 3: (4 điểm)

Giải các phương trình sau:

a/ $\sqrt{1-x} + \sqrt{4+x} = 3$

b/ $x^2 + 4x + 5 = 2\sqrt{2x+3}$

Giải

a) ĐK: $-4 \leq x \leq 1$

Bình phương 2 vế: $1-x+4+x+2\sqrt{(1-x)(4+x)} = 9 \Leftrightarrow \sqrt{(1-x)(4+x)} = 2$

$$\Leftrightarrow 4-3x-x^2 = 4 \Leftrightarrow x(x+3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ x=-3 \end{cases} \text{ (thỏa mãn)}$$

Vậy phương trình có 2 nghiệm: $x = 0$; $x = -3$

b) $x^2 + 4x + 5 = 2\sqrt{2x+3}$. ĐKXD: $x \geq \frac{-3}{2}$

$$\Leftrightarrow (x^2 + 2x + 1) + (2x + 3 - 2\sqrt{2x+3} + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (x+1)^2 + (\sqrt{2x+3} - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x+1=0 \\ \sqrt{2x+3}=1 \end{cases} \Rightarrow x=-1$$

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất $x = -1$

Câu 4: (3 điểm)

a/ Tìm x ; y thỏa mãn: $2(x\sqrt{y-4} + y\sqrt{x-4}) = xy$

b/ Cho a ; b ; c là các số thuộc đoạn $[-1; 2]$ thỏa mãn: $a^2 + b^2 + c^2 = 6$ hãy chứng minh rằng: $a + b + c \geq 0$

Giải

a/ $2(x\sqrt{y-4} + y\sqrt{x-4}) = xy \Leftrightarrow x \cdot 2 \cdot \sqrt{y-4} + y \cdot 2 \cdot \sqrt{x-4} = xy$

Xét VP = $x \cdot 2 \cdot \sqrt{y-4} + y \cdot 2 \cdot \sqrt{x-4}$ theo BĐT cosi:

$$2\sqrt{y-4} \leq \frac{4+y-4}{2} = \frac{y}{2}; 2\sqrt{x-4} \leq \frac{4+x-4}{2} = \frac{x}{2} \text{ vậy VP} \leq xy = \text{VT}$$

$$\text{Dấu} = \text{xảy ra khi: } \begin{cases} \sqrt{x-4} = 2 \\ \sqrt{y-4} = 2 \end{cases} \Rightarrow x = y = 8$$

b/ Do a ; b ; c thuộc đoạn $[-1; 2]$ nên $a + 1 \geq 0$; $a - 2 \leq 0$ nên $(a + 1)(a - 2) \leq 0$

$$\text{Hay: } a^2 - a - 2 \leq 0 \Rightarrow a^2 \leq a + 2$$

Tương tự: $b^2 \leq b + 2$; $c^2 \leq c + 2$

Ta có: $a^2 + b^2 + c^2 \leq a + b + c + 6$ theo đầu bài: $a^2 + b^2 + c^2 = 6$ nên: $a + b + c \geq 0$

Câu 5: (6 điểm)

Cho tam giác ABC nhọn; các đường cao AK; BD; CE cắt nhau tại H.

a/ Chứng minh: $\frac{KC}{KB} = \frac{AC^2 + CB^2 - BA^2}{CB^2 + BA^2 - AC^2}$

b/ Giả sử: $HK = \frac{1}{3} AK$. Chứng minh rằng: $\tan B \cdot \tan C = 3$

c/ Giả sử $S_{ABC} = 120 \text{ cm}^2$ và $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Hãy tính diện tích tam giác ADE?

Giải

a/ Sử dụng định lý pytago:

$$\frac{AC^2 + CB^2 - BA^2}{CB^2 + BA^2 - AC^2} = \frac{AK^2 + KC^2 + (BK + CK)^2 - AB^2}{(BK + CK)^2 + BA^2 - (AK + KC)^2}$$

$$= \frac{2CK^2 + 2BK \cdot CK}{2BK^2 + 2BK \cdot CK} = \frac{2CK(CK + BK)}{2BK(BK + CK)} = \frac{CK}{BK}$$

b/ Ta có: $\tan B = \frac{AK}{BK}$; $\tan C = \frac{AK}{CK}$

Nên: $\tan B \tan C = \frac{AK^2}{BK \cdot CK} \quad (1)$

Mặt khác ta có: $\angle B = \angle HKC$ mà: $\tan \angle HKC = \frac{KC}{KH}$

Nên $\tan B = \frac{KC}{KH}$ tương tự $\tan C = \frac{KB}{KH} \Rightarrow \tan B \cdot \tan C = \frac{KB \cdot KC}{KH^2} \quad (2)$


Từ (1)(2) $\Rightarrow (\tan B \cdot \tan C)^2 = \left(\frac{AK}{KH} \right)^2$

Theo gt: $HK = \frac{1}{3} AK \Rightarrow \tan B \cdot \tan C = 3$

c/ Ta chứng minh được: $\triangle ABC$ và $\triangle ADE$ đồng dạng vậy: $\frac{S_{ABC}}{S_{ADE}} = \left(\frac{AB}{AD} \right)^2 \quad (3)$

Mà $\widehat{BAC} = 60^\circ$ nên $\angle ABD = 30^\circ \Rightarrow AB = 2AD \quad (4)$

Từ (3)(4) ta có: $\frac{S_{ABC}}{S_{ADE}} = 4 \Rightarrow S_{ADE} = 30(\text{cm}^2)$



ĐỀ ÔN THI CHỌN HỌC SINH GIỎI DỰ THI CẤP HUYỆN MÔN: TOÁN - LỚP 9

Thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề
(Đề thi số 06)

Câu 1. (4,0 điểm):

$$A = \left(\frac{3x + \sqrt{9x} - 3}{x + \sqrt{x} - 2} + \frac{1}{\sqrt{x} - 1} + \frac{1}{\sqrt{x} + 2} - 2 \right) : \frac{1}{x - 1}$$

Cho biểu thức

- 1) Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa.
- 2) Rút gọn biểu thức A.

- 3) Tìm giá trị của x để $\frac{2}{A}$ là số tự nhiên.

Câu 2. (4,0 điểm)

Giải phương trình: $x^2 - 10x + 27 = \sqrt{6 - x} + \sqrt{x - 4}$

Câu 3. (4,0 điểm):

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A = \frac{x + 1}{x^2 + x + 1}$.

Câu 4. (6,0 điểm) Cho thẳng AB có trung điểm O. Gọi M là điểm nằm giữa A và B. Qua M vẽ dây CD vuông góc với AB sao cho CO = DO = OA = OB. Lấy điểm E đối xứng với A qua M.

- 1) Tứ giác ACED là hình gì? Vì sao?
- 2) Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của M trên AB và AC. Chứng minh rằng:

$$\frac{HM}{HK} \cdot \frac{MK}{MC} = \frac{CD}{4R}$$

- 3) Gọi C' là điểm đối xứng với C qua A. Chứng minh rằng C' nằm trên một đường tròn cố định khi M di chuyển trên đường kính AB (M khác A và B).

Câu 5. (2,0 điểm) Cho a, b, c là ba số dương thỏa mãn: $a + b + c = 1$.


Chứng minh rằng: $\frac{c + ab}{a + b} + \frac{a + bc}{b + c} + \frac{b + ac}{a + c} \geq 2$

- Hết -

ĐÁP ÁN ĐỀ 06

Câu	Ý	Lời giải	Điểm
1	1	Điều kiện: $\begin{cases} x \geq 0 \\ x \neq 1 \end{cases}$	0,5

	2	$A = \left(\frac{3x + \sqrt{9x} - 3}{x + \sqrt{x} - 2} + \frac{1}{\sqrt{x} - 1} + \frac{1}{\sqrt{x} + 2} - 2 \right) : \frac{1}{x - 1}$ $= \frac{x + 3\sqrt{x} + 2}{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 2)} \cdot (x - 1)$ $= \frac{(\sqrt{x} + 1)(\sqrt{x} + 2)}{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 2)} \cdot (\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)$ $= (\sqrt{x} + 1)^2$	0,5 0,5 0,5 0,5
	3	<p>Với điều kiện: $\begin{cases} x \geq 0 \\ x \neq 1 \end{cases}$</p> <p>Ta có: $A = (\sqrt{x} + 1)^2$</p> <p>Vì $A = (\sqrt{x} + 1)^2 \geq 1$ với mọi $x \geq 0$ nên $0 \leq \frac{2}{(\sqrt{x} + 1)^2} \leq 2$</p> <p>Do đó: $\frac{2}{A} = \frac{2}{(\sqrt{x} + 1)^2} \in \square$ khi $(\sqrt{x} + 1)^2 = 1$ hoặc $(\sqrt{x} + 1)^2 = 2$</p> <p>Mà $\sqrt{x} + 1 > 0$ nên $\sqrt{x} + 1 = 1$ hoặc $\sqrt{x} + 1 = \sqrt{2}$</p> <p>Do đó: $x = 0$ hoặc $x = (\sqrt{2} - 1)^2 = 3 - 2\sqrt{2}$</p> <p>Vậy $\frac{2}{A}$ là số tự nhiên khi $x = 0$ hoặc $x = 3 - 2\sqrt{2}$</p>	0,5 0,5 0,5
	2	<p>1 Giải phương trình: $x^2 - 10x + 27 = \sqrt{6 - x} + \sqrt{x - 4}$</p> <p>Điều kiện: $4 \leq x \leq 6$</p> <p>$VT = x^2 - 10x + 27 = (x - 5)^2 + 2 \geq 2$, dấu “=” xảy ra $\Leftrightarrow x = 5$</p> <p>$VP = \sqrt{6 - x} + \sqrt{x - 4} \leq \sqrt{(1^2 + 1^2) \left[(\sqrt{6 - x})^2 + (\sqrt{x - 4})^2 \right]} \Leftrightarrow VP \leq 2$,</p> <p>Dấu “=” xảy ra $\Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{6 - x}} = \frac{1}{\sqrt{x - 4}} \Rightarrow 6 - x = x - 4 \Leftrightarrow x = 5$</p> <p>$VT = VP \Leftrightarrow x = 5$ (TMĐK).</p> <p>Vậy nghiệm của phương trình là $x = 5$</p>	0,5 0,5 0,5 0,5
	2	<p>Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức:</p> $A = \frac{x + 1}{x^2 + x + 1}$ <p>Ta có: $x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0, \forall x \in \square$</p>	0,25 0,5

		$A = \frac{x+1}{x^2+x+1} = \frac{x^2+x+1-x^2}{x^2+x+1} = 1 - \frac{x^2}{x^2+x+1} \leq 1 \quad \left(\frac{x^2}{x^2+x+1} \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \right)$ <p>Đẳng thức xảy ra khi $x = 0$, suy ra: $\max A = 1$ khi $x = 0$</p> $A = \frac{x+1}{x^2+x+1} \Rightarrow 3A = \frac{3x+3}{x^2+x+1} = \frac{x^2+4x+4 - (x^2+x+1)}{x^2+x+1}$ $= \frac{(x+2)^2}{x^2+x+1} - 1 \geq -1 \quad \left(\frac{(x+2)^2}{x^2+x+1} \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \right)$ <p>Suy ra: $A \geq -\frac{1}{3}$, đẳng thức xảy ra khi $x+2=0 \Leftrightarrow x=-2$</p> <p>Suy ra: $\min A = -\frac{1}{3}$, khi $x=-2$</p>	<p>0,25</p> <p>0,5</p> <p>0,25</p> <p>0,25</p>
3	1	Tìm được $A(0; 3); B(0; 7)$ Suy ra $I(0; 5)$	<p>1,0</p> <p>0,5</p>
	2	<p>Hoành độ giao điểm J của (d_1) và (d_2) là nghiệm của PT: $x+3=3x+7 \Rightarrow x=-2 \Rightarrow y_J=1 \Rightarrow J(-2;1)$ Suy ra: $OI^2=0^2+5^2=25; OJ^2=2^2+1^2=5; IJ^2=2^2+4^2=20$ $\Rightarrow OJ^2+IJ^2=OI^2 \Rightarrow$ tam giác OIJ là tam giác vuông tại J $\Rightarrow S_{\Delta OIJ} = \frac{1}{2}OI.OJ = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{5} \cdot \sqrt{20} = 5$ (đvdt)</p>	<p>0,5</p> <p>0,5</p> <p>0,5</p> <p>0,5</p>
4			
	1	<p>Vì $CD \perp AB \Rightarrow CM = MD$ Tứ giác ACED có AE cắt CD tại trung điểm của mỗi đường nên là hình bình hành Mà $AE \perp CD \Rightarrow$ tứ giác ACED là hình thoi</p>	<p>0,5</p> <p>0,5</p> <p>0,5</p> <p>0,5</p>
	2	<p>Vì tam giác ABC có AB là đường kính (O) nên ΔABC vuông tại C, suy ra tứ giác CHMK là hình chữ nhật Áp dụng hệ thức lượng vào các tam giác vuông ta có:</p> $MH.AC = MA.MC \Rightarrow MH = \frac{MA.MC}{AC}$ $MK = \frac{MB.MC}{BC}$ <p>Tương tự ta có: $MK = \frac{MB.MC}{BC}$</p>	<p>0,5</p> <p>0,5</p>

		$\Rightarrow MH.MK = \frac{MA.MB.MC^2}{AC.BC}$ <p>Mà $MA.MB = MC^2$; $AC.BC = MC.AB$ (do $\triangle ABC$ vuông tại C)</p> $\Rightarrow MH.MK = \frac{MC^2.MC^2}{MC.AB} = \frac{MC^3}{AB} \Rightarrow \frac{MH.MK}{MC^2} = \frac{MC}{AB}$ <p>Mà $MC = MK$ (do $CHMK$ là hình chữ nhật)</p> $\Rightarrow \frac{MH.MK}{HK.MC} = \frac{MC}{AB} = \frac{2MC}{2AB} = \frac{CD}{4R}$ $\frac{HM}{HK} \cdot \frac{MK}{MC} = \frac{CD}{4R}$ <p>Vậy: $\frac{HM}{HK} \cdot \frac{MK}{MC} = \frac{CD}{4R}$ (đpcm)</p>	0,5
	3	<p>Lấy O' đối xứng với O qua A, suy ra O' cố định. Tứ giác $COC'O'$ là hình bình hành vì có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm A của mỗi đường. Do đó $O'C' = OC = R$ không đổi Suy ra C' nằm trên đường tròn $(O'; R')$ cố định khi M di chuyển trên đường kính AB.</p>	0,5 0,5 0,5 0,5
5		<p>Vì $a + b + c = 1$ nên $c + ab = c(a + b + c) + ab = (c + a)(c + b)$ $a + bc = a(a + b + c) + bc = (b + a)(b + c)$ $b + ac = b(a + b + c) + ac = (a + b)(a + c)$ nên BĐT cần chứng minh tương đương với:</p> $\frac{(c+a)(c+b)}{a+b} + \frac{(b+a)(b+c)}{a+c} + \frac{(a+b)(a+c)}{b+c} \geq 2$ $\Leftrightarrow \sqrt{\left(\frac{(c+a)(c+b)}{a+b}\right)^2} + \sqrt{\left(\frac{(b+a)(b+c)}{a+c}\right)^2} + \sqrt{\left(\frac{(a+b)(a+c)}{b+c}\right)^2} \geq 2$ <p>Mặt khác dễ thấy: $x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + yz + zx$, với mọi x, y, z (*) Áp dụng (*) ta có: $VT \geq b + c + a + b + c + a = 2$</p> <p>Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c = \frac{1}{3} \Rightarrow$ đpcm</p>	0,5 0,5 0,5 0,5

Chú ý:

- 1) Nếu thí sinh làm bài không làm bài theo cách nêu trong đáp án nhưng đúng thì cho đủ số điểm từng phần như hướng dẫn quy định.
- 2) Bài hình không vẽ hình thì không chấm điểm.

UBND HUYỆN
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN
MÔN: TOÁN LỚP 9

Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề

$$P = \left(\frac{\sqrt{x} + \sqrt{y}}{1 - \sqrt{xy}} + \frac{\sqrt{x} - \sqrt{y}}{1 + \sqrt{xy}} \right) : \left(1 + \frac{x + y + 2xy}{1 - xy} \right)$$

Bài 1: (4 điểm) Cho biểu thức:

a) Rút gọn biểu thức P.

$$x = \frac{2}{2 + \sqrt{3}}$$

b) Tính giá trị của P với

Bài 2: (4 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, gọi (D) và (L) lần lượt là đồ thị của hai hàm số: $y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$ và $y = |x|$.

a) Vẽ đồ thị (D) và (L).

b) (D) và (L) cắt nhau tại M và N. Chứng minh OMN là tam giác vuông.

Bài 3: (4 điểm) Giải phương trình: $6x^4 - 5x^3 - 38x^2 - 5x + 6 = 0$.

Bài 4: (2 điểm) Qua đỉnh A của hình vuông ABCD cạnh là a, vẽ một đường thẳng cắt cạnh BC ở M và cắt đường thẳng DC ở I.

$$\text{Chứng minh rằng: } \frac{1}{AM^2} + \frac{1}{AI^2} = \frac{1}{a^2}.$$

Bài 5: (6 điểm)


Cho hai đường tròn (O) và (O') ở ngoài nhau. Đường nối tâm OO' cắt đường tròn (O) và (O') tại các điểm A, B, C, D theo thứ tự trên đường thẳng. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài EF, $E \in (O)$ và $F \in (O')$. Gọi M là giao điểm của AE và DF; N là giao điểm của EB và FC. Chứng minh rằng:

a) Tứ giác MENF là hình chữ nhật.


b) $MN \perp AD$.

c) $ME \cdot MA = MF \cdot MD$.

----- Hết -----

Bài	Đáp án	Điểm
1	ĐKXD: $x \geq 0; y \geq 0; xy \neq 1$	0,5 đ
a)	<p>Mẫu thức chung là $1 - xy$</p> $P = \frac{(\sqrt{x} + \sqrt{y})(1 + \sqrt{xy}) + (\sqrt{x} - \sqrt{y})(1 - \sqrt{xy})}{1 - xy} : \frac{1 - xy + x + y + 2xy}{1 - xy}$ $= \frac{\sqrt{x} + x\sqrt{y} + \sqrt{y} + y\sqrt{x} + \sqrt{x} - x\sqrt{y} - \sqrt{y} + y\sqrt{x}}{1 - xy} \cdot \frac{1 - xy}{1 + x + y + xy}$ $= \frac{2(\sqrt{x} + y\sqrt{x})}{(1 + x)(1 + y)} = \frac{2\sqrt{x}(1 + y)}{(1 + x)(1 + y)} = \frac{2\sqrt{x}}{1 + x}$	<p>0,5 đ</p> <p>0,5 đ</p> <p>0,5 đ</p>
b)	$x = \frac{2}{2 + \sqrt{3}} = \frac{2(2 - \sqrt{3})}{4 - 3} = 3 - 2\sqrt{3} + 1 = (\sqrt{3} - 1)^2$ $\sqrt{x} = \sqrt{(\sqrt{3} - 1)^2} = \sqrt{3} - 1 = \sqrt{3} - 1$ $P = \frac{2(\sqrt{3} - 1)}{1 + (\sqrt{3} - 1)^2} = \frac{2\sqrt{3} - 2}{1 + 3 - 2\sqrt{3} + 1} =$ $P = \frac{2(\sqrt{3} - 1)}{5 - 2\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3} + 2}{13}$	<p>0,5 đ</p> <p>0,5 đ</p> <p>0,5 đ</p> <p>0,5 đ</p>
2 a)	<p>Đồ thị $y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$ có: $\begin{cases} x = 0 \Rightarrow y = \frac{3}{2} \\ y = 0 \Rightarrow x = 3 \end{cases}$</p> <p>Đồ thị $y = x = \begin{cases} x \text{ khi } x \geq 0 \\ -x \text{ khi } x \leq 0 \end{cases}$</p> <p>Đồ thị như hình vẽ:</p> 	<p>0,5 đ</p> <p>0,5 đ</p> <p>1 đ</p>
b)	Đồ thị (D) và (L) cắt nhau tại hai điểm có tọa độ M(1; 1) và N(- 3; 3)	0,5 đ

	<p>Ta có: $OM = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \Rightarrow OM^2 = 2$</p> <p>$ON = \sqrt{3^2 + (-3)^2} = 3\sqrt{2} \Rightarrow ON^2 = 18$</p> <p>$MN = \sqrt{(1-3)^2 + (1+3)^2} = \sqrt{20} \Rightarrow MN^2 = 20$</p> <p>Vi: $OM^2 + ON^2 = MN^2$</p> <p>Vậy: tam giác OMN vuông tại O</p>	<p>0,5 đ</p> <p>0,5 đ</p> <p>0,5 đ</p>
3	<p>Ta thấy $x = 0$ không phải là nghiệm của phương trình</p> <p>Chia cả 2 vế của phương trình cho x^2 ta được:</p> $6x^2 - 5x - 38 - \frac{5}{x} + \frac{6}{x^2} = 0$ $\Leftrightarrow 6\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 5\left(x + \frac{1}{x}\right) - 38 = 0$ <p>Đặt $y = x + \frac{1}{x}$ thì: $x^2 + \frac{1}{x^2} = y^2 - 2$</p> <p>Ta được pt: $6y^2 - 5y - 50 = 0 \Leftrightarrow (3y - 10)(2y + 5) = 0$</p> <p>$y = \frac{10}{3}$ và $y = -\frac{5}{2}$</p> <p>Do đó:</p> <p>* Với $y = \frac{10}{3}$ thì: $x + \frac{1}{x} = \frac{10}{3} \Leftrightarrow 3x^2 - 10x + 3 = 0$</p> $\Leftrightarrow (3x - 1)(x - 3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{1}{3} \\ x_2 = 3 \end{cases}$ <p>* Với $y = -\frac{5}{2}$ thì: $x + \frac{1}{x} = -\frac{5}{2} \Leftrightarrow 2x^2 + 5x + 2 = 0$</p> $\Leftrightarrow (2x + 1)(x + 3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_3 = -\frac{1}{2} \\ x_4 = -3 \end{cases}$	<p>1 đ</p> <p>1 đ</p> <p>1 đ</p> <p>1 đ</p>
4		
	<p>Vẽ $Ax \perp AI$ cắt đường thẳng CD tại J.</p> <p>Ta có $\triangle AIJ$ vuông tại A, có AD là đường cao thuộc cạnh huyền IJ, nên:</p> $\frac{1}{AD^2} = \frac{1}{AJ^2} + \frac{1}{AI^2} \quad (1)$ <p>Xét hai tam giác vuông ADJ và ABM, ta có:</p>	<p>0,5 đ</p> <p>0,5 đ</p> <p>0,5 đ</p>

	$AB = AD = a; \widehat{DAJ} = \widehat{BAM}$ (góc có cạnh tương ứng vuông góc) $\Rightarrow \triangle ADJ = \triangle ABM$. Suy ra: $AJ = AM$ $\frac{1}{AD^2} = \frac{1}{AM^2} + \frac{1}{AI^2} = \frac{1}{a^2}$ Thay vào (1) ta được:	0,5 đ
5		
a)	Ta có $\widehat{AEB} = \widehat{CFD} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) Vì EF là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (O) và (O'), nên: $OE \perp EF$ và $OF \perp EF \Rightarrow OE \parallel OF$ $\Rightarrow \widehat{EOB} = \widehat{FO'D}$ (góc đồng vị) $\Rightarrow \widehat{EAO} = \widehat{FCO'}$ Do đó $MA \parallel FN$, mà $EB \perp MA \Rightarrow EB \perp FN$ Hay $\widehat{ENF} = 90^\circ$. Tứ giác MENF có $\widehat{E} = \widehat{N} = \widehat{F} = 90^\circ$, nên MENF là hình chữ nhật	0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ
b)	Gọi I là giao điểm của MN và EF; H là giao điểm của MN và AD Vì MENF là hình chữ nhật, nên $\widehat{IFN} = \widehat{INF}$ $\widehat{IFN} = \widehat{FDC} = \frac{1}{2} \text{ số đo } \widehat{FC}$ Mặt khác, trong đường tròn (O'): $\Rightarrow \widehat{FDC} = \widehat{HNC}$ Suy ra $\triangle FDC$ đồng dạng $\triangle HNC$ (g - g) $\Rightarrow \widehat{NHC} = \widehat{DFC} = 90^\circ$ hay $MN \perp AD$	0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ
c)	Do MENF là hình chữ nhật, nên $\widehat{MFE} = \widehat{FEN}$ $\widehat{FEN} = \widehat{EAB} = \frac{1}{2} \text{ số đo } \widehat{EB}$ Trong đường tròn (O) có: $\Rightarrow \widehat{MFE} = \widehat{EAB}$ Suy ra $\triangle MEF$ đồng dạng $\triangle MDA$ (g - g)	0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ

	$\frac{ME}{MD} = \frac{MF}{MA}, \text{ hay } ME \cdot MA = MF \cdot MD$	
--	---	--

Lưu ý: Nếu học sinh giải theo cách khác, nếu đúng và phù hợp với kiến thức trong chương trình đã học thì hai Giám khảo chấm thi thống nhất việc phân bố điểm của cách giải đó, sao cho không làm thay đổi tổng điểm của bài (hoặc ý) đã nêu trong hướng dẫn này./.