

## CHUYÊN ĐỀ 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ


### Phần I: HỆ THỐNG LÝ THUYẾT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

#### I. SỐ OXI HÓA

##### 1. Khái niệm

Số oxi hóa là điện tích quy ước của nguyên tử trong phân tử khi coi tất cả các electron liên kết đều chuyển hoàn toàn về nguyên tử có độ âm điện lớn hơn (xem như hợp chất có liên kết ion).


Số oxi hoá được viết ở dạng số đại số, dấu viết trước, số viết sau và viết ở phía trên, chính giữa kí hiệu nguyên tố.



##### 2. Quy tắc xác định số oxi hóa

Số oxi hóa của nguyên tử một nguyên tố là một số đại số được gán cho nguyên tử của nguyên tố đó theo các quy tắc sau:

- **Quy tắc 1:** Trong đơn chất số oxi hóa của nguyên tử bằng 0.




- **Quy tắc 2:**


Trong phân tử các hợp chất, thông thường số oxi hoá của hydrogen (H) là +1, của oxygen (O) là -2, các kim loại điển hình có số oxi hoá dương bằng số electron hoá trị.

| Nguyên tử  | Hydrogen (H)                                                  | Oxygen (O)                                                                           | Kim loại kiềm (IA) | Kim loại kiềm thổ (IIA) | Aluminium (Al) |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| Số oxi hóa | +1                                                            | -2                                                                                   | +1                 | +2                      | +3             |
| Ngoại lệ   | $\overset{-1}{\text{NaH}}, \overset{-1}{\text{CaH}}_2, \dots$ | $\overset{+2}{\text{OF}}_2, \overset{-1}{\text{H}}_2\overset{-1}{\text{O}}_2, \dots$ |                    |                         |                |

\* Nhóm nguyên tử :




- **Quy tắc 3:** Trong hợp chất tổng số oxi hóa của các nguyên tố nhân với số nguyên tử của từng nguyên tố bằng 0.






- **Quy tắc 4**

\* **Trong ion đơn nguyên tử:** số oxi hóa của ion đơn nguyên tử bằng điện tích của ion.



\* **Trong ion đa nguyên tử:** tổng số oxi hóa của các nguyên tố nhân với số nguyên tử của từng nguyên tố bằng điện tích của ion.



#### II. CHẤT OXI HOÁ, CHẤT KHỬ, PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ

##### 1. Các khái niệm

- Chất khử (chất bị oxi hóa) là chất nhường e (**số oxi hóa tăng** sau phản ứng).

- Chất oxi hóa (chất bị khử) là chất nhận e (**số oxi hóa giảm** sau phản ứng).

- Quá trình *nhường e* là quá trình oxi hóa = sự oxi hóa
- Quá trình *nhận e* là quá trình khử = sự khử
- Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng có sự **nhường và nhận e** = có sự chuyển dịch e giữa các chất phản ứng.

\* **Cách nhận biết phản ứng oxi hóa – khử:**

- Phải có sự thay đổi số oxi của 1 hay một số nguyên tố trước và sau phản ứng.

- **Có mặt đơn chất trong phản ứng  $\Rightarrow$  phản ứng oxi hóa - khử**

### III. CÂN BẰNG THEO PHƯƠNG PHÁP THĂNG BẰNG ELECTRON (NÂNG CAO)

#### 1. Nguyên tắc cân bằng

Phương pháp này dựa vào sự bảo toàn e :  $\sum e \text{ nhường} = \sum e \text{ nhận}$ .


**Các bước thực hiện:**

**Bước 1:** Xác định số oxi hóa các nguyên tố có số oxi hóa thay đổi.

**Bước 2:** Viết các quá trình oxi hóa, quá trình khử (cân bằng mỗi quá trình)  $\rightarrow$  tìm hệ số cho mỗi quá trình sao cho  $\sum e \text{ nhường} = \sum e \text{ nhận}$ .


**Bước 3:** Xác định hệ số các chất có chứa số oxi hóa thay đổi  $\rightarrow$  hoàn chỉnh các hệ số các nguyên tố còn lại dựa trên các định luật bảo toàn (bảo toàn nguyên tố) và theo trình tự sau: Kim loại (ion dương)  $\rightarrow$  gốc acid (ion âm)  $\rightarrow$  môi trường (acid, base)  $\rightarrow$  nước (cân bằng hydrogen).

#### 2. Một số thí dụ:




**Thí dụ 1:**

**Nhận xét:**




**Áp dụng quy tắc trên cho những trường hợp tương tự**



**Cách nhớ để viết quá trình oxi hóa và quá trình khử:** Tăng nhường giảm nhận hoặc viết cộng e bên số oxi hóa lớn.



Xác định **hệ số sơ khởi:**



Hoàn chỉnh các hệ số còn lại:







Xác định **hệ số sơ**

**khởi:**




Hoàn chỉnh các hệ số còn lại:






**Thí dụ 3:****Nhận xét:****Áp dụng quy tắc trên cho những trường hợp tương tự**Xác định **hệ số sơ khởi**:


Hoàn chỉnh các hệ số còn lại:

**Thí dụ 4: Phản ứng có từ 3 trường hợp thay đổi số oxi hóa trở lên****Cách giải quyết:**

- Cách 1: Viết mọi phương trình biểu diễn sự thay đổi số oxi hóa, chú ý sự ràng buộc hệ số ở 2 vế của phản ứng và hệ số trong cùng phân tử.
- Cách 2: Nếu một phân tử có nhiều nguyên tố thay đổi số oxi hóa, có thể xét chung cả nhóm hoặc toàn bộ phân tử, đồng thời chú ý sự ràng buộc hệ số ở phía sau.

**Áp dụng:****Cách 1:****Cách 2:****Thí dụ 5: Phản ứng không xác định rõ môi trường**

- **Cách giải quyết:** Có thể cân bằng nguyên tố bằng phương pháp đại số khi đã xác định hệ số của các chất thay đổi số oxi hóa hoặc qua trung gian phương trình ion thu gọn.
- **Áp dụng:**  $K_2\overset{+4}{S}O_3 + K\overset{+7}{Mn}\overset{+6}{O}_4 + KHSO_4 \rightarrow K_2\overset{+6}{S}O_4 + \overset{+2}{Mn}\overset{+6}{O}_4 + H_2O$

Đặt các hệ số hợp thức của KHSO<sub>4</sub>, K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> và H<sub>2</sub>O là a, b, c.

Bảo toàn nguyên tố K: 12+a=2b; Bảo toàn nguyên tố H: a=2c;


Bảo toàn nguyên tố S: 5+a=b+2 =&gt; Giải hệ: a=6; b=9; c=3





**Thí dụ 6: Phản ứng có nguyên tố tăng hay giảm nhiều nấc:**

➤ **Cách giải quyết:**



- Cách 1: Viết mọi phương trình thay đổi số oxi hóa, đặt ẩn số cho từng nấc tăng, giảm số oxi hóa (*rất dễ nhầm! cẩn thận*)
- Cách 2: Tách ra thành hai hay nhiều phản ứng với từng nấc số oxi hóa tăng, hay giảm (*có lợi trong việc giải toán*). Nhân hệ số trước khi gom các phản ứng lại.



**Cách 1:**



**Cách 2:** Tách thành 2 phương trình:









**Nhận xét:** - Nếu là giải toán, cứ để nguyên các phương trình để tính toán, không cần gom lại.




- Với 2 phương trình trên ta có liên hệ:  $a=3x$ ;  $b=y$ .

- Tùy theo đề bài cho tỉ lệ số mol của NO và N<sub>2</sub>O thì ta mới xác định được hệ số của NO và N<sub>2</sub>O.

**Thí dụ 7: Phản ứng tự oxi hóa – tự khử:** Trong đó 1 chất vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử → ghi hệ số sơ khởi bên chất tạo thành.



**Thí dụ 8: Phản ứng nội oxi hóa - khử:** Trong cùng 1 chất mà nguyên tố này đóng vai trò là oxi hóa, nguyên tố kia đóng vai trò là chất khử → ghi hệ số sơ khởi bên chất tạo thành.





Một số chất là chất khử hay chất oxi hóa còn phụ thuộc vào môi trường tiến hành phản ứng:

| Chất                                              | Môi trường tiến hành phản ứng                  | Sản phẩm sau phản ứng                                           |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| $\overset{+7}{\text{K Mn O}_4}$                   | Môi trường acid ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ )    | $\overset{+2}{\text{Mn}}$ ( $\text{MnCl}_2$ , $\text{MnSO}_4$ ) |
|                                                   | Môi trường trung tính ( $\text{H}_2\text{O}$ ) | $\overset{+4}{\text{Mn}}$ ( $\text{MnO}_2$ , $\text{KOH}$ )     |
|                                                   | Môi trường base                                | $\overset{+6}{\text{Mn}}$ ( $\text{K}_2\text{MnO}_4$ )          |
| $\overset{+7}{\text{K}_2 \text{Cr}_2 \text{O}_7}$ | Môi trường acid ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ )    | $\overset{+3}{\text{Cr}}$ $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$          |

Ví dụ





- Môi trường acid:














- Môi trường trung tính:  $3\text{C}_2\text{H}_4 + 2\text{KMnO}_4 + 4\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 3\text{CH}_2(\text{OH}) - \text{CH}_2\text{OH} + 2\text{MnO}_2 + 2\text{KOH}$

- Môi trường base:  $\text{Na}_2\text{SO}_3 + 2\text{KMnO}_4 + 2\text{KOH}_{\text{đặc}} \longrightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{H}_2\text{O}$


**Ví dụ 2:** Xác định sản phẩm và cân bằng các phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron:



**Giải**





|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 3x | $O_2 + 4e \rightarrow 2O^{-2}$ |
|----|--------------------------------|












### •Oxi hoá kim loại

Sản phẩm khử phụ thuộc vào tính khử của kim loại, nồng độ của axit, nhiệt độ tiến hành phản ứng,... Nói chung thì axit bị khử xuống bậc oxi hóa càng thấp khi nồng độ càng loãng và tác dụng với kim loại càng mạnh:



(trừ Au, Pt)





### Chú ý:


(1) m là hóa trị cao của M.

(2) Một số kim loại như Al, Fe, Cr,... bị thụ động hóa trong  $H_2SO_4$  đặc, nguội và  $HNO_3$  đặc, nguội.



(3) Hỗn hợp  $HNO_3$  đặc và  $HCl$  đặc theo tỉ lệ thể tích 1:3 gọi là nước cường thủy. Có tính oxi hóa rất mạnh có thể hòa tan Au và Pt.




• Oxi hoá các hợp chất Fe (II) thành hợp chất Fe(III):



• Oxi hoá các hợp chất muối sunfua:



(6) Tính chất của ion  $\text{NO}_3^-$




#### IV. PHƯƠNG PHÁP ION – ELECTRON

Cách cân bằng này chỉ áp dụng cho các phản ứng oxi hoá - khử xảy ra trong dung dịch, có sự tham gia của môi trường (acid, base, nước).

Khi cân bằng cũng áp dụng theo 4 bước trên, nhưng ở bước 2 chất oxi hoá và chất khử được viết dưới dạng ion – electron theo các nguyên tắc sau đây:


1) Nếu phản ứng có acid tham gia: Về nào thừa oxi ta thêm H<sup>+</sup> để tạo ra H<sub>2</sub>O và ngược lại.

Ví dụ.




Để biết phương trình có cân bằng đúng hay không, bạn đọc cần tính tổng điện tích hai vế của phương trình ion thu gọn. Nếu tổng điện tích hai vế của phương trình bằng nhau thì phương trình đã được cân bằng.

Phương trình phân tử:




**Lưu ý:** Để viết nhanh các bán phản ứng khử hoặc bán phản ứng oxi hoá có thể áp dụng phương pháp bảo toàn điện tích (hay điện tích giả định) hai vế.


Ví dụ:




Bán phản ứng oxi hoá:



Vế trái điện tích giả định bằng 0, vế phải điện tích giả định + 9. Để điện tích giả định hai vế bằng nhau ta thêm e vào vế phải.




Nếu viết dưới dạng ion - electron thì điện tích hai vế cũng phải bằng nhau:




Bán phản ứng khử:  $\text{N}^{+5} + 1\text{e}^- \rightarrow \text{N}^{-4}$

Vế trái và vế phải đều có điện tích giả định là + 4.




Hai vế đều có điện tích bằng 0.


(1) + (2)x 9: Phương trình ion rút gọn:




Phương trình phân tử:



Để kiểm tra phương trình ion rút gọn đã cân bằng đúng hay chưa ta đếm điện tích hai vế. Nếu điện tích hai vế bằng nhau thì phương trình được cân bằng. Chẳng hạn nhiều học sinh sai lầm khi cho rằng phương trình sau đã cân bằng vì số nguyên tử hoặc ion hai vế bằng nhau:




Tuy nhiên, vế trái điện tích + 3 và vế phải điện tích + 4. Để cân bằng điện tích hai vế ta đưa hệ số 2 vào  $\text{Fe}^{3+}$  và  $\text{Fe}^{2+}$ . Lúc này phương trình mới được cân bằng.



**2. Nếu phản ứng có bsae tham gia: Vế nào thừa oxygen thêm nước để tạo ra  $\text{OH}^-$  và ngược lại.**

**Ví dụ:**




Chuyển sang phương trình phân tử:



**3. Nếu phản ứng có  $\text{H}_2\text{O}$  tham gia**

- Sản phẩm phản ứng tạo ra acid, theo nguyên tắc 1.
- Sản phẩm phản ứng tạo ra base, theo nguyên tắc 2.

**Ví dụ:**












Chuyển sang phương trình phân tử:



Ưu việt của phương pháp này là cho ta hoàn thành chính xác các phương trình phản ứng dưới dạng ion thu gọn (bản chất của các phản ứng) nếu biết được trạng thái đầu và trạng thái cuối của dạng oxi hoá và dạng khử.

**Ví dụ:** Hoàn thành và cân bằng các phản ứng sau dưới dạng ion thu gọn:

- $\text{Cu} + \text{NaNO}_3 + \text{HCl} \rightarrow$
- $\text{Al} + \text{NaNO}_3 + \text{NaOH} \rightarrow$
- $\text{FeS} + \text{HNO}_3 \text{ loãng} \rightarrow$




**d) Phương pháp cân bằng phản ứng oxi hoá - khử có chất hữu cơ tham gia**

Tương tự đối với chất vô cơ, phản ứng oxi hoá - khử có chất hữu cơ cũng tiến hành theo 4 bước. Nhưng ở bước (1) khi tính số oxi hoá của C cần lưu ý theo phương pháp sau:




• **Phương pháp chung:** Tính số oxi hoá trung bình của C.

• **Phương pháp riêng.** Đặc biệt đối với những phản ứng chỉ có sự thay đổi nhóm chức, có thể tính số oxi hoá của C nào có sự thay đổi số oxi hoá.




**Ví dụ:**



**Cách 1:** Phương pháp chung



**Cách 2:** Phương pháp riêng



Kết quả của hai cách đều như nhau.

## Phần II: HỆ THỐNG BÀI TẬP THEO KIẾN THỨC LÝ THUYẾT CÓ PHÂN DẠNG

### DẠNG 1: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THĂNG BẰNG SỐ MOL ELECTRON

**Nguyên tắc:** Khi có nhiều chất oxi hóa hoặc chất khử trong hỗn hợp phản ứng (nhiều phản ứng hoặc phản ứng qua nhiều giai đoạn) thì tổng số mol electron mà các chất khử cho phải bằng tổng số mol electron mà các chất oxi hóa nhận vào.

$$\sum n_e (\text{nường}) = \sum n_e (\text{nhận})$$

Ưu việt của phương pháp này là có thể giải nhanh nhiều bài toán khó mà không cần viết phương trình phản ứng.

**Ví dụ 1:** Hoà tan hết 6,3 gam hỗn hợp X gồm Al và kim loại M (tỉ lệ mol tương ứng 2:3) vào 200 gam dung dịch  $\text{HNO}_3$  31,5%, kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y và 1,7353 lít (đkc) hỗn hợp hai khí  $\text{N}_2$  và  $\text{N}_2\text{O}$  có tổng khối lượng là 2,76 gam. Cho Y phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng, không có khí thoát ra.

a) Xác định tên kim loại M.







b) Tính thể tích dung dịch NaOH 0,5M tối thiểu cần dùng để kết tủa hết các ion kim loại trong Y.

**Giải**

a) Gọi x, y lần lượt là số mol  $\text{N}_2$  và  $\text{N}_2\text{O}$ .

Ta có hệ: 
$$\begin{cases} x + y = 0,07 \\ 28x + 44y = 2,76 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,02 \\ y = 0,05 \end{cases}$$

Các bán phản ứng oxi hoá và khử:



$$\Rightarrow 6a + 3na = 0,6 \Rightarrow 2a + na = 0,2 \quad (1)$$

Mặt khác:

$$54a + 3Ma = 6,3 \quad (2)$$

$$\Rightarrow \frac{54 + 3M}{2 + n} = 31,5 \Rightarrow M = 10,5n + 3 \quad (n = 1; 2; 3)$$

Từ (1), (2)

$$\Rightarrow \text{Nghiệm phù hợp: } n = 2 \text{ và } M = 24 \text{ (Mg)}$$


$$\text{b) } n_{\text{H}^+} \text{ ban đầu} = n_{\text{HNO}_3}, \text{ ban đầu} = \frac{200 \cdot 31,5}{100 \cdot 63} = 1 \text{ mol}$$

$$n_{\text{H}^+} \text{ phản ứng} = 0,24 + 0,5 = 0,74 \text{ mol} \Rightarrow n_{\text{H}^+} \text{ còn} = 1 - 0,74 = 0,26 \text{ mol}$$


$$a = \frac{6,3}{54 + 3 \cdot 24} = 0,05 \text{ mol} \Rightarrow n_{\text{Al}} = 0,1 \text{ mol} \quad \text{và } n_{\text{Mg}} = 0,15 \text{ mol}$$



$$0,26 \rightarrow 0,26$$



$$0,15 \rightarrow 0,3$$



$$0,1 \rightarrow 0,3$$

$$\Rightarrow n_{\text{NaOH}} = n_{\text{OH}^-} = 0,86 \text{ mol} \Rightarrow V_{\text{dd NaOH}} = \frac{0,86}{0,5} = 1,72 \text{ lít}$$


**Ví dụ 2:** Cho 6,3 gam hỗn hợp X gồm Mg và kim loại M (hoá trị không đổi) tác dụng với  $\text{Cl}_2$ , sau một thời gian thu được 20,5 gam chất rắn Y. Y hòa tan trong dung dịch HCl, sinh ra 2,479 lít  $\text{H}_2$  (đkc). Mặt khác, cho 0,1 mol M phản ứng với dung dịch  $\text{HNO}_3$  đặc, nóng dư thì lượng khí  $\text{NO}_2$  thoát ra vượt quá 5,577 lít (đkc).

a) Xác định tên kim loại M.

b) Cho 12,6 gam X trên tác dụng với dung dịch  $\text{HNO}_3$  loãng (dư), kết thúc phản ứng thu được 2,479 lít (đkc) hỗn hợp khí X gồm  $\text{N}_2$  và  $\text{N}_2\text{O}$  có tỉ khối so với  $\text{H}_2$  là 18. Tính khối lượng muối thu được sau khi các phản ứng kết thúc.

**Giải**

a)



$$\Rightarrow n_{\text{NO}_2} = 0,1n > \frac{5,577}{24,79} = 0,225 \Rightarrow n > 2,25 \Rightarrow n = 3$$

$$n_{\text{Cl}_2} = \frac{20,5 - 6,3}{71} = 0,2$$

Theo định luật bảo toàn khối lượng:

|                                                    |                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| $\text{M} \rightarrow \text{M}^{3+} + 3\text{e}$   | $\text{Cl}_2 + 2\text{e} \rightarrow 2\text{Cl}^-$ |
| $a \rightarrow 3a$                                 | $0,2 \rightarrow 0,4$                              |
| $\text{Mg} \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 2\text{e}$ | $2\text{H}^+ + 2\text{e} \rightarrow \text{H}_2$   |
| $b \rightarrow 2b$                                 | $0,2 \leftarrow 0,1$                               |

$$\Rightarrow 3a + 2b = 0,6(1) \Rightarrow a < 0,2\text{mol}$$

Mặt khác:

$$\text{Ma} + 24b = 6,3 \quad (2)$$

$$a = \frac{0,9}{36 - \text{M}} < 0,2 \Rightarrow \text{M} < 31,5$$

Rút a từ (1) và (2) ta được:

Do M là kim loại hoá trị 3 nên chỉ có thể M là Al (aluminium)

$$a = \frac{0,9}{36 - 27} = 0,1\text{mol}; b = \frac{0,6 - 3 \cdot 0,1}{2} = 0,15\text{mol}$$

b) Ta có:



$\Rightarrow$  Trong 12,6 gam X có chứa 0,2 mol Al và 0,3 mol Mg.

Gọi x, y lần lượt là số mol  $\text{N}_2$  và  $\text{N}_2\text{O}$ .

$$\text{Ta có hệ} \begin{cases} x + y = 0,1 \\ 28x + 44y = 18 \cdot 2 \cdot 0,1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,05 \\ y = 0,05 \end{cases}$$

$$\text{Ta thấy: } 3n_{\text{Al}} + 2n_{\text{Mg}} = 1,2 > 10n_{\text{N}_2} + 8n_{\text{N}_2\text{O}} = 0,9\text{mol}$$

$\Rightarrow$  Có muối  $\text{NH}_4\text{NO}_3$  tạo thành.



$$n_{\text{NH}_4\text{NO}_3} = \text{Z} = \frac{1,2 - 0,9}{8} = 0,0375\text{mol}$$

$$\Rightarrow m_{\text{muối}} = m_{\text{Al}(\text{NO}_3)_3} + m_{\text{Mg}(\text{NO}_3)_2} + m_{\text{NH}_4\text{NO}_3} = 213 \cdot 0,2 + 148 \cdot 0,3 + 80 \cdot 0,0375 = 90 \text{ gam}$$

**Ví dụ 3:** Chia 29,6 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu thành hai phần bằng nhau. Phần 1 cho phản ứng với lượng dư dung dịch HCl, sinh ra 3,7185 lít  $\text{H}_2$  (đkc). Cho phần 2 tác dụng với dung dịch  $\text{HNO}_3$  đặc, nóng (dư) thu được V lít khí  $\text{NO}_2$  (đkc) và dung dịch Y.

a) Tính giá trị của V



b) Cho Y phản ứng với lượng dư dung dịch  $\text{NH}_3$ . Tính khối lượng kết tủa thu được sau khi các phản ứng kết thúc.

**Giải**

a) Gọi x, y lần lượt là số mol Fe và Cu chứa trong 14,8 gam hỗn hợp X.

Ta có:  $56x + 64y = 14,8$  (\*)

• Phần 1: Cu không phản ứng



$$\Rightarrow n_{\text{H}_2} = x = 0,15 \text{ mol}$$


$$(*) \Rightarrow y = 0,1 \text{ mol}$$

• Phần 2:


|                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + 3e$<br>$0,15 \rightarrow 0,15 \rightarrow 0,45$<br>$\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2e$<br>$0,1 \rightarrow 0,1 \rightarrow 0,2$ | $\text{N}^{+5} + 1e \rightarrow \text{N}^{+4}$<br>$a \leftarrow a$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

$$\Rightarrow a = 0,45 + 0,2 = 0,65 \text{ mol} \Rightarrow V = 0,65 \cdot 22,4 = 14,56 \text{ lít}$$


b) Dung dịch Y chứa  $\text{Fe}^{3+}, \text{Cu}^{2+}, \text{H}^+, \text{NO}_3^-$



$$0,15 \quad \quad \quad \rightarrow 0,15$$



$$0,1 \quad \quad \quad \rightarrow 0,1$$



$$0,1 \quad \quad \quad \rightarrow 0,1$$

$$\Rightarrow m_{\text{kết tủa}} = m_{\text{Fe}(\text{OH})_3} = 107 \cdot 0,1 = 10,7 \text{ gam}$$

**Ví dụ 4:** Chia 23,8 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg và Fe thành hai phần bằng nhau.

Phần 1 cho phản ứng với dung dịch NaOH dư, sinh ra **3,7185 lít  $\text{H}_2$  (đkc)** và còn lại chất rắn Y không tan. Cho toàn bộ Y phản ứng với dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  đặc, nóng (dư) thu được **7,437 lít  $\text{SO}_2$  (sản phẩm khử duy nhất, đkc)**. Cho phần 2 tác dụng với 240 gam dung dịch  $\text{HNO}_3$  31,5%, kết thúc các phản ứng thu được dung dịch A và **1,7353 lít (đkc)** hỗn hợp hai khí  $\text{N}_2$  và  $\text{N}_2\text{O}$  có tổng khối lượng 2,76 gam.


a) Tính khối lượng các muối tạo thành trong dung dịch A.

b) Dung dịch A hoà tan tối đa bao nhiêu gam Cu. Biết sản phẩm khử của  $\text{N}^{+5}$  là  $\text{N}^{+2}$

c) Tính thể tích dung dịch NaOH 1M tối thiểu cần dùng để phản ứng hết với dung dịch A.

**Giải**

a) • **Phần 1:** Mg và Fe không phản ứng



$$0,1 \quad \quad \quad \leftarrow \quad \quad \quad 0,15$$

Chất rắn Y gồm Mg và Fe.

|                                                                                                                                                      |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{Mg} \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 2\text{e}$<br>$x \rightarrow 2x$<br>$\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + 3\text{e}$<br>$y \rightarrow 3y$ | $\text{S}^{+6} + 2\text{e} \rightarrow \text{S}^{+4}$<br>$0,6 \leftarrow 0,3$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Ta có hệ: 
$$\begin{cases} 2x + 3y = 0,6 \\ 24x + 56y = 11,9 - 2,7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,15 \\ y = 0,1 \end{cases}$$

• **Phân 2:** Gọi a, b lần lượt là số mol  $\text{N}_2$  và  $\text{N}_2\text{O}$  chứa trong 0,07 mol hỗn hợp.

Ta cũng có hệ: 
$$\begin{cases} a + b = 0,07 \\ 28a + 44b = 2,76 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0,02 \\ b = 0,05 \end{cases}$$

Vì  $2n_{\text{Mg}} + 3n_{\text{Fe}} + 3n_{\text{Al}} = 0,9\text{mol} > 10n_{\text{N}_2} + 8n_{\text{N}_2\text{O}} = 0,6\text{mol}$

$\Rightarrow$  Có muối  $\text{NH}_4\text{NO}_3$  tạo thành.

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{Mg} \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 2\text{e}$<br>$0,15 \rightarrow 0,3$<br>$\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + 3\text{e}$<br>$0,1 \rightarrow 0,3$<br>$\text{Al} \rightarrow \text{Al}^{3+} + 3\text{e}$<br>$0,1 \rightarrow 0,3$ | $2\text{N}^{+5} + 10\text{e} \rightarrow \text{N}_2$<br>$0,2 \leftarrow 0,02$<br>$2\text{N}^{+5} + 8\text{e} \rightarrow 2\text{N}^{+1}$<br>$0,4 \leftarrow 0,05$<br>$\text{N}^{+5} + 8\text{e} \rightarrow \text{N}^{-3}$<br>$8z \leftarrow z$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

$$\Rightarrow z = \frac{0,3 + 0,3 + 0,3 - 0,2 - 0,4}{8} = 0,0375\text{mol}$$

$\Rightarrow$  Khối lượng muối trong dung dịch A là

$m_{\text{Al}(\text{NO}_3)_3} = 213 \cdot 0,1 = 21,3\text{gam}$

$m_{\text{Mg}(\text{NO}_3)_2} = 148 \cdot 0,15 = 22,2\text{gam}$


$m_{\text{Fe}(\text{NO}_3)_3} = 242 \cdot 0,1 = 24,2\text{gam}$

$m_{\text{NH}_4\text{NO}_3} = 80 \cdot 0,0375 = 3\text{gam}$


b)  $n_{\text{HNO}_3}$  ban đầu  $= \frac{240 \cdot 31,5}{100 \cdot 63} = 1,2\text{mol}$

$n_{\text{HNO}_3}$  phản ứng  $= 12n_{\text{N}_2} + 10n_{\text{N}_2\text{O}} + 10n_{\text{NH}_4\text{NO}_3} = 1,115\text{mol}$

$\Rightarrow n_{\text{HNO}_3}$  còn  $= 1,2 - 1,115 = 0,085\text{mol}$




$0,031875 \leftarrow 0,085$




$0,05 \leftarrow 0,1$

$\Rightarrow m_{\text{Cu}} = 64(0,031875 + 0,05) = 5,24\text{gam}$

c)




$$0,0375 \rightarrow 0,0375$$



$$0,1 \rightarrow 0,3$$



$$0,15 \rightarrow 0,3$$



$$0,1 \rightarrow 0,4$$

$$\Rightarrow n_{\text{NaOH}} = 0,0375 + 0,3 + 0,3 + 0,4 = 1,0375 \text{ mol}$$

$$\Rightarrow V_{\text{dd NaOH}} = 1,0375 \text{ lít}$$

**Ví dụ 5:** Cho 8,7 gam hỗn hợp X gồm kim loại M (thuộc nhóm IIA) và Al tan hết vào 160 gam dung dịch  $\text{HNO}_3$  31,5%, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y và 1,36345 lít (đkc) hỗn hợp hai khí  $\text{N}_2$  và  $\text{N}_2\text{O}$  có tỉ khối so với  $\text{H}_2$  là 17,636. Dung dịch Y phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng không có khí thoát ra. Mặt khác, cho 4,2 gam kim loại M phản ứng với dung dịch HCl dư thì lượng khí thoát ra vượt quá 2,479 lít (đkc).

a) Xác định tên kim loại M

b) Cho 17,4 gam X trên vào nước dư, tính thể tích khí thoát ra (đkc).

### Giải

a) Gọi a, b lần lượt là số mol  $\text{N}_2$  và  $\text{N}_2\text{O}$ . Ta có hệ:


$$\begin{cases} a + b = 0,055 \\ 28a + 44b = 17,636 \cdot 2 \cdot 0,055 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0,03 \\ b = 0,025 \end{cases}$$

|                                                    |                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| $\text{M} \rightarrow \text{M}^{2+} + 2\text{e}$   | $2\text{N}^{+5} + 10\text{e} \rightarrow \text{N}_2$    |
| $x \rightarrow 2x$                                 | $0,3 \leftarrow 0,03$                                   |
| $\text{Al} \rightarrow \text{Al}^{3+} + 3\text{e}$ | $2\text{N}^{+5} + 8\text{e} \rightarrow 2\text{N}^{+1}$ |
| $y \rightarrow 3y$                                 | $0,2 \leftarrow 0,05$                                   |

$$\Rightarrow 2x + 3y = 0,5 \quad (1)$$

$$\text{Mặt khác: } \text{Mx} + 279 = 8,7 \quad (2)$$

$$\text{Từ (1)(2) rút ra: } x = \frac{4,2}{\text{M} - 18} < 0,25 \Rightarrow \text{M} > 34,8 \quad (*)$$




$$\frac{4,2}{\text{M}} \rightarrow \frac{4,2}{\text{M}}$$

$$\Rightarrow \frac{4,2}{\text{M}} > 0,1 \Rightarrow \text{M} < 42 \quad (**)$$


Từ (\*) và (\*\*)  $34,8 < \text{M} < 42$

Do M là kim loại thuộc nhóm IIA nên  $\text{M} = 40$  (Ca)

b) Trong 17,4 gam X có chứa 0,38 mol Ca và 0,078 mol Al. Ta có:



$$0,38 \rightarrow 0,76 \rightarrow 0,38$$





$$0,078 \rightarrow 0,078 \rightarrow 0,117$$

$$\Rightarrow V_{\text{H}_2} = (0,117 + 0,38) \cdot 22,4 = 11,1328 \text{ lít}$$

**Ví dụ 6:** Cho hỗn hợp gồm a mol FeS<sub>2</sub> và b mol Cu<sub>2</sub>S phản ứng hết với lượng vừa đủ dung dịch HNO<sub>3</sub>, thu được dung dịch X chỉ chứa 2 muối **sulfate** và **11,1555 lít** khí N<sub>2</sub>O (sản phẩm khử duy nhất, ở **đkc**). Tính giá trị của a và b

**Giải**



Theo định luật bảo toàn điện tích:

$$3n_{\text{Fe}^{3+}} + 2n_{\text{Cu}^{2+}} = 2n_{\text{SO}_4^{2-}} \Rightarrow 3a + 4b = 2(2a + b) \Rightarrow a = 2b \quad (1)$$

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{array}{l} \text{FeS}_2 \rightarrow \text{Fe}^{3+} + 2\text{S}^{+6} + 15\text{e}^- \\ a \rightarrow 15a \\ \text{Cu}_2\text{S} \rightarrow 2\text{Cu}^{2+} + \text{S}^{+6} + 10\text{e}^- \\ b \rightarrow 10b \end{array}$ | $\begin{array}{l} 2\text{N}^{+5} + 8\text{e}^- \rightarrow 2\text{N}^{+1} \\ 3,6 \leftarrow 0,9 \end{array}$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

$$\Rightarrow 15a + 10b = 3,6 \quad (2)$$

$$\begin{cases} a = 0,18\text{mol} \\ b = 0,09\text{mol} \end{cases}$$







Giải hệ (1)(2) ta được:

## **DẠNG 2: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ION - ELECTRON**

Phương pháp này sử dụng để giải nhanh nhiều bài toán khó mà nếu giải bằng phương pháp thông thường thì rất mất thời gian thậm chí bế tắc. Lưu ý cách tính nhanh số mol anion tạo muối và số mol acid tham gia phản ứng trong phản ứng oxi - hóa khử.

### **a) Acid H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> đặc**

Không phụ thuộc vào bản chất và số lượng các kim loại ta luôn có các bán phản ứng khử:



$$\Rightarrow n_{\text{SO}_4^{2-} \text{ tạo muối}} = n_{\text{SO}_2} + 3n_{\text{S}} + 4n_{\text{H}_2\text{S}}$$

$$= \frac{2}{2}n_{\text{SO}_2} + \frac{6}{2}n_{\text{S}} + \frac{8}{2}n_{\text{H}_2\text{S}} = \sum \frac{a}{2}n_{\text{X}}$$


(a là số electron mà S<sup>+6</sup> nhận vào để tạo ra sản phẩm khử X)







**Ghi nhớ:**

$$\begin{aligned} \bullet n_{\text{SO}_4^{2-} \text{ tạo muối}} &= \sum \frac{a}{2}n_{\text{X}} \\ \bullet n_{\text{H}_2\text{SO}_4 \text{ phản ứng}} &= 2n_{\text{SO}_2} + 4n_{\text{S}} + 5n_{\text{H}_2\text{S}} \end{aligned}$$

### **b) Acid HNO<sub>3</sub>**

Tương tự như trên ta luôn có các bán phản ứng khử:





•  $n_{\text{NO}_3^{-}}$ , tạo muối với cation kim loại =  $n_{\text{NO}_2} + 3n_{\text{NO}} + 8n_{\text{N}_2\text{O}} + 10n_{\text{N}_2} + 8n_{\text{NH}_4\text{NO}_3}$

•  $n_{\text{HNO}_3}$  phản ứng =  $2n_{\text{NO}_2} + 4n_{\text{NO}} + 10n_{\text{N}_2\text{O}} + 12n_{\text{N}_2} + 10n_{\text{NH}_4\text{NO}_3}$

**Chú ý:** - Các công thức trên **không** thể áp dụng nếu chất khử ban đầu không phải là kim loại.

- Nếu hỗn hợp ban đầu không hoàn toàn là kim loại thì ta nên quy hỗn hợp về các nguyên tố rồi dựa vào phương trình ion - electron của bán phản ứng oxi hoá và bán phản ứng khử để giải.

**Ví dụ 1:** Cho 29 gam hỗn hợp gồm Al, Cu và Ag tác dụng vừa đủ với dịch  $\text{HNO}_3$  1,5M, thu được dung dịch chứa m gam muối và 6,1975 lít hỗn hợp khí X (**đkc**) gồm NO và  $\text{N}_2\text{O}$ . Tỉ khối của X so với  $\text{H}_2$  là 16,4. Giá trị của m là

A. 98,20

B. 97,20

C. 98,75

D. 91,00

(Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2012-Khối B)

**Giải**

Gọi  $x, y$  lần lượt là số mol của NO và  $\text{N}_2\text{O}$  trong hỗn hợp X. Ta có hệ:

$$\begin{cases} x + y = 0,25 \\ 30x + 44y = 8,2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,2 \\ y = 0,05 \end{cases}$$

Giả sử chỉ có sản phẩm khử NO và  $\text{N}_2\text{O}$

$$\Rightarrow n_{\text{HNO}_3} \text{ phản ứng} = 4n_{\text{NO}} + 10n_{\text{N}_2\text{O}} = 4.0,2 + 10.0,05 = 1,3 \text{ mol} < 1,425 \text{ mol}$$

$\Rightarrow$  Có muối  $\text{NH}_4\text{NO}_3$  sinh ra.

$$n_{\text{HNO}_3} \text{ phản ứng} = 4n_{\text{NO}} + 10n_{\text{N}_2\text{O}} + 10n_{\text{NH}_4\text{NO}_3}$$

$$\Rightarrow n_{\text{NH}_4\text{NO}_3} = \frac{1,425 - 4.0,2 - 0,05.10}{10} = 0,0125 \text{ mol}$$

$$\Rightarrow m_{\text{muối}} = m_{\text{kl}} + m_{\text{NO}_3^{-}} (\text{tạo muối với ion kim loại}) + m_{\text{NH}_4\text{NO}_3}$$

$$= 29 + 62(3.0,2 + 8.0,05 + 8.0,0125) + 80.0,0125 = 98,2 \text{ gam}$$

$\Rightarrow$  Đáp án A.

**Ví dụ 2:** Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol  $\text{FeS}_2$  trong 200 ml dung dịch  $\text{HNO}_3$  4M, sản phẩm thu được gồm dung dịch X và một chất khí thoát ra. Dung dịch X có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Biết trong các quá trình trên, sản phẩm khử duy nhất của  $\text{N}^{+5}$  đều là NO. Giá trị của m là

A. 12,8


B. 6,4

C. 9,6

D. 3,2


(Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2012-Khối B)

**Giải**




$$0,1 \rightarrow 0,4 \rightarrow 0,5 \rightarrow 0,1$$

$$\Rightarrow n_{\text{H}^+} \text{ còn} = 0,8 - 0,4 = 0,4 \text{ mol}; n_{\text{NO}_3^{-}} \text{ còn} = 0,8 - 0,5 = 0,3 \text{ mol}$$



$$0,15 \leftarrow 0,4 \rightarrow 0,1$$



$$0,05 \leftarrow 0,1$$

$$\Rightarrow m_{\text{Cu}} = 64 \cdot 0,2 = 12,8 \text{ gam} \Rightarrow \text{Đáp án A}$$


**Ví dụ 3:** Cho 19,2 gam Cu vào 500 ml dung dịch  $\text{NaNO}_3$  1M, sau đó thêm vào 500 ml dung dịch HCl 2M, Kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và khí NO duy nhất, phải thêm bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1M vào X để kết tủa hết ion  $\text{Cu}^{2+}$

A. 120

B. 400

C. 600


D. 800

**Giải**


$$\text{Bđ: } 0,3 \quad 1 \quad 0,5$$

$$\text{Pư: } 0,3 \rightarrow 0,8 \rightarrow 0,2 \rightarrow 0,3$$

$$\text{Còn: } 0 \quad 0,2 \quad 0,3$$



$$0,2 \rightarrow 0,2$$



$$0,3 \rightarrow 0,6$$

$$\Rightarrow n_{\text{NaOH}} = 0,2 + 0,6 = 0,8 \text{ mol} \Rightarrow V = \frac{0,8}{1} = 0,8 \text{ lít} = 800 \text{ ml} = \text{Đáp án D}$$

**Ví dụ 4:** Chia 23,0 gam hỗn hợp M gồm Al, Cu và Mg thành hai phần bằng nhau.




Phần 1 tác dụng với dung dịch HCl dư, sinh ra 6,1975 lít  $\text{H}_2$  (đkc). Hoà tan hết phần 2 trong 120 gam dung dịch  $\text{HNO}_3$  63% đun nóng, kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 9,916 lít (đkc) hỗn hợp hai khí NO,  $\text{NO}_2$  có tỉ khối so với  $\text{H}_2$  là 20. X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, không có khí mùi khai thoát ra.

a) Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong M.

b) Tính nồng độ phần trăm các chất trong X. Coi nước bay hơi không đáng kể trong quá trình phản ứng.

**Giải****a)**

• Phần 1: Cu không phản ứng



$$\Rightarrow n_{\text{H}_2} = \text{x} + 1,5\text{y} = 0,25 \quad (1)$$

• Phần 2: Gọi a, b lần lượt là số mol của NO và  $\text{NO}_2$  chứa trong 0,4 mol hỗn hợp khí.

$$\text{Ta có hệ: } \begin{cases} a + b = 0,4 \\ 30a + 46b = 16 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0,15 \\ b = 0,25 \end{cases}$$

$$\Rightarrow n_{\text{HNO}_3 \text{ phản ứng}} = 4n_{\text{NO}} + 2n_{\text{NO}_2} = 1,1 \text{ mol} < n_{\text{HNO}_3 \text{ ban đầu}} = 1,2 \text{ mol} \text{ nên kim loại hết, axit còn}$$

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{Mg} \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 2\text{e}$<br>$\text{x} \rightarrow \text{x} \rightarrow 2\text{x}$<br>$\text{Al} \rightarrow \text{Al}^{3+} + 3\text{e}$<br>$\text{y} \rightarrow \text{y} \rightarrow 3\text{y}$<br>$\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}$<br>$\text{z} \rightarrow \text{z} \rightarrow 2\text{z}$ | $4\text{H}^+ + \text{NO}_3^- + 3\text{e} \rightarrow \text{NO} + 2\text{H}_2\text{O}$<br>$0,6 \leftarrow 0,45 \leftarrow 0,15$<br>$2\text{H} + \text{NO}_3^- + 1\text{e} \rightarrow \text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O}$<br>$0,5 \leftarrow 0,25 \leftarrow 0,25$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

$$\Rightarrow 2x + 3y + 2z = 0,7 \quad (2)$$

$$\text{Mặt khác: } 24x + 23y + 64z = 11,5 \quad (3)$$

$$\text{Giải hệ (1), (2), (3) ta được: } \begin{cases} x = 0,22 \text{ mol} \\ y = 0,03 \text{ mol} \\ z = 0,085 \text{ mol} \end{cases}$$

Phần trăm khối lượng các chất trong M là

$$\%m_{Al} = \frac{27 \cdot 0,03 \cdot 100\%}{11,5} = 7,04\%$$

$$\%m_{Mg} = \frac{24 \cdot 0,22 \cdot 100\%}{11,5} = 45,91\%$$

$$\%m_{Cu} = 100\% - (7,04 + 45,91)\% = 47,05\%$$

b) Khối lượng dung dịch X là

$$11,5 + 120 - 30 \cdot 0,15 - 46 \cdot 0,25 = 115,5 \text{ gam}$$

$$\Rightarrow n_{HNO_3 \text{ còn}} = 1,2 - 1,1 = 0,1 \text{ mol}$$

Nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch X là

$$C\%_{HNO_3} = \frac{63 \cdot 0,1 \cdot 100\%}{115,5} = 5,45\%$$

$$C\%_{Mg(NO_3)_2} = \frac{148 \cdot 0,22 \cdot 100\%}{115,5} = 28,19\%$$

$$C\%_{Cu(NO_3)_2} = \frac{188 \cdot 0,085 \cdot 100\%}{115,5} = 13,83\%$$

$$C\%_{Al(NO_3)_3} = \frac{213 \cdot 0,03 \cdot 100\%}{115,5} = 5,53\%$$

**Ví dụ 5:** Cho 42 gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu vào 1 lít dung dịch  $HNO_3$  1M, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y,  $V_1$  lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đkc) và còn lại m gam Cu không tan. Nhỏ 800 ml dung dịch HCl 1M vào thì kim loại vừa tan hết và thu thêm  $V_2$  lít khí NO nữa (đkc).

a) Tính  $V_1$ ,  $V_2$  và m.




b) Tính phần trăm khối lượng các kim loại trong X.

**Giải**

a) Gọi x, y lần lượt là số mol Fe và Cu chứa trong 42 gam X. Ta có:

$$56x + 64y = 42 \quad (1)$$

$$n_{HNO_3} = 1 \text{ mol}; n_{HCl} = 0,8 \text{ mol}$$



$$0,8 \rightarrow 0,8$$

$$\Rightarrow \sum n_{H^+} = 1 + 0,8 = 1,8 \text{ mol}$$

Vì Cu còn dư nên Fe chỉ bị oxi hoá lên  $Fe^{2+}$ . Khi nhỏ tiếp HCl vào hỗn hợp thực chất là thêm  $H^+$  thì do tính khử của  $Fe^{2+}$  yếu hơn Cu nên Cu phản ứng hết. Khi Cu vừa tan hết thì ngừng thêm  $H^+$  nên  $Fe^{2+}$  chưa bị oxi hoá thành  $Fe^{3+}$

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}$ $\text{x} \rightarrow \text{x} \rightarrow 2\text{x}$ $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}$ $\text{y}_1 \rightarrow \text{y}_1 \rightarrow 2\text{y}_1$ <p>Khi thêm HCl</p> $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}$ $(\text{y} \cdot \text{y}_1) \rightarrow 2(\text{y} - \text{y}_1)$ | <p>Khi chưa thêm</p> $4\text{H}^+ + \text{NO}_3^- + 3\text{e} \rightarrow \text{NO} + 2\text{H}_2\text{O}$ $1 \rightarrow 0,25 \rightarrow 0,75 \rightarrow 0,25$ $n_{\text{NO}_3^-} \text{ còn} = 1 - 0,25 = 0,75\text{mol}$ $\Rightarrow V_1 = 0,25 \cdot 22,4 = 5,6 \text{ lít}$ <p>Khi thêm HCl</p> $4\text{H}^+ + \text{NO}_3^- + 3\text{e} \rightarrow \text{NO} + 2\text{H}_2\text{O}$ $0,8 \rightarrow 0,2 \rightarrow 0,6 \rightarrow 0,2$ $\Rightarrow V_2 = 0,2 \cdot 22,4 = 4,48 \text{ lít}$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Theo định luật bảo toàn số mol electron.

Ta có:  $2(\text{x} + \text{y}) = 0,75 + 0,6 = \text{x} + \text{y} = 0,675$  (2)

Giải hệ (1)(2) ta được: 
$$\begin{cases} \text{x} = 0,15 \\ \text{y} = 0,525 \end{cases}$$

Mặt khác:  $2\text{x} + 2\text{y}_1 = 0,75 \Rightarrow \text{y}_1 = 0,225\text{mol}$

$\Rightarrow n_{\text{Cu dư}} = \text{y} - \text{y}_1 = 0,525 - 0,225 = 0,3\text{mol} \Rightarrow m = 64 \cdot 0,3 = 19,2\text{gam}$

b) Phần trăm khối lượng các kim loại trong X là

$$\% \text{Fe} = \frac{56 \cdot 0,15 \cdot 100\%}{42} = 20\%$$

$$\% \text{Cu} = 100\% - 20\% = 80\%$$

**Ví dụ 6:** Hoà tan hết 0,03 mol hỗn hợp X gồm MgS, FeS và CuS trong dung dịch HNO<sub>3</sub>, kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y (chỉ chứa muối **nitrate** và muối **sulfate**) và 0,15 mol hỗn hợp khí X gồm NO<sub>2</sub> và NO có tỉ khối so với 20,33. Cho Y phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng, không có khí thoát ra. Số mol HNO<sub>3</sub> đã phản ứng là

A. 0,16

B. 0,4

C. 0,5

D. 0,2

**Giải**

Gọi a, b lần lượt là số mol của NO<sub>2</sub> và NO.

Ta có hệ: 
$$\begin{cases} \text{a} + \text{b} = 0,15 \\ 46\text{a} + 30\text{b} = 2 \cdot 20,33 \cdot 0,15 = 6,1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \text{a} = 0,1 \\ \text{b} = 0,05 \end{cases}$$

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{FeS} + 4\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + 8\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} + 9\text{e}$ $\text{x} \rightarrow 8\text{x}$ $\text{CuS} + 4\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 8\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} + 8\text{e}$ $\text{y} \rightarrow 8\text{y}$ $\text{MgS} + 4\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 8\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} + 8\text{e}$ $\text{z} \rightarrow 8\text{z}$ | $\text{NO}_3^- + 4\text{H}^+ + 3\text{e} \rightarrow \text{NO} + 2\text{H}_2\text{O}$ $0,2 \leftarrow 0,05$ $\text{NO}_3^- + 2\text{H}^+ + 1\text{e} \rightarrow \text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ $0,2 \leftarrow 0,1$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

$\Rightarrow n_{\text{HNO}_3 \text{ phản ứng}} = 0,2 + 0,2 - 8(\text{x} + \text{y} + \text{z}) = 0,4 - 8 \cdot 0,03 = 0,16 \text{ mol}$

$\Rightarrow$  Đáp án A

### DẠNG 3: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI

a) *Phương pháp quy đổi về nguyên tố*

**Dấu hiệu nhận dạng** bài toán vận dụng phương pháp quy đổi:

- Bài toán hỗn hợp, trong đó tổng số chất và hợp chất nhiều hơn tổng số nguyên tố tạo thành hỗn hợp đó.

- Bài toán hỗn hợp các oxit, sunfua của kim loại; xác định thành phần các nguyên tố trong hỗn hợp phức tạp; các hợp chất khó xác định số oxi hóa Cu, FeS<sub>2</sub>, CuFeS<sub>4</sub>, ...

*Các bước giải toán theo phương pháp quy đổi về nguyên tố*

• **Bước 1:** Quy hỗn hợp các chất về các nguyên tố tạo thành hỗn hợp. Đặt ẩn số thích hợp cho số mol nguyên tử các nguyên tố trong hỗn hợp.

• **Bước 2:** - Lập các phương trình dựa vào các định luật bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố và bảo toàn số mol electron,....

- Lập các phương trình dựa vào các dữ kiện bài toán đã cho (nếu có).

• **Bước 3:** Giải hệ gồm các phương trình đã thiết lập được ở bước 2 và tính toán kết quả bài toán theo yêu cầu.

**Ví dụ 1:** Cho 18,4 gam hỗn hợp X gồm Cu<sub>2</sub>S, CuS, FeS<sub>2</sub> và FeS tác dụng hết với HNO<sub>3</sub> (đặc nóng, dư) thu được V lít khí chỉ có NO<sub>2</sub> (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Cho toàn bộ Y vào một lượng dư dung dịch BaCl<sub>2</sub>, thu được 46,6 gam kết tủa, còn khi cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch NH<sub>3</sub> dư thu được 10,7 gam kết tủa. Giá trị của V là

A. 42,143

B. 11,2

C. 24,64

D. 16,8

(Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2012-Khối A)

**Giải**

Quy X về Cu, Fe và S.

$$n_{\text{Fe}} = n_{\text{Fe(OH)}_3} = 0,1\text{mol}; n_{\text{S}} = n_{\text{BaSO}_4} = 0,2\text{mol}$$

$$\Rightarrow n_{\text{Cu}} = \frac{18,4 - 56 \cdot 0,1 - 32 \cdot 0,2}{64} = 0,1\text{mol}$$

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + 3\text{e}$<br>$0,1 \rightarrow 0,3$<br>$\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}$<br>$0,1 \rightarrow 0,2$<br>$\text{S} \rightarrow \text{S}^{+6} + 6\text{e}$<br>$0,2 \rightarrow 1,2$ | $\text{N}^{+5} + 1\text{e} \rightarrow \text{N}^{+4}$<br>$a \leftarrow a$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

$$\Rightarrow a = 0,3 + 0,2 + 1,2 = 1,7\text{mol} \Rightarrow V = 42,143 \text{ lít}$$

⇒ Đáp án A

**Ví dụ 2:** Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS<sub>2</sub> trong một bình kín chứa không khí (gồm 20% thể tích O<sub>2</sub> và 80% thể tích N<sub>2</sub>) đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một chất rắn duy nhất và hỗn hợp khí Y có thành phần thể tích: 84,8% N<sub>2</sub>, 14% SO<sub>2</sub>, còn lại là O<sub>2</sub>. Phần trăm khối lượng của FeS trong hỗn hợp X là

A. 59,46%.

B. 19,64%.




C. 42,31%.

D.

26,83%

**Giải**

**Cách 1:** Quy hỗn hợp thành Fe và S



Ban đầu:  $n_{\text{O}_2} = 0,2(\text{mol}); n_{\text{N}_2} = 0,8(\text{mol})$

Sau phản ứng:  $n_{O_2} = 0,2 \div x - y$ ;  $n_{N_2} = 0,8$ ;  $n_{SO_2} = x$

Tổng số mol khí sau phản ứng:  $0,2 - x - y + 0,8 + x = 1 - y$

$$\%V_{N_2} = \frac{0,8}{1-y} = \frac{84,8}{100} \Rightarrow y = 0,0566(\text{mol})$$

$$\%V_{SO_2} = \frac{x}{1-0,0566} = \frac{14}{100} \Rightarrow x = 0,132076(\text{mol})$$

Đặt  $n_{FeS} = a(\text{mol})$ ;  $n_{FeS_2} = b(\text{mol})$

$$\begin{cases} a + b = 0,0566 \cdot \frac{4}{3} \\ a + 2b = 0,132076 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0,01885773 \\ b = 0,0566093 \end{cases}$$


$$\Rightarrow \%m_{FeS} = \frac{0,01885773 \cdot 88 \cdot 100\%}{0,01885773 \cdot 88 + 120 \cdot 0,0566093} = 19,64\% \Rightarrow \text{Đáp án B}$$

Cách 2: Coi  $n_Y = 1(\text{mol}) \Rightarrow n_{N_2} = 0,848(\text{mol})$ ;  $n_{SO_2} = 0,14(\text{mol})$


$$n_{O_2} (\text{dư}) - 1 - 0,848 - 0,14 = 0,012(\text{mol})$$

$$\Rightarrow n_{O_2} (\text{ban đầu}) = 0,212 - 0,012 = 0,2(\text{mol})$$

$$\Rightarrow n_{O_2} (\text{phản ứng}) = 0,212 - 0,012 = 0,2(\text{mol})$$



$$x \quad \frac{7}{4}x \quad x$$



$$y \quad \frac{11}{4}y \quad 2y$$

$$\begin{cases} \frac{7}{4}x + \frac{11}{4}y = 0,2 \\ x + 2y = 0,14 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,02(\text{mol}) \\ y = 0,06(\text{mol}) \end{cases}$$

Ta có hệ:

$$\Rightarrow \%FeS = \frac{0,02 \cdot 88 \cdot 100\%}{0,02 \cdot 88 + 0,06 \cdot 120} = 19,64\%$$

**Ví dụ 3:** Cho 11,36 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> phản ứng hết với dung dịch HNO<sub>3</sub> đặc, nóng (dư) thu được 19,3362 lít khí thoát ra (đkc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 38,72

B. 35,5

C. 49,09

D. 34,36

**Giải**

Quy hỗn hợp X về hai nguyên tố Fe: x mol và ): y mol.

$$\Rightarrow 56x + 16y = 11,36$$

(1)

|                                                                                                                          |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Quá trình oxi hóa</p> $Fe^0 \rightarrow Fe^{3+} + 3e$ $x \quad x \quad 3x$ $O^0 \rightarrow O^{-2} + 2e$ $y \quad 2y$ | <p>Quá trình khử</p> $N^{+5} + 1e \rightarrow N^{+4}$ $0,18 \leftarrow 0,18$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

$$\Rightarrow 3x + 2y = 0,78 \quad (2)$$

Giải hệ (1), (2) ta được:  $x = 0,16 \text{ mol}$ ;  $y = 0,15 \text{ mol}$

$$\Rightarrow n_{\text{Fe}(\text{NO}_3)_3} = n_{\text{Fe}^{3+}} = 0,16 \text{ mol} \Rightarrow m_{\text{Fe}(\text{NO}_3)_3} = 242 \times 0,16 = 38,72 \text{ gam}$$

$\Rightarrow$  Đáp án A.

**Ví dụ 4:** Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm Fe, FeS, FeS<sub>2</sub>, S trong dung dịch HNO<sub>3</sub> đặc, đun nóng (dư), thu được dung dịch B và 10,04 lít khí NO<sub>2</sub> (sản phẩm khử duy nhất, đkc). Cho B tác dụng với dung dịch BaCl<sub>2</sub> dư thu được 11,65 gam kết tủa trắng. Giá trị của m là

A. 3,56

B. 4,02

C. 2,15

D. 2,1

**Giải**

Coi hỗn hợp A gồm x mol Fe và y mol S

• A + HNO<sub>3</sub> đặc, dư:

| Quá trình oxi hóa                             | Quá trình khử                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| $\text{Fe}^0 \rightarrow \text{Fe}^{3+} + 3e$ | $\text{N}^{+5} + 1e \rightarrow \text{N}^{+4}$ |
| x            x            3x                  | 0,405 ← 0,405                                  |
| $\text{S}^0 \rightarrow \text{S}^{+6} + 6e$   |                                                |
| y            y            6y                  |                                                |

$$\Rightarrow 3x + 6y = 0,405 \quad (*)$$

$$\bullet \text{ B + dd BaCl}_2 : n_{\text{BaSO}_4} = \frac{11,65}{233} = 0,05$$



$$\Rightarrow y = 0,05 \text{ mol}$$

Thay y và (\*) ta tìm được:  $x = 0,035 \text{ mol}$

$$\Rightarrow m = 56 \times 0,035 + 32 \times 0,05 = 3,56 \text{ gam} \Rightarrow \text{Đáp án A}$$

**Ví dụ 5:** Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm FeS<sub>2</sub> và một **oxide iron** cần dùng 0,6 mol O<sub>2</sub> thu được 0,4 mol Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> và 0,4 mol SO<sub>2</sub>. Cho m gam hỗn hợp X trên tác dụng với dung dịch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> đặc nóng, dư đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sản phẩm khử duy nhất là SO<sub>2</sub> thì số mol H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> tham gia phản ứng là bao nhiêu?

A. 3,0 mol.

B. 2,8 mol.

C. 2,4 mol.

D. 2,0 mol.

**Giải**

Quy X về Fe, S và O. Ta có:  $n_{\text{Fe}} = 2n_{\text{Fe}_2\text{O}_3} = 0,8 \text{ mol}$ ;  $n_{\text{S}} = n_{\text{SO}_2} = 0,4 \text{ mol}$

$$\Rightarrow n_{\text{O}}(\text{X}) = 3n_{\text{Fe}_2\text{O}_3} + 2n_{\text{SO}_2} - 2n_{\text{O}_2} = 0,8 \text{ mol}$$

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + 3e$<br>$0,8 \rightarrow 0,8 \rightarrow 2,4$<br>$\text{S} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{SO}_2 + 4\text{H}^+ + 4e$<br>$0,4 \rightarrow \qquad \qquad 1,6 \rightarrow 1,6$<br>$\text{O} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{O} - 2e$<br>$0,8 \rightarrow 1,6 \rightarrow 1,6$ | $2\text{H}_2\text{SO}_4 + 2e \rightarrow \text{SO}_2 + \text{SO}_4^{2-} + 2\text{H}_2\text{O}$<br>$2x \quad \leftarrow 2x \quad \leftarrow x$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

$$\Rightarrow 2,4 + 1,6 - 1,6 = 2x \Rightarrow x = 1,2 \text{ mol}$$

$$\Rightarrow n_{\text{H}_2\text{SO}_4} \text{ phản ứng} = 2 \cdot 1,2 + 0,8 - 0,8 = 2,4 \text{ mol} \Rightarrow \text{Đáp án C}$$

**Ví dụ 6:** Hòa tan hoàn toàn 40 gam hỗn hợp gồm  $\text{FeS}_2$ ,  $\text{CuS}$ ,  $\text{FeS}$  bằng dung dịch  $\text{HNO}_3$  thì thu được dung dịch X chỉ chứa hai muối và 4 mol  $\text{NO}_2$ , không có kết tủa tạo ra. Cho dung dịch  $\text{NH}_3$  dư vào dung dịch X, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thì thu được bao nhiêu gam chất rắn?

A. 32,0.

B. 21,4

C. 24,0.

D. 16,0.

**Giải**

Quy hỗn hợp về Fe, S và Cu. Ta có:  $56x + 32y + 64z = 40$

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + 3\text{e}$<br>$x \quad x \quad 3x$<br>$\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}$<br>$z \quad z \quad 2z$<br>$\text{S} \rightarrow \text{S}^{+6} + 6\text{e}$<br>$y \quad y \quad 6y$ | $\text{N}^{+5} + 1\text{e} \rightarrow \text{N}^{+4}$<br>$4 \leftarrow 4$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|



$$\Rightarrow 3x + 2z + 6y = 4 \quad (2)$$

Dung dịch thu được chỉ chứa hai muối nên

$$3n_{\text{Fe}^{3+}} + 2n_{\text{Cu}^{2+}} = 2n_{\text{SO}_4^{2-}} \Rightarrow 3x + 2z = 2y \text{ hay } 3x - 2y + 2z = 0 \quad (3)$$

$$\text{Giải hệ (1), (2) và (3) ta được: } \begin{cases} x = 0,2 \text{ mol} \\ y = 0,5 \text{ mol} \\ z = 0,2 \text{ mol} \end{cases}$$

Giải hệ (1), (2) và (3) ta được:



$$\Rightarrow m_{\text{CR}} = 160 \cdot 0,1 = 16 \text{ gam} \Rightarrow \text{Đáp án D}$$

**Ví dụ 7:** Hoà tan hết 17,92 gam hỗn hợp X gồm  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ ,  $\text{FeO}$ ,  $\text{Fe}$ ,  $\text{CuO}$ ,  $\text{Cu}$ ,  $\text{Al}$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$  (trong đó oxygen chiếm 25,446% phần trăm về khối lượng) trong dung dịch  $\text{HNO}_3$ , kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y và 1,921 lít hỗn hợp khí Z gồm  $\text{N}_2$  và  $\text{N}_2\text{O}$ . Tỉ khối của Z so với  $\text{H}_2$  là 15,29. Cho  $\text{NaOH}$  vào Y rồi đun nóng, không có khí thoát ra. Số mol  $\text{HNO}_3$  đã phản ứng với X là

A. 1,215 mol

B. 0,645 mol

C. 1,392 mol

D. 0,75 mol

**Giải**




Gọi a, b lần lượt là số mol của  $\text{N}_2$  và  $\text{N}_2\text{O}$ . Ta có hệ:


$$\begin{cases} a + b = \frac{1,921}{24,79} = 0,0775 \\ 28a + 44b = 15,29 \cdot 2 \cdot 0,0775 = 2,37 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0,065 \\ b = 0,0125 \end{cases}$$

• Cho  $\text{NaOH}$  vào Y rồi đun nóng, không có khí thoát ra chứng tỏ không có phản ứng tạo muối  $\text{NH}_4\text{NO}_3$ .

$$n_{\text{O(X)}} = \frac{17,92 \cdot 25,446}{16 \cdot 100} = 0,285 \text{ mol}$$

Quy X về Fe, Cu, Al và O. Để tính số mol  $\text{HNO}_3$  phản ứng, ta dựa vào bán phản ứng khử sau:





$$8.0,065 \leftarrow 0,065$$

$$\Rightarrow n_{\text{HNO}_3} \text{ phản ứng} = 2,0,285 + 10,0,0125 + 8,0,065 = 1,215 \text{ mol}$$

$\Rightarrow$  Đáp án A

**Ví dụ 8:** Hoà tan hết 2,44 gam hỗn hợp X gồm  $\text{FeS}_2$ ,  $\text{FeS}$ ,  $\text{Fe}$ ,  $\text{Cu}$  và  $\text{Cu}_2\text{S}$  trong 50 gam dung dịch  $\text{HNO}_3$  63% đun nóng, thu được dung dịch Y trong đó nồng độ của acid giảm xuống còn 39,13% và 4,834 lít  $\text{NO}_2$  (sản phẩm khử duy nhất, đkc). Coi rằng nước bay hơi không đáng kể trong quá trình phản ứng. Tổng khối lượng của nguyên tố **iron** trong 2,44 gam X là

A. 0,84 gam

B. 0,56 gam

C. 1,12 gam

D. 1,68 gam

**Giải**

$$n_{\text{NO}_2} = \frac{4,834}{24,79} = 0,195 \text{ mol} \Rightarrow m_Y = 2,44 + 50 - 46 \cdot 0,195 = 43,47 \text{ gam}$$

$$n_{\text{HNO}_3} \text{ ban đầu} = \frac{50 \cdot 63}{100 \cdot 63} = 0,5 \text{ mol}$$

$$n_{\text{HNO}_3} \text{ còn} = \frac{39,13 \cdot 43,47}{100 \cdot 63} = 0,27 \text{ mol} \Rightarrow n_{\text{HNO}_3} \text{ phản ứng} = 0,5 - 0,27 = 0,23 \text{ mol}$$

Quy Y về Fe, Cu và S.

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + 3e$<br>$x \rightarrow 3x$<br>$\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2e$<br>$y \rightarrow 2y$<br>$\text{S} + 4\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{SO}_4^{2-} + 8\text{H}^+ + 6e$<br>$z \rightarrow 8z \rightarrow 6z$ | $\text{NO}_3^- + 2\text{H}^+ + 1e \rightarrow \text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O}$<br>$0,39 \leftarrow 0,195 \leftarrow 0,195$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Theo định luật bảo toàn electron:  $3x + 2y + 6z = 0,195$  (1)

Mặt khác:  $n_{\text{HNO}_3} \text{ phản ứng} = n_{\text{H}^+} \text{ phản ứng} = 0,39 - 8z = 0,23 \Rightarrow 0,16 = 8z$  (2)

$$(1) = 3x + 2y = 0,075 \quad (2)$$

$$\text{Ngoài ra: } 56x + 64y + 32,0,02 = 2,44 = 56x + 64y = 1,8 \quad (3)$$

$$\text{Giải hệ (2), (3) ta được: } \begin{cases} x = 0,015 \text{ mol} \\ y = 0,015 \text{ mol} \end{cases} \Rightarrow \sum m_{\text{Fe}} = 0,84 \text{ gam} \Rightarrow$$

Đáp án A

**Ví dụ 9:** Hoà tan hoàn toàn 40 gam hỗn hợp gồm  $\text{FeS}_2$ ,  $\text{CuS}$ ,  $\text{FeS}$  bằng dung dịch  $\text{HNO}_3$  thì thu được dung dịch X chỉ chứa hai muối và 4 mol  $\text{NO}_2$ , không có kết tủa tạo ra. Cho dung dịch  $\text{NH}_3$  tới dư vào dung dịch X, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thì thu được bao nhiêu gam chất rắn?

A. 21,4.

B. 16,0.

C. 24,0.

D. 32,0.

**Giải**

Quy hỗn hợp về Fe, S và Cu. Ta có:  $56x + 32y + 64z = 40$  (1)



|                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + 3e$<br>$x \rightarrow 3x$<br>$\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2e$<br>$z \rightarrow 2z$<br>$\text{S} \rightarrow \text{S}^{+6} + 6e$<br>$y \rightarrow 6y$ | $\text{N}^{+5} + 1e \rightarrow \text{N}^{+4}$<br>$4 \leftarrow 4$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

$$\Rightarrow 3x + 2z + 6y = 4 \quad (2)$$

Dung dịch thu được chỉ chứa hai muối nên

$$3n_{\text{Fe}^{3+}} + 2n_{\text{Cu}^{2+}} = 2n_{\text{SO}_4^{2-}} = 3x + 2z = 2y \text{ hay } 3x - 2y + 2z = 0 \quad (3)$$

$$\text{Giải hệ (1), (2) và (3) ta được: } \begin{cases} x = 0,2 \text{ mol} \\ y = 0,5 \text{ mol} \\ z = 0,2 \text{ mol} \end{cases}$$



$$\Rightarrow m_{\text{CR}} = 160.0,1 = 16 \text{ gam}$$

$\Rightarrow$  Đáp án B

**Ví dụ 10:** Chia 42,72 gam hỗn hợp X gồm  $\text{Fe}_3\text{O}_4, \text{Fe}_2\text{O}_3, \text{FeO}, \text{CuO}, \text{Cu}$  thành hai phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với lượng dư khí CO đun nóng, kết thúc các phản ứng thu được chất rắn khan có khối lượng giảm 3,36 gam so với khối lượng phần 1. Cho phần 2 tác dụng hết với 200 gam dung dịch  $\text{HNO}_3$  31,5%, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y và 2,7269 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đkc).

a) Tính số mol  $\text{HNO}_3$  đã phản ứng.

b) Dung dịch Y hoà tan tối đa bao nhiêu gam Cu. Biết sản phẩm khử của  $\text{N}^{+5}$  là  $\text{N}^{+2}$  duy nhất.

c) Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch  $\text{NH}_3$ . Tính khối lượng kết tủa thu được sau khi kết thúc các phản ứng.

### Giải

a) Quy X về Fe, Cu và O.

• Phần 1 + CO,  $t^0$  :

$$\Rightarrow n_{\text{O}} \text{ (trong mỗi phần)} = \frac{3,36}{16} = 0,21 \text{ mol}$$

$$\text{• Phần 2 + HNO}_3: n_{\text{NO}} = \frac{2,7269}{24,79} = 0,11 \text{ mol}; n_{\text{HNO}_3} \text{ ban đầu} = \frac{200.31,5}{63.100} = 1 \text{ mol}$$

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + 3e$<br>$x \rightarrow x \rightarrow 3x$<br>$\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2e$<br>$y \rightarrow y \rightarrow 2y$ | $\text{O} + 2\text{H}^+ + 2e \rightarrow \text{H}_2\text{O}$<br>$0,21 \rightarrow 0,42 \rightarrow 0,42$<br>$4\text{HNO}_3 + 3e \rightarrow \text{NO} + 2\text{H}_2\text{O} + 3\text{NO}_3^-$<br>$0,44 \leftarrow 0,33 \leftarrow 0,11 \rightarrow 0,33$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

$$\Rightarrow 3x + 2y = 0,42 + 0,33 = 0,75 \quad (1)$$

$$\text{Mặt khác: } 56x + 64y = 21,36 - 16.0,21 = 18 \quad (2)$$

$$\text{Giải hệ (1)(2) ta được: } \begin{cases} x = 0,15 \text{ mol} \\ y = 0,15 \text{ mol} \end{cases}$$


$$\Rightarrow n_{\text{HNO}_3} \text{ phản ứng} = 0,42 + 0,44 = 0,86 \text{ mol}$$

$$\Rightarrow n_{\text{H}^+} \text{ còn} = 1 - 0,86 = 0,14 \text{ mol};$$


$$n_{\text{NO}_3^-} \text{ còn} = 1 - 0,11 = 0,89 \text{ mol}$$

b) Dung dịch Y gồm:

$$0,15 \text{ mol Fe}^{3+}; 0,15 \text{ mol Cu}^{2+}; 0,14 \text{ mol H}^+ \text{ và } 0,89 \text{ mol NO}_3^-$$





$$0,0525 \leftarrow 0,14$$



$$0,075 \leftarrow 0,15$$

$$\Rightarrow m_{\text{Cu}} = (0,0525 + 0,075) \cdot 64 = 8,16 \text{ gam}$$

c)  $\text{Y} + \text{NH}_3$  dư:



$$\Rightarrow m_{\text{kết tủa}} = 107,0,15 = 16,05 \text{ gam}$$

### b) Phương pháp quy đổi về phân tử

Một vài chú ý khi sử dụng phương pháp quy đổi về phân tử:

1. Khi quy hỗn hợp nhiều chất (hỗn hợp X) thành hỗn hợp hai hay chỉ còn một chất ta phải bảo toàn số mol nguyên tử hay bảo toàn khối lượng của hỗn hợp.
2. Có thể quy đổi hỗn hợp X về bất kì cặp nào, thậm chí quy về một chất. Tuy nhiên ta nên chọn cặp chất nào, thậm chí quy đổi về một chất. Tuy nhiên ta nên chọn cặp chất nào đơn giản có ít phản ứng oxi hóa - khử nhất để đơn giản việc tính toán.
3. Trong quá trình tính toán theo phương pháp quy đổi đôi khi ta gặp số âm đó là do sự bù trừ khối lượng các chất trong hỗn hợp. Trong trường hợp này ta vẫn tính toán bình thường và kết quả cuối cùng vẫn thỏa mãn.

4. Khi quy đổi hỗn hợp X về một chất  $\text{Fe}_x\text{O}_y$  thì oxide  $\text{Fe}_x\text{O}_y$  tìm được chỉ là oxide giả định không có thực.

**Ví dụ 1:** Cho **9,916 lít** hỗn hợp 2 khí  $\text{H}_2$  và  $\text{CO}$  (**đkc**) đi qua ống sứ đựng  $0,2 \text{ mol Al}_2\text{O}_3$  và  $0,3 \text{ mol CuO}$  nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn X. X phản ứng vừa đủ trong  $0,5 \text{ lít}$  dung dịch  $\text{HNO}_3$  có nồng độ  $a \text{ M}$  (sản phẩm khử là khí  $\text{NO}$  duy nhất). Giá trị của  $a$  là

A. 3,67.


B. 2,80.

C. 4,00.


D. 2,00.

**Giải**


Quy hỗn hợp khí về  $\text{H}_2$ :  $0,4 \text{ (mol)}$



$$0,3 \rightarrow 0,3 \rightarrow 0,3$$



$$0,3 \rightarrow 0,8$$



$$0,2 \rightarrow 1,2$$

$$\Rightarrow a = \frac{1,2 + 0,8}{0,5} = 4\text{M} \Rightarrow \text{Đáp án C}$$

**Ví dụ 2:** Nung  $8,4 \text{ gam Fe}$  trong không khí, sau phản ứng thu được  $m \text{ gam}$  chất rắn X gồm  $\text{Fe}$ ,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  và  $\text{FeO}$ . Hòa tan  $m \text{ gam}$  hỗn hợp X vào dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  đặc, nóng (dư), thu được **1,2395 lít**  $\text{SO}_2$  (**đkc**). Giá trị của  $m$  là

A. 11,2 gam


B. 10,2 gam

C. 7,2 gam

D. 6,9 gam

**Giải**

• Quy hỗn hợp X về hai chất  $\text{FeO}$ ,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$




$$0,1 \leftarrow 0,05$$

Áp dụng ĐLBTK nguyên tố:

$$n_{\text{Fe}_2\text{O}_3} = \frac{1}{2}(n_{\text{Fe}} - n_{\text{FeO}}) = \frac{1}{2}\left(\frac{8,4}{56} - 0,1\right) = 0,025\text{mol}$$

$$\Rightarrow m = 160 \cdot 0,025 + 72 \cdot 0,1 = 11,2\text{gam} \Rightarrow \text{Đáp án A}$$

• Quy hỗn hợp X về hai chất Fe, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:




$$0,1/3 \quad \leftarrow \quad 0,05$$

$\Rightarrow$  Áp dụng ĐLBT nguyên tố:

$$n_{\text{Fe}_2\text{O}_3} = \frac{1}{2}(n_{\text{Fe}} - n_{\text{Fe(X)}}) = \frac{1}{2}\left(\frac{8,4}{56} - 0,1/3\right) = \frac{0,35}{6}\text{mol}$$

$$\Rightarrow m = 160 \cdot \frac{0,35}{6} + 56 \cdot \frac{0,1}{3} = 11,2\text{gam} \Rightarrow \text{Đáp án A}$$

• Quy hỗn hợp X về một chất Fe<sub>x</sub>O<sub>y</sub>



$$0,1/(3x - 2y) \quad \leftarrow \quad 0,05$$

$$\Rightarrow n_{\text{Fe}} = 0,15 = 0,1x / (3x - 2y) \Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{6}{7} (\text{Fe}_6\text{O}_7)$$














$$\Rightarrow m = 448 \cdot \frac{0,1}{3 \cdot 6 - 2 \cdot 7} = 11,2\text{gam} \Rightarrow \text{Đáp án A}$$

**Chú ý:** Vẫn có thể quy hỗn hợp X về hai chất (FeO và Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>) hoặc (Fe và FeO) hoặc (Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> và Fe) nhưng việc tính toán sẽ trở nên phức tạp hơn.

## BÀI TẬP LUYỆN TẬP

**Câu 1.** Cân bằng các phương trình phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron.

Với mỗi phản ứng cho biết chất oxi hoá, chất khử, sự oxi hoá và sự khử?



- p)  $\text{Cu}_2\text{S} + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{NO} \uparrow + \text{H}_2\text{O}$
- x)  $\text{As}_2\text{S}_3 + \text{KClO}_3 \rightarrow \text{H}_3\text{AsO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{KCl}$
- s)  $\text{H}_2\text{S} + \text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{S} \downarrow + \text{MnSO}_4 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$

**Câu 2.** Hoàn thành và cân bằng các phản ứng sau bằng phương pháp ion – electron:

- a)  $\text{KMnO}_4 + \text{NaNO}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$
- b)  $\text{Cr}_2\text{O}_3 + \text{O}_2 + \text{NaOH} \rightarrow$
- c)  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$
- d)  $\text{NaCrO}_2 + \text{O}_2 + \text{NaOH} \rightarrow$
- e)  $\text{Cr}(\text{OH})_3 + \text{Br}_2 + \text{NaOH} \rightarrow$
- f)  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + 6\text{KI} + 7\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$
- g)  $\text{CuS} + \text{HNO}_3 \text{ đặc} \rightarrow$
- i)  $\text{FeS}_2 + \text{HNO}_3 \text{ loãng} \rightarrow$
- k)  $\text{KMnO}_4 + \text{FeSO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$

**Câu 3.** Hoàn thành và cân bằng các phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron:

- a)  $\text{Al} + \text{HNO}_3 \rightarrow$
- b)  $\text{H}_2\text{S} + \text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$
- c)  $\text{Fe} + \text{HNO}_3 \rightarrow$
- d)  $\text{FeSO}_4 + \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$

**Câu 4.** Để m gam bột Fe trong không khí sau một thời gian thu được chất rắn A nặng 12 gam gồm Fe, FeO, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>. Hoà tan hoàn toàn A bằng dung dịch HNO<sub>3</sub> loãng dư thấy có 2,479 lít khí NO duy nhất sinh ra (đkc) và thu được dung dịch chỉ chứa muối Fe duy nhất.

- a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra
- b) Tính m
- c) Hỗn hợp X gồm Fe và Cu có khối lượng 6 gam. Tỉ lệ khối lượng giữa Fe và Cu là 7: 8. Cho X vào 1 lượng dung dịch HNO<sub>3</sub> khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thì được một phần chất rắn Y nặng 4,32 gam, dung dịch muối iron và khí NO. Tính lượng muối iron tạo thành trong dung dịch.

**Câu 5.** Hỗn hợp X gồm FeS<sub>2</sub> và MS có Số mol như nhau, M là kim loại có hoá trị II không đổi. Cho 5,208 gam X tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch HNO<sub>3</sub> đun nóng, thu được dung dịch A<sub>1</sub> và 11,700 lít hỗn hợp khí A<sub>2</sub> (đkc) có khối lượng 21,072 gam gồm NO<sub>2</sub> và NO. Thêm một lượng dư dung dịch BaCl<sub>2</sub> loãng vào A thấy tạo thành m gam chất kết tủa trong dung dịch dư acid trên.

- a) Cho biết tên kim loại M
- b) Tính giá trị của m<sub>1</sub>

**Câu 6.** Để xác định hàm lượng oxygen tan trong nước người ta lấy 100,00 ml nước rồi cho ngay MnSO<sub>4</sub> (dư) và NaOH vào nước. Sau khi lắc kĩ (không cho tiếp xúc với không khí) Mn(OH)<sub>2</sub> bị oxygen oxi hoá thành MnO(OH)<sub>2</sub>. Thêm acid (dư), khi ấy MnO(OH)<sub>2</sub> bị Mn<sup>3+</sup> khử thành Mn. Cho KI (dư) vào hỗn hợp,

Mn<sup>3+</sup> oxi hoá I<sup>-</sup> thành I<sub>3</sub><sup>-</sup>. Chuẩn độ I<sub>3</sub><sup>-</sup> hết 10,50 ml Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 9,800.10<sup>-3</sup> M.

- a) Viết các phương trình ion của các phản ứng đã xảy ra trong thí nghiệm.
- b) Tính hàm lượng (mg/l) của oxygen tan trong nước.

**Câu 7.** Nhúng hai tấm zinc, mỗi tấm có khối lượng 10 gam vào hai dung dịch muối kim loại hoá trị II. Sau một thời gian xác định, lấy hai tấm zinc ra khỏi dung dịch, rửa sạch, làm khô rồi cân lại. Kết quả cho thấy một tấm có khối lượng 9,55 gam, tấm kia có khối lượng 17,1 gam. Cho biết: Một trong hai dung dịch muối kim loại hoá trị II là muối iron (II); lượng zinc tham gia phản ứng ở hai dung dịch là như nhau. a) Giải thích hiện tượng xảy ra ở mỗi dung dịch.

b) Cho biết kim loại nào tham gia vào thành phần dung dịch muối thứ hai.

(Đề thi HSGQG năm 2005 - 2006)

**Câu 8.** Hoà tan 7,20 gam **iron** cục chứa  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  vào một lượng rất dư dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  loãng rồi thêm nước cất đến thể tích đúng 500 ml. Lấy 25 ml dung dịch đó rồi thêm dần 12,50 ml dung dịch  $\text{KMnO}_4$  0,096 M thì xuất hiện màu hồng tím trong dung dịch.

a) Xác định hàm lượng (phần trăm về khối lượng) của Fe tinh khiết trong **iron** cục.

b) Nếu lấy cùng một khối lượng **iron** cục có cùng hàm lượng của Fe tinh khiết nhưng chứa tạp chất FeO và làm lại thí nghiệm giống như trên thì lượng dung dịch  $\text{KMnO}_4$  0,096 M cần dùng là bao nhiêu?

**Câu 9.** Hỗn hợp bột A gồm 3 kim loại Mg, Zn, Al. Khi hoà tan hết 7,5 gam A vào 1 lít dung dịch  $\text{HNO}_3$  thu được 1 lít dung dịch B và hỗn hợp khí D gồm NO và  $\text{N}_2\text{O}$ . Thu khí D vào bình dung tích 3,2 lít có chứa sẵn  $\text{N}_2$  ở  $0^\circ\text{C}$  và 0,23 atm thì nhiệt độ trong bình tăng lên đến  $27,3^\circ\text{C}$ , áp suất tăng lên đến 1,10 atm, khối lượng bình tăng thêm 3,72 gam. Nếu cho 7,5 gam A vào dung dịch KOH dư thì sau khi kết thúc phản ứng khối lượng dung dịch tăng thêm 5,82 gam. Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong A..

**Câu 10.** Hỗn hợp X gồm 2 kim loại Al và Cu. Cho 18,2 gam X vào 100 ml dung dịch Y chứa  $\text{H}_2\text{SO}_4$  12M và  $\text{HNO}_3$  2M, đun nóng tạo ra dung dịch Z và 9,916 lít (đkc) hỗn hợp T gồm NO và khí D không màu. Hỗn hợp Y có tỉ khối so với **hydrogen** là 23,5. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu và tổng khối lượng muối trong dung dịch Z.

**Câu 11.** Hòa tan a gam hỗn hợp Cu và Fe (trong đó Fe chiếm 30% về khối lượng) bằng 50 mL dung dịch  $\text{HNO}_3$  63% ( $d = 1,38 \text{ g/mL}$ ), khuấy đều cho tới phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn A cân nặng 0,75a gam, dung dịch B và 6,7553 lít hỗn hợp khí NO và  $\text{NO}_2$  (đkc). Hỏi cô cạn dung dịch B thu được bao nhiêu gam muối khan?

**Câu 12.** X, Y là kim loại đơn hóa trị II và III. Hòa tan hết 14,0 gam hỗn hợp X,Y bằng acid  $\text{HNO}_3$  thoát ra 14,784 lít ( $27,3^\circ\text{C}$  và 1,1atm) hỗn hợp 2 khí oxide có màu nâu và có tỉ khối so với He = 9,56, dung dịch nhận được chỉ chứa **nitrate** kim loại. Cùng lượng hỗn hợp 2 kim loại trên cho tác dụng với acid HCl dư thì cũng thoát ra 14,784 lít khí ( $27,3^\circ\text{C}$  và 1atm) và còn lại 3,2 gam chất rắn không tan.

Xác định X, Y và tính % lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

**Câu 13.** Cho 21,52 gam hỗn hợp A gồm kim loại X đơn hóa trị II và muối **nitrate** của nó vào bình kín dung tích không đổi 3 lít (không chứa không khí) rồi nung bình đến nhiệt độ cao để phản ứng xảy ra hoàn toàn, sản phẩm thu được là oxide kim loại. Sau phản ứng đưa bình về  $54,6^\circ\text{C}$  thì áp suất trong bình là P. Chia đôi chất rắn trong bình sau phản ứng: phần 1 phản ứng vừa đủ với 667 ml dung dịch  $\text{HNO}_3$  nồng độ 0,38M thoát ra khí NO duy nhất và dung dịch chỉ chứa **nitrate** kim loại. Phần 2 phản ứng vừa hết với 300 ml dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  loãng 0,2M thu được dung dịch B.

a) Xác định kim loại X và tính % lượng mỗi chất trong A.

b) Tính P.

**Câu 14.** Hòa tan hoàn toàn 2,52 gam hỗn hợp Mg và Al bằng dung dịch HCl thu được 2,9748 lít **hydrogen** (đkc). Cũng lượng hỗn hợp này nếu hòa tan hoàn toàn bằng  $\text{H}_2\text{SO}_4$  đặc nóng thì thu được 0,03 mol một sản phẩm duy nhất hình thành do sự khử  $\text{S}^{+6}$ .

a) Xác định sản phẩm duy nhất nói trên.

b) Nếu hòa tan hoàn toàn cũng lượng hỗn hợp trên bằng dung dịch  $\text{HNO}_3$  10,5% ( $d = 1,2 \text{ g/ml}$ ) thì thu được 0,03 mol một sản phẩm duy nhất hình thành do sự khử  $\text{N}^0$ . Tính thể tích tối thiểu dung dịch  $\text{HNO}_3$  đã dùng.

**Câu 15.** Một miếng Mg bị oxi hóa một phần được chia làm 2 phần bằng nhau:

- Phần 1 cho hòa tan hết trong dung dịch HCl thì thoát ra 3,136 lít khí. Cô cạn dung dịch thu được 14,25 gam chất rắn A.

- Phần 2 cho hòa tan hết trong dung dịch  $\text{HNO}_3$  thì thoát ra 0,448 lít khí X nguyên chất. Cô cạn dung dịch thu được 23 gam chất rắn B.

a) Tính % số mol Mg đã bị oxi hóa.(các thể tích khí đều đo ở đkc)

b) Xác định khí X.

**Câu 16.** Cho 23,52 gam hỗn hợp 3 kim loại Mg, Fe, Cu vào 200 ml dung dịch  $\text{HNO}_3$  3,4M khuấy đều thấy thoát ra một khí duy nhất hơi nặng hơn không khí, trong dung dịch còn dư một kim loại chưa tan hết, đổ tiếp từ từ dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  5M vào, chất khí trên lại thoát ra cho đến khi kim loại vừa tan hết thì mất đúng 44 ml, thu được dung dịch A. Lấy 1/2 dung dịch A, cho dung dịch NaOH cho đến dư vào, lọc kết tủa, rửa rồi nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn B nặng 15,6 gam. Tính % số mol mỗi kim loại trong hỗn hợp.

**Câu 17.** Cho từ từ khí CO qua ống chứa 6,4 gam CuO đun nóng. Khí ra khỏi ống được hấp thụ hoàn toàn bằng 150 ml nước vôi trong nồng độ 0,1M thấy tách ra 1,0 gam kết tủa trắng, đun sôi phần nước lọc lại thấy có vẩn đục. Chất rắn còn lại trong ống được cho vào 500 ml dung dịch  $\text{HNO}_3$  0,32M thoát ra  $V_1$  lít khí NO. Nếu thêm 760 ml dung dịch HCl 1,333M vào dung dịch sau phản ứng thì lại thoát ra thêm  $V_2$  lít khí NO nữa. Nếu tiếp tục thêm 24 gam Mg thì thấy thoát ra  $V_3$  lít khí hỗn hợp khí  $\text{N}_2$  và  $\text{H}_2$ , lọc dung dịch cuối cùng thu được chất rắn X.

a) Tính  $V_1, V_2, V_3$  (đkc).





b) Tính thành phần X (giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn).

**Câu 18.** Hòa tan 17,4 gam hỗn hợp 3 kim loại Al, Cu, Fe trong dung dịch HCl dư thấy thoát ra 9,916 lít khí (đkc). Nếu cho 34,8 gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch  $\text{CuSO}_4$  dư rồi lọc chất rắn tạo ra hòa tan bằng  $\text{HNO}_3$  thì thoát ra 29,748 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với oxygen bằng 1,271. Viết các phương trình phản ứng và tính khối lượng mỗi kim loại trong 17,4 gam hỗn hợp ban đầu.



**Câu 19.** Trộn CuO với một oxit kim loại đơn hóa trị II theo tỉ lệ mol 1:2 được hỗn hợp A. Dẫn một luồng khí  $\text{H}_2$  dư đi qua 3,6 gam A nung nóng thu được hỗn hợp B. Để hòa tan hết B cần 60 ml dung dịch  $\text{HNO}_3$  nồng độ 2,5M và thu được V lít khí NO duy nhất (đkc) và dung dịch chỉ chứa nitrate kim loại. Xác định kim loại hóa trị II nói trên và tính V.

### HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN

a)
























(khử)      (oxi hoá)









(oxi hoá)      (khử)












(khử) (oxi hoá)




(khử) (oxi hoá) .






(khử) (oxi hoá)












(oxi hoá) (khử)






(khử) (oxi hoá)





(khử) (oxi hoá)





(khử) (oxi hoá)






(khử) (oxi hoá)






2.





⇒ Phương trình phân tử:







⇒ Phương trình phân tử:





⇒ Phương trình phân tử:






⇒ Phương trình phân tử:








⇒ Phương trình phân tử:










⇒ Phương trình phân tử:







⇒ Phương trình phân tử:




Nếu acid dư thì có thể có phương trình phân tử: đặc







⇒ Phương trình phân tử:







⇒ Phương trình phân tử:




3. a)




b)



c)










d)




4.

a) Các phương trình phản ứng

• A + HNO<sub>3</sub> :

$$b) \quad m_{\text{O}_2} = 12 - m \Rightarrow n_{\text{O}_2} = \frac{12 - m}{32}; n_{\text{NO}} = \frac{2,479}{24,79} = 0,1 \text{ mol}$$




$$\Rightarrow \frac{3m}{56} = \frac{12-m}{8} + 3.0,1 \Rightarrow m = 10,08 \text{ gam}$$

$$c) \quad m_{\text{Fe}} = \frac{7,6}{15} = 2,8 \text{ gam}; m_{\text{Cu}} = 6 - 2,8 = 3,2 \text{ gam} < m_Y = 4,32 \text{ gam}$$

$\Rightarrow$  Y gồm Cu (chưa phản ứng) và Fe còn và dung dịch muối iron là  $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$

$$\Rightarrow m_{\text{Fe phản ứng}} = 2,8 - (4,32 - 3,2) = 1,68 \text{ gam}$$

$$\Rightarrow n_{\text{Fe phản ứng}} = \frac{1,68}{56} = 0,03 \text{ mol}$$




$$0,03 \longrightarrow 0,03$$

$$\Rightarrow m_{\text{muối}} = 0,03.180 = 5,4 \text{ gam}$$


5.

a) Đặt  $n_{\text{NO}} = x \text{ mol}$ ;  $n_{\text{NO}_2} = y \text{ mol}$


Ta có hệ: 
$$\begin{cases} x + y = 0,472 \\ 46x + 30y = 21,072 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,432 \text{ mol} \\ y = 0,04 \text{ mol} \end{cases}$$



b)  $n_{\text{SO}_4^{2-}} = 3\text{a} = 0,072 \text{ mol}$



6. a) Các phương trình phản ứng:



b)

$(1)(2)(3)(4) \Rightarrow n_{\text{O}_2} = \frac{1}{2}n_{\text{MnO}(\text{OH})_2} = \frac{1}{2}n_{\text{Mn}^{3+}} = \frac{1}{4}n_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}}$   
 $= \frac{10,50.9,800.10^{-3}}{4} = 0,0257 \text{ mmol}$


$\frac{0,0257.32}{0,1} = 8,232 \text{ mg/l}$

Hàm lượng (mg/l) của oxygen tan trong nước:

7. a) Khi nhúng tấm Zinc vào dung dịch muối Fe (II):



Vì  $M_{\text{Fe}} = 56 \text{ gam/mol} < M_{\text{Zn}} = 65 \text{ gam/mol}$  nên khối lượng tấm kẽm giảm đi. Khi nhúng tấm zinc vào dung dịch muối thứ hai  $\text{X}^{2+}$



Vì:  $M_{\text{Zn}} < M_{\text{X}}$  nên khối lượng tấm zinc tăng lên.

b) Gọi x là số mol Zn đã phản ứng, theo (1) ta có:

$(10 - 65x) + 56x = 9,55 \Rightarrow x = 0,05 \text{ mol}$


Vì lượng Zn tham gia phản ứng ở 2 trường hợp là như nhau, theo (2) ta có:





$(10 - 65.0,05) + M_{\text{X}}.0,05 = 17,1 \Rightarrow M_{\text{X}} = 207.$

Vậy  $\text{X}^{2+}$  là  $\text{Pb}^{2+}$ , X là Pb

8.


a) Gọi x là số mol  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  và y là số mol Fe có trong 7,180 g iron cục.





Số mol  $\text{FeSO}_4$  có trong 25 ml dung dịch thu được là

$$\frac{25(2x+y)}{500} = \frac{2x+y}{20} \text{ mol}$$



$$\frac{2x+y}{20} \rightarrow \frac{2x+y}{100}$$

$$\Rightarrow n_{\text{KMnO}_4} = \frac{2x+y}{100} = \frac{12,5,0,096}{1000} \Rightarrow 2x+y = 0,12 \quad (1)$$

$$\text{Mặt khác: } 160x + 56y = 7,2 \quad (2)$$

Giải hệ (1)(2) ta được:


$$\begin{cases} x = 0,01 \text{ mol} \\ y = 0,10 \text{ mol} \end{cases}$$

Hàm lượng iron tinh khiết là


$$\frac{56,0,1.100\%}{7,20} = 77,77\%$$

b) Nếu tạp chất là  $\text{FeO}$  thì

$$n_{\text{FeO}} = \frac{7,2 - 5,6}{72} = \frac{1}{45} \text{ mol}$$



$$\frac{1}{45} \rightarrow \frac{1}{45}$$




$$0,1 \rightarrow 0,1$$

$$\Rightarrow \Sigma n_{\text{FeSO}_4} = 0,1 + \frac{1}{45} = \frac{5,5}{45} \text{ mol}$$

Số mol  $\text{FeSO}_4$  có trong 25 ml dung dịch thu được là

$$\frac{25,5,5}{500,45} = \frac{0,275}{45} \text{ mol}$$





$$\frac{0,275}{45} \rightarrow \frac{0,55}{450}$$

$$\Rightarrow V_{\text{dung dịch KMnO}_4} = \frac{0,55}{450,0,096} = \frac{11}{864} \text{ lit}$$

9. Gọi x, y, z lần lượt là số mol Mg, Zn và Al có trong 7,5 gam hỗn hợp A. Ta có:

$$24x + 65y + 27z = 7,5 \quad (1)$$

- Phương trình hoà tan:



Với Mg: n = 2, Zn: n = 2, Al: n = 3 (có thể viết từng phản ứng riêng biệt)

- Tính tổng số mol hỗn hợp khí D:

Nếu đưa toàn bộ bình khí (chứa hỗn hợp NO và N<sub>2</sub>O) về 0°C thì ở V = const, ta có:






$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \Rightarrow P_1 = \frac{P_2 \cdot T_1}{T_2} = \frac{1,1(273+0)}{(273+27,3)} = 1 \text{ atm}$$

$$\Rightarrow P_D = P_1 - P_{N_2} = 1 - 0,23 = 0,77 \text{ atm}$$


$$\Rightarrow n_D = \frac{P_D V}{RT_1} = \frac{0,77 \cdot 3,2}{0,082 \cdot 273} = 0,11 \text{ mol}$$

Gọi a, b lần lượt là số mol NO và N<sub>2</sub>O. Ta có hệ:

$$\begin{cases} a + b = 0,11 \\ 30a + 44b = 3,72 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0,08 \text{ mol} \\ b = 0,03 \text{ mol} \end{cases}$$



$$0,24 \leftarrow 0,08$$




$$0,24 \leftarrow 0,06$$

$$\Rightarrow 2x + 2y + 3z = 0,48$$

(4)


- Khi cho 7,5 gam A vào dung dịch KOH dư thì Mg không phản ứng.



y

→

y



z

→

1,5z

⇒ Độ giảm khối lượng dung dịch:

$$(65 - 2)y + (27 - 1,5)z = 5,82 \quad (5)$$

$$\begin{cases} x = 0,06 \text{ mol} \\ y = 0,06 \text{ mol} \\ z = 0,08 \text{ mol} \end{cases}$$

Giải hệ (1)(4)(5) ta được:

Thành phần khối lượng của mỗi kim loại trong A:

$$\% \text{Mg} = \frac{24 \cdot 0,06}{7,5} \cdot 100\% = 19,2\%$$






$$\% \text{Zn} = \frac{65 \cdot 0,06}{7,5} \cdot 100\% = 52,0\%$$

$$\Rightarrow \% \text{Al} = 100\% - (19,2 + 52)\% = 28,8\%$$


10.  $M = 23,5 \cdot 2 = 47 \text{ gam/mol} = M_{\text{NO}} = 30 \text{ gam/mol} < 47 < M_D$

⇒ D là SO<sub>2</sub> (M = 64)

$$\text{Vì } \frac{64 + 30}{2} = 47 \text{ nên } n_{\text{NO}} = n_{\text{SO}_2} = 0,2 \text{ mol}$$



$$0,2 \leftarrow 0,6 \leftarrow 0,2$$



$$0,4 \leftarrow 0,4 \leftarrow 0,2$$

Ta có hệ: 
$$\begin{cases} 3x + 2y = 1 \\ 27x + 64y = 18,2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,2 \text{ mol} \\ y = 0,2 \text{ mol} \end{cases}$$

Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là



$$m_{Al} = 27 \cdot 0,2 = 5,4 \text{ gam}$$

$$m_{Cu} = 64 \cdot 0,2 = 12,8 \text{ gam}$$


Vì  $n_{NO_3^-}$  phản ứng =  $n_{NO} = 0,2 \text{ mol} = n_{NO_3^-}$  ban đầu nên muối tạo thành chỉ là muối **sulfate**..

$$m_{\text{muối}} = m_{Al_2(SO_4)_3} + m_{CuSO_4} = 342 \cdot 0,1 + 160 \cdot 0,2 = 66,2 \text{ gam}$$

11. Phần hỗn hợp tan = 0,25a gam < 0,3a gam nên Fe còn dư và Cu chưa phản ứng



Do Fe dư nên còn các phản ứng:



Tức là trong dung dịch B chỉ có  $Fe(NO_3)_2$

Và lượng muối = lượng Fe + lượng  $NO_3^-$

Mà số mol  $NO_3^-$  còn lại trong B = tổng số mol  $NO_3^-$  - số mol khí

$$= 0,69 - 0,2725 = 0,4175 \text{ mol}$$

$$= \frac{0,4175}{2} \cdot 180 = 37,575 \text{ gam}$$

Vậy lượng muối khan

• 14,0 gam +  $HNO_3$ : Khí màu nâu là  $NO_2$  ( $M = 46$ ).

$$\overline{M}_{\text{khí}} = 4,9,56 = 38,24 \text{ gam/mol} < 46 \Rightarrow \text{Khí còn lại phải là } NO \text{ (} M = 30 \text{)}$$

Gọi a, b lần lượt là số mol NO và  $NO_2$ . Ta có hệ:

$$\begin{cases} 30a + 46b = 0,66 \cdot 38,24 \\ a + b = \frac{PV}{RT} = \frac{14,784 \cdot 1,1}{0,082(273 + 27,3)} = 0,66 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0,32 \text{ mol} \\ b = 0,34 \text{ mol} \end{cases}$$

Gọi x, y lần lượt là số mol của X, Y có trong 14 gam hỗn hợp. Ta có:

$$xM_X + yM_Y = 14 \quad (1)$$





$$x \rightarrow 2x \quad \left| \quad 0,34 \leftarrow 0,34$$



$$\Rightarrow 2x + 3y = 0,34 + 0,96 = 1,3 \quad (2)$$

• 14,0 gam + HCl dư:



*Biện luận:*

\* Nếu kim loại Y không tan trong acid HCl

$$(3) \Rightarrow x = n_{H_2} = 0,6 \text{ mol}; m_X = 14 - 3,2 = 10,8 \text{ gam}$$

$$\Rightarrow M_X = \frac{10,8}{0,6} = 18 \text{ gam/mol} \quad (\text{loại !})$$

\* Vậy kim loại X không tan trong acid HCl

$$(4) \Rightarrow y = \frac{2}{3} n_{H_2} = 0,4 \text{ mol}; m_Y = 14 - 3,2 = 10,8 \text{ gam}$$

$$\Rightarrow M_Y = \frac{10,8}{0,4} = 27 \text{ gam/mol} \Rightarrow Y \text{ là Al}$$

$$(2) \Rightarrow x = 0,05 \text{ mol} \Rightarrow M_X = \frac{3,2}{0,05} = 64 \text{ gam/mol} \Rightarrow X \text{ là Cu}$$



Phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là

$$\%Al = \frac{27 \cdot 0,4 \cdot 100\%}{14} = 77,14\%$$

$$\%Cu = 100\% - 77,14\% = 22,86\%$$

$$13. a) n_{HNO_3} = 0,38 \cdot 0,667 = 0,25346 \text{ mol}; n_{H_2SO_4} = 0,3 \cdot 0,2 = 0,06 \text{ mol}$$



Đặt số mol  $X(NO_3)_2$  và  $X$  ban đầu là  $a$  và  $b$ .



(do phản ứng với  $HNO_3$  có khí  $NO$  nên  $X$  còn dư  $= (b - a) \text{ mol}$ )

Sản phẩm thu được chứa  $2a \text{ mol XO}$  và  $X (b - a) \text{ mol}$



• Phần 1 +  $HNO_3$ :



$$0,5(b - a) \rightarrow \frac{4}{3}(b - a)$$

$$\Rightarrow n_{HNO_3} = 2a + \frac{4}{3}(b - a) = 0,25346 \Rightarrow a + 2b = 0,38 \quad (1)$$

• Phần 2 +  $H_2SO_4$  loãng:



*Biện luận:*

\* Nếu  $X$  đứng trước **hydrogen** trong dãy điện hóa thì

$$(2)(3) \Rightarrow a + 0,5(b - a) = 0,06 \text{ hay } a + b = 0,12 \quad (4).$$

Giải hệ (1)(4)  $\Rightarrow a = -0,14 \text{ mol} < 0$  (loại)

\* Vậy  $X$  đứng sau **hydrogen** trong dãy điện hóa và không tác dụng với  $H_2SO_4$  loãng.

$$(2) \Rightarrow n_{H_2SO_4} = a = 0,06 \text{ mol. Kết hợp (1)} \Rightarrow b = 0,16 \text{ mol}$$

$$\Rightarrow 0,06(M + 124) + 0,16M = 21,52 \Rightarrow M = 64 (\text{Cu})$$

Phần trăm khối lượng mỗi chất trong A là


$$\%Cu = \frac{0,16 \cdot 64 \cdot 100\%}{21,52} = 47,58\%$$

$$\%Cu(NO_3)_2 = 100\% - 47,58\% = 52,42\%$$

$$b) n_{NO_2} = 2a = 0,12 \text{ mol}$$


$$\Rightarrow P = \frac{nRT}{V} = \frac{0,12 \cdot 0,082 \cdot (273 + 54,6)}{3} = 1,074 \text{ atm}$$

14.





Ta có hệ:




Đặt số oxi hóa của sulfur trong sản phẩm là x ta có:



$$\Rightarrow 0,12 + 0,12 = 0,03(6-x) \Rightarrow x = -2 (\text{H}_2\text{S})$$




$$\text{Tương tự: } (5-y) \cdot 0,03 = 0,24 = x = -3 (\text{NH}_3)$$

 $\Rightarrow$  Sản phẩm là  $\text{NH}_4\text{NO}_3$ 

$$\Rightarrow \Sigma n_{\text{HNO}_3} = 0,15 + 0,15 = 0,3 \text{ mol}$$

$$\Rightarrow V_{\text{dung dịch HNO}_3} = \frac{0,3 \cdot 63 \cdot 100}{10,5 \cdot 1,2} = 150 \text{ ml}$$


15. a)



Chất rắn thu được gồm: Mg và MgO

$$n_{\text{H}_2} = \frac{3,136}{22,4} = 0,14 \text{ mol}$$

• Phần 1 + HCl:





$$\Rightarrow m_{\text{chất rắn A}} = 95(0,14 + x) = 14,25 \Rightarrow x = 0,01 \text{ mol}$$

$$\% \text{ Mg bị oxi hóa} = \frac{0,01}{0,15} \cdot 100\% = 6,67\%$$

$$n_x = \frac{0,448}{22,4} = 0,02 \text{ mol}$$

b) • Phần 2 +  $\text{HNO}_3$ :




Theo định luật bảo toàn nguyên tố:

$$n_{\text{Mg}(\text{NO}_3)_2} = n_{\text{Mg}} = 0,15 \text{ mol} \Rightarrow m_{\text{Mg}(\text{NO}_3)_2} = 148.0,15 = 22,2 \text{ gam} < 23 \text{ gam}$$


$\Rightarrow$  Có muối  $\text{NH}_4\text{NO}_3$ , tạo thành

$\Rightarrow$  Chất rắn B là  $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$  và  $\text{NH}_4\text{NO}_3$


$$\Rightarrow n_{\text{NH}_4\text{NO}_3} = \frac{23 - 22,2}{80} = 0,01 \text{ mol}$$



$$0,14 \rightarrow 0,28$$



$$(5x - 2y)0,02 \leftarrow 0,02$$



$$0,08 \leftarrow 0,01$$

$$\Rightarrow 0,28 = (5x - 2y)0,02 + 0,08 \Rightarrow 5x - 2y = 10 \Rightarrow x = 2 \text{ và } y = 0$$


$\Rightarrow$  X là  $\text{N}_2$

16.


Gọi x, y, z là số mol Mg, Fe, Cu trong hỗn hợp, ta có :

$$24x + 56y + 64z = 23,52 \Rightarrow 3x + 7y + 8z = 2,94 \quad (1)$$


Khí duy nhất hơi nặng hơn không khí là NO




$$x \rightarrow x \rightarrow 2x$$



$$y \rightarrow y \rightarrow 2y$$



$$z \rightarrow z \rightarrow 2z$$




$$(0,68 + 0,44) \rightarrow 0,84$$


$$\Rightarrow 2(x + y + z) = 0,84 \Rightarrow x + y + z = 0,42 \quad (2)$$

Dung dịch A chứa:  $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ ,  $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$  và  $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$


•  $\frac{1}{2}\text{A}$  + dung dịch NaOH dư:



$$0,5x \rightarrow 0,5x$$




$$0,5y \rightarrow 0,5y$$




$$0,52z \rightarrow 0,52z$$


Nung kết tủa:



$$0,5x \rightarrow 0,5x$$



$$0,5y \rightarrow 0,25y$$



$$0,5z \rightarrow 0,5z$$

$$\Rightarrow m_B = 40.0,5x + 160.0,25y + 80.0,5z = 15,6$$

$$\Rightarrow x + 2y + 2z = 0,78 \quad (3)$$

$$\begin{cases} x = 0,06 \text{ mol} \\ y = 0,12 \text{ mol} \\ z = 0,24 \text{ mol} \end{cases}$$

Giải hệ (1) (2) và (3) ta được:


Phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là

$$\%Mg = \frac{24.0,06.100\%}{23,52} = 6,12\%$$


$$\%Fe = \frac{56.0,12.100\%}{23,52} = 28,57\%$$

$$\%Cu = 100\% - (6,12 + 28,57)\% = 65,31\%$$


$$17. a) \quad n_{Ca(OH)_2} = 0,015 \text{ mol}; n_{CaCO_3} = \frac{1}{100} = 0,01 \text{ mol}$$



$$0,01 \quad \leftarrow \quad 0,01 \quad \leftarrow \quad 0,01$$



$$0,01 \quad \leftarrow \quad 0,005$$



$$0,02 \quad \leftarrow \quad 0,02 \quad \leftarrow \quad 0,02$$


$$\Rightarrow n_{CuO} \text{ còn} = \frac{6,4}{80} - 0,02 = 0,06 \text{ mol}$$

Chất rắn thu được gồm Cu và CuO

$$n_{HNO_3} \text{ ban đầu} = 0,32.0,5 = 0,16 \text{ mol} \Rightarrow n_{H^+} = n_{NO_3^-} = 0,16 \text{ mol}$$




$$0,06 \rightarrow 0,12$$



$$0,015 \leftarrow 0,04 \rightarrow 0,01 \rightarrow 0,015 \rightarrow 0,01$$

$$\Rightarrow V_1 = 0,01.24,79 = 0,2479 \text{ lít}; n_{NO_3^-} \text{ còn} = 0,16 - 0,01 = 0,15 \text{ mol};$$

Khi thêm tiếp  $\frac{3,04}{3}$  mol HCl vào, trong môi trường acid thì  $NO_3^-$ , lại tiếp tục oxi hoá Cu.




$$0,005 \rightarrow \frac{0,04}{3} \rightarrow \frac{0,01}{3} \rightarrow 0,005 \rightarrow \frac{0,01}{3}$$

$$\Rightarrow V_2 = \frac{0,01.24,79}{3} = \frac{0,2479}{3} \text{ lít}; n_{NO_3^-} \text{ còn} = 0,15 - \frac{0,01}{3} = \frac{0,44}{3} \text{ mol};$$

$$n_{H^+} \text{ còn} = \frac{3,04}{3} - \frac{0,04}{3} = 1 \text{ mol}$$


Khi thêm tiếp 1 mol Mg vào thì:



$$\frac{1,1}{3} \leftarrow 0,88 \leftarrow \frac{0,44}{3} \rightarrow \frac{0,22}{3}$$


$$\Rightarrow n_{\text{Mg}} \text{ còn} = 1 - \frac{1,1}{3} = \frac{1,9}{3} \text{ mol}; n_{\text{H}^+} \text{ còn} = 1 - 0,88 = 0,12 \text{ mol}$$

Do  $\text{Cu}^{2+}$  có tính oxi hoá mạnh hơn  $\text{H}^+$  nên  $\text{Cu}^+$  bị khử trước



$$0,08 \leftarrow 0,08 \rightarrow 0,08$$

$$\Rightarrow n_{\text{Mg}} \text{ còn} = \frac{1,9}{3} - 0,08 = \frac{1,66}{3} \text{ mol}$$



$$0,06 \leftarrow 0,12 \rightarrow 0,06$$

$$\Rightarrow V_3 = \left( \frac{0,22}{3} + 0,06 \right) \cdot 24,79 = \frac{9,916}{3} \text{ lít}$$

$$\text{b) Chất rắn X chứa: } 0,08 \text{ mol Cu (ứng với } 5,12 \text{ gam)} \quad \frac{1,66}{3} - 0,06 = \frac{1,48}{3} \text{ mol}$$

Mg (ứng với 11,84 gam)




$$\Rightarrow m_X = 5,12 + 11,84 = 16,96 \text{ gam}$$

Phần trăm khối lượng của các chất trong X:

$$\% \text{Cu} = \frac{5,12 \cdot 100\%}{16,96} = 30,18\%$$



$$\% \text{Mg} = 100\% - 30,18\% = 69,82\%$$

**18. Phương trình hoá học của các phản ứng đã xảy ra:**



Chất rắn thu được là Cu

$\overline{M}_{\text{khí}} = 32,1,271 = 40,672 \text{ gam/mol} \Rightarrow$  Hỗn hợp khí là NO và  $\text{NO}_2$  (chú ý là trong các sản phẩm chứa N tạo ra khi tác dụng với  $\text{HNO}_3$  ngoài muối, Cu chỉ tạo NO và  $\text{NO}_2$ )



Gọi a, b lần lượt là số mol NO và  $\text{NO}_2$ . Ta có hệ:

$$\begin{cases} a + b = 1,2 \\ 30a + 46b = 40,672 \cdot 1,2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0,4 \text{ mol} \\ b = 0,8 \text{ mol} \end{cases}$$

$$(5)(6) \Rightarrow n_{\text{Cu}} = \frac{1}{2} n_{\text{NO}_2} + \frac{3}{2} n_{\text{NO}} = 1 \text{ mol}$$

Gọi x, y, z lần lượt là số mol Al, Fe và Cu có trong 17,4 gam hỗn hợp. Ta có:

$$27x + 56y + 64z = 17,4 \quad (7)$$

$$(1)(2) \Rightarrow n_{\text{H}_2} = 1,5x + y = 0,4 \quad (8)$$

$$(3)(4) \Rightarrow n_{\text{Cu}} \text{ sinh ra} = 1,5n_{\text{Al}} + n_{\text{Fe}} = 2(1,5x + y) \text{ mol}$$

$$\Rightarrow \Sigma n_{\text{Cu}} = 2(1,5x + y) + 2z = 1 \quad (9)$$

$$\begin{cases} x = 0,2 \text{ mol} \\ y = 0,1 \text{ mol} \\ z = 0,1 \text{ mol} \end{cases}$$






Giải hệ (7)(8)(9) ta được:

Khối lượng của mỗi kim loại trong 17,4 gam hỗn hợp ban đầu là

$$m_{\text{Al}} = 5,4 \text{ gam}; m_{\text{Fe}} = 5,6 \text{ gam và } m_{\text{Cu}} = 6,4 \text{ gam}$$

19. Gọi oxide kim loại phải tìm là MO và a là số mol  $\text{CuO} = n_{\text{MO}} = 2a \text{ mol}$ . Vì hydrogen chỉ khử được những oxide kim loại đứng sau nhôm trong dãy điện hóa nên có 2 khả năng xảy ra:

• Trường hợp 1: M đứng sau aluminium trong dãy điện hóa






$$\Rightarrow n_{\text{HNO}_3} = \frac{8a}{3} + \frac{16a}{3} = 0,06.2,5 \Rightarrow a = 0,01875 \text{ mol}$$

$$\Rightarrow 80.0,01875 + (M+16).2.0,01875 = 3,6 \Rightarrow M = 40(\text{Ca})$$

Trường hợp này loại vì Ca đứng trước Al trong dãy thể hiện hóa.

• Trường hợp 2: M đứng trước aluminium trong dãy điện hóa



$$\Rightarrow n_{\text{HNO}_3} = \frac{8a}{3} + 4a = 0,06.2,5 \Rightarrow a = 0,0225 \text{ mol}$$

$$\Rightarrow 80.0,0225 + (M+16).2.0,0225 = 3,6 \Rightarrow M = 24(\text{Mg})$$




$$\Rightarrow n_{\text{NO}} = \frac{2a}{3} = 0,015 \text{ mol} \Rightarrow V = 0,336 \text{ lít}$$


$$\Rightarrow n_{\text{NO}} = \frac{2a}{3} = 0,015 \text{ mol} \Rightarrow V = 0,336 \text{ lít}$$

### Phần III: HỆ THỐNG BÀI TẬP TỪ CÁC ĐỀ THI HSG CHÍNH THỨC CỦA TỈNH, OLYMPIC,...

#### Dạng 1: Lý thuyết

Câu 1: 1) Cân bằng các phương trình phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron.





2) Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm sau:

a. Sục từ từ khí sulfur dioxide đến dư vào cốc chứa dung dịch  $\text{KMnO}_4$ .

b. Dẫn khí hydrogen sulfide vào dung dịch nước chlorine, sau đó nhỏ vào dung dịch sau phản ứng vài giọt dung dịch muối  $\text{BaCl}_2$ .

c. Dẫn khí ozone vào dung dịch  $\text{KI}$  (có sẵn vài giọt phenolphthalein).

d. Dẫn khí hydrogen sulfide vào dung dịch muối  $\text{CuCl}_2$  (màu xanh).

### Hướng dẫn giải:

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1a  | $1x \quad \text{Mn}^{+4} + 2e \longrightarrow \text{Mn}^{+2}$ $2x \quad 2\text{Cl}^- \longrightarrow \text{Cl}_2 + 2e.$ $\text{MnO}_2 + 4\text{HCl} \longrightarrow \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$                                                                                                                                                                                           |
| 1b  | $3x \quad \text{Fe}^{+2} \longrightarrow \text{Fe}^{+3} + e$ $1x \quad \text{N}^{+5} + 3e \longrightarrow \text{N}^{+2}$ $3\text{FeO} + 10\text{HNO}_3 \longrightarrow \text{NO} + 3\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 + 5\text{H}_2\text{O}$                                                                                                                                                                              |
| 1c  | $1x \quad \text{S}^{+6} + 2e \longrightarrow \text{S}^{+4}$ $1x \quad \text{Cu}^0 \longrightarrow \text{Cu}^{+2} + 2e$ $\text{Cu} + 2\text{H}_2\text{SO}_4(\text{đặc}) \xrightarrow{t^0} \text{CuSO}_4 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$                                                                                                                                                                      |
| 1d  | $\begin{array}{rcl} 2 &   & \text{FeS}_2 \longrightarrow \text{Fe}^{+3} + 2\text{S}^{+4} + 11e \\ 11 &   & \text{S}^{+6} + 2e \longrightarrow \text{S}^{+4} \\ \hline 2\text{FeS}_2 + 11\text{S}^{+6} & \longrightarrow & 2\text{Fe}^{+3} + 15\text{S}^{+4} \end{array}$ $2\text{FeS}_2 + 14\text{H}_2\text{SO}_4(\text{đ}) \xrightarrow{t^0} \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + 15\text{SO}_2 + 14\text{H}_2\text{O}$ |
| 2.a | Phương trình: $5\text{SO}_2 + 2\text{KMnO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + 2\text{MnSO}_4 + 2\text{H}_2\text{SO}_4$<br>- Màu tím của dung dịch nhạt dần, cuối cùng mất màu hoàn toàn.                                                                                                                                                                                                |
| 2.b | $\text{H}_2\text{S} + 4\text{Cl}_2 + 4\text{H}_2\text{O} \rightarrow 8\text{HCl} + \text{H}_2\text{SO}_4$ Phương trình: $\text{BaCl}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{BaSO}_4 \downarrow + 2\text{HCl}$<br>- Nước $\text{Cl}_2$ nhạt màu, có kết tủa trắng xuất hiện.                                                                                                                                 |
| 2.c | Phương trình: $\text{O}_3 + \text{H}_2\text{O} + 2\text{KI} \rightarrow \text{O}_2 + 2\text{KOH} + \text{I}_2$ .<br>- Dung dịch chuyển sang màu hồng.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.d | Phương trình: $\text{H}_2\text{S} + \text{CuCl}_2 \rightarrow 2\text{HCl} + \text{CuS} \downarrow$<br>- Màu xanh của dung dịch nhạt dần và dung dịch có kết tủa màu đen xuất hiện.                                                                                                                                                                                                                               |

**Câu 2:** Hoàn thành và cân bằng các phản ứng hóa học sau theo phương pháp thăng bằng electron:

a.  $\text{Mg} + \text{HNO}_3 \longrightarrow \text{Mg}(\text{NO}_3)_2 + \text{N}_2\text{O} + \text{N}_2 + \text{NH}_4\text{NO}_3 + \text{H}_2\text{O}$  (biết tỉ lệ mol của  $\text{N}_2\text{O} : \text{N}_2 : \text{NH}_4\text{NO}_3$  là 1 : 2 : 1)

b.  $\text{M}_2(\text{CO}_3)_n + \text{HNO}_3(\text{đặc, nóng}) \longrightarrow \text{M}(\text{NO}_3)_m + \text{NO}_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

c.  $\text{CuFeS}_x + \text{O}_2 \longrightarrow \text{Cu}_2\text{O} + \text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{SO}_2 \uparrow$





### Hướng dẫn giải:

a)  $\text{Mg} + \text{HNO}_3 \longrightarrow \text{Mg}(\text{NO}_3)_2 + \text{N}_2\text{O} + \text{N}_2 + \text{NH}_4\text{NO}_3 + \text{H}_2\text{O}$   
 (biết tỉ lệ mol của  $\text{N}_2\text{O} : \text{N}_2 : \text{NH}_4\text{NO}_3$  là 1 : 2 : 1)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $18 \text{ Mg}^0 \longrightarrow \text{Mg}^{2+} + 2e$ $1 \quad 7 \text{ N}^{+5} + 36 e \longrightarrow \text{N}^{+1} + 2\text{N}^0 + \text{N}^{-3}$ $18\text{Mg} + 44\text{HNO}_3 \longrightarrow 18\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 + \text{N}_2\text{O} + 2\text{N}_2 + \text{NH}_4\text{NO}_3 + 20\text{H}_2\text{O}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>b) <math>\text{M}_2(\text{CO}_3)_n + \text{HNO}_3 \text{ đặc, nóng} \longrightarrow \text{M}(\text{NO}_3)_m + \text{NO}_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}</math></p> $\begin{array}{l} 1 \quad 2\text{M}^{+n} \longrightarrow 2\text{M}^{+m} + 2(m-n)e \\ \quad \quad \quad +5 \quad \quad \quad +4 \\ 2(m-n) \quad \text{N} + 1e \longrightarrow \text{N} \end{array}$ $\text{M}_2(\text{CO}_3)_n + (4m-2n)\text{HNO}_3 \text{ đặc, nóng} \longrightarrow 2\text{M}(\text{NO}_3)_m + 2(m-n)\text{NO}_2 + n\text{CO}_2 + (2m-n)\text{H}_2\text{O}$                                                                                                                                 |
| <p>c) <math>\text{CuFeS}_x + \text{O}_2 \longrightarrow \text{Cu}_2\text{O} + \text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{SO}_2 \uparrow</math> <math>3\text{Cu} + 2 + 3e \longrightarrow 3\text{Cu} + 1</math></p> $3x \text{ S} - 4/x \longrightarrow 3x\text{S} + 4 + 12(x+1)e$ $3\text{Fe} + 2 \longrightarrow 3\text{Fe} + 8/3 + 2e$ $\begin{array}{l} 3 \text{ CuFeS}_x \longrightarrow 3\text{Cu}^{+1} + 3\text{Fe}^{+8/3} + 3x\text{S}^{+4} + (12x+11)e \\ \text{O}_2 + 4e \longrightarrow 2\text{O}^{-2} \end{array} \quad \begin{array}{l} 4 \\ (12x+11) \end{array}$ $12 \text{ CuFeS}_x + (11+12x) \text{ O}_2 \rightarrow 6\text{Cu}_2\text{O} + 4\text{Fe}_3\text{O}_4 + 12x\text{SO}_2$ |





### Câu 3:

1. Cân bằng các phản ứng sau bằng phương pháp thăng bằng electron:




### Hướng dẫn giải:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a. <math>\text{Fe}_x\text{O}_y + \text{H}_2\text{SO}_4 \xrightarrow{\text{t}^\circ} \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O}</math></p> $\begin{array}{l} 1x \quad 2x\text{Fe}^{+\frac{2y}{x}} \longrightarrow 2x\text{Fe}^{+3} + (6x - 4y)e \\ (3x - 2y)x \quad \text{S} + 6 + 2e \longrightarrow \text{S} + 4 \end{array}$ $2\text{Fe}_x\text{O}_y + (6x-2y)\text{H}_2\text{SO}_4 \xrightarrow{\text{t}^\circ} x\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + (3x-2y)\text{SO}_2 + (6x-2y)\text{H}_2\text{O}$ |
| <p>b. <math>\text{FeS}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \xrightarrow{\text{t}^\circ} \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O}</math></p> $\begin{array}{l} 1x \quad 2\text{FeS}_2 \rightarrow 2\text{Fe}^{+3} + 4\text{S}^{+4} + 22e \\ 11x \quad \text{S}^{+6} + 2e \rightarrow \text{S}^{+4} \end{array}$ $2\text{FeS}_2 + 14\text{H}_2\text{SO}_4 \xrightarrow{\text{t}^\circ} \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + 15\text{SO}_2 + 14\text{H}_2\text{O}$                                                     |
| <p>c. <math>\text{Al} + \text{HNO}_3 \longrightarrow \text{Al}(\text{NO}_3)_3 + \text{NO} + \text{N}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}</math></p> $17x \quad \text{Al} \longrightarrow \text{Al}^{+3} + 3e$                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |




$$\begin{cases} \xrightarrow{\text{BTNT (Na)}} 10 + a = 2b \\ \xrightarrow{\text{BTNT (S)}} 5 + a = b + 2 + 1 \longrightarrow a = 6; b = 8; c = 3. \\ \xrightarrow{\text{BTNT (H)}} a = 2c \end{cases}$$



#### Câu 4:

1. Điều khẳng định sau đây có đúng không? “ Một chất có tính oxi hóa gặp một chất có tính khử nhất thiết phải xảy ra phản ứng oxi hóa – khử”. Giải thích.


2. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau đây dưới dạng phân tử và dạng ion:



#### Hướng dẫn giải:

1. Điều khẳng định trên không phải lúc nào cũng đúng.


+ Muốn có phản ứng xảy ra giữa 1 chất oxi hóa A và 1 chất khử B thì chất khử tạo thành phải yếu hơn B và chất oxi hóa sinh ra phải yếu hơn A



Trong đó:

- Chất oxi hóa  $\text{Cu}^{2+}$  yếu hơn chất oxi hóa ban đầu là  $\text{Ag}^+$
- Chất khử sinh ra là Ag yếu hơn chất khử ban đầu là Cu





+ Ngược lại, phản ứng không xảy ra khi:





Chất khử yếu      chất oxi hóa yếu      chất khử mạnh      chất oxi hóa mạnh


+ Ngoài ra phản ứng oxi hóa – khử còn phụ thuộc nồng độ, nhiệt độ, chất xúc tác,...

2.



Phương trình dưới dạng phân tử:














$\Rightarrow$  Dạng phân tử:



**Câu 5:** Cân bằng các phản ứng oxi hoá - khử sau theo phương pháp cân bằng ion-electron:




**Hướng dẫn giải:**



**Câu 6:**

a. Cho biết trong môi trường axit  $\text{Mn}^{+4}$  Oxi hóa được  $\text{H}_2\text{O}_2$  ngược lại trong môi trường base  $\text{H}_2\text{O}_2$  lại oxi hoá được  $\text{Mn}^{+2}$  thành  $\text{Mn}^{+4}$ . Hãy viết phương trình phản ứng minh họa.


b) Một trong những phản ứng xảy ra ở vùng mỏ đồng:






Cân bằng theo phương pháp thăng bằng e và nhận xét về các hệ số?

**Hướng dẫn giải:**

a) Trong môi trường acid



+) Trong môi trường base




$$2x + 4y = 16 \Rightarrow x + 2y = 8 \quad (0 < x < 8; 0 < y < 4)$$

TD:  $y = 1; x = 6$





$y = 3; x = 2$





Có Vô số nghiệm, lượng  $\text{H}_2\text{SO}_4$  tỷ lệ với lượng  $\text{H}_2\text{O}$ .

**Câu 7:** Cân bằng các phản ứng oxi hoá khử sau :








a. Theo phương pháp cân bằng electron :



b. Theo phương pháp cân bằng ion - electron :



### Hướng dẫn giải:







**Câu 8:** Bỏ túc và cân bằng các phương trình phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron hoặc phương pháp ion electron :



( chỗ “...” có thể thêm một hoặc nhiều chất )

- a.  $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8 + \text{MnSO}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{KMnO}_4 + \dots$   
 b.  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \dots$   
 c.  $\text{Al} + \text{NaNO}_3 + \text{NaOH} + \dots \rightarrow \text{NH}_3 + \dots$   
 d.  $\text{Zn} + \text{NaNO}_3 + \text{NaOH} \rightarrow \text{NH}_3 + \dots$



### Hướng dẫn giải:





c.





d.

**Câu 9:** Hoàn thành và cân bằng các phản ứng sau bằng phương pháp ion electron.**Hướng dẫn giải:**


Cân bằng các phản ứng bằng phương pháp ion electron:

Chất khử:  $\text{CrI}_3$ Chất oxi hoá:  $\text{Cl}_2$ Môi trường:  $\text{KOH}$ 



Phương trình phân tử:


Chất khử:  $\text{Al}$ Chất oxi hoá:  $\text{NO}_3^-$ Môi trường:  $\text{HNO}_3$ 

Phương trình phân tử:








Hoàn thành các phương trình phản ứng sau bằng phương pháp thăng bằng ion electron:



**Câu 10:** Cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron:




**Hướng dẫn giải:**




**Câu 11:** Hoàn thành các phương trình hóa học




c)






c)



**Câu 12:** Hoàn thành các phản ứng sau:





**Hướng dẫn giải:**



**Câu 13:** Theo lý thuyết công thức của khoáng pyrite là  $\text{FeS}_2$ . Trong thực tế một phần ion disulfide  $\text{S}_2^{2-}$  bị thay thế bởi ion sulfide  $\text{S}^{2-}$  và công thức tổng quát của pyrite có thể biểu diễn là  $\text{FeS}_{2-x}$ . Như vậy có thể coi pyrite

như một hỗn hợp của  $\text{FeS}_2$  và  $\text{FeS}$ . Khi xử lý một mẫu khoáng với  $\text{Br}_2$  trong  $\text{KOH}$  dư thì xảy ra các phản ứng sau:



Sau khi lọc thì chất không tan tách khỏi dung dịch và:

-/  $\text{Fe(OH)}_3$  được nung nóng và chuyển hóa hoàn toàn thành  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  có khối lượng 0,2 gam.

-/ Cho dư dung dịch  $\text{BaCl}_2$  vào pha lỏng được 1,1087 gam kết tủa  $\text{BaSO}_4$ .

a. Xác định công thức của pyrite.

b. Cân bằng hai phương trình phản ứng trên, nêu rõ cân bằng electron.



c. Tính lượng  $\text{Br}_2$  theo gam cần thiết để oxi hóa mẫu khoáng.

**Hướng dẫn giải:**

$$a. n_S = \frac{1,1087}{233,4} = 4,75 \cdot 10^{-3}$$

$$n_{\text{Fe}} = 2 \cdot \frac{0,2}{160} = 2,5 \cdot 10^{-3}$$

$\Rightarrow n_{\text{Fe}} : n_S = 1 : 1,9 \Rightarrow$  Công thức  $\text{FeS}_{1,9}$



c.  $2 - x = 1,9 \Rightarrow x = 0,1 \Rightarrow 90\% \text{FeS}_2; 10\% \text{FeS}$

$$m_1(\text{Br}_2) = 160 \cdot 0,9 \cdot 25 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{15}{2} = 2,7(\text{g})$$

$$\begin{aligned} m_2(\text{Br}_2) &= 160 \cdot 0,1 \cdot 25 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{9}{2} = 0,18(\text{g}) \\ \Rightarrow m_{\text{Br}_2} &= 2,7 + 0,18 = 2,88(\text{g}) \end{aligned}$$

## Dạng 2: Bài tập

**Câu 1:** Cho m gam hỗn hợp X gồm  $\text{Fe}_x\text{O}_y$ ,  $\text{Fe}$ ,  $\text{MgO}$ ,  $\text{Mg}$  tác dụng với dung dịch  $\text{HNO}_3$  dư thu được 129,4 gam muối và 0,3 mol hỗn hợp khí Y gồm  $\text{N}_2\text{O}$  và  $\text{NO}$  có khối lượng 9,56 gam. Mặt khác, nếu cho m gam hỗn hợp X ở trên tác dụng với dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  đặc, nóng, dư thu được 104 gam muối và 0,7 mol khí  $\text{SO}_2$  (sản phẩm khử duy nhất). Tính m.

**Hướng dẫn giải:**

Theo bài ra số mol của  $\text{NO} = 0,26$  (mol); số mol của  $\text{N}_2\text{O} = 0,04$  (mol)

Số mol của  $\text{SO}_2 = 0,7$  (mol)  $\longrightarrow$  Khi cho X tác dụng với  $\text{HNO}_3$  có tạo muối  $\text{NH}_4^+$ .

Số mol  $\text{NH}_4^+ = 0,0375$  (mol)  $\longrightarrow m_{\text{muối nitrat kim loại}} = 129,4 - 0,0375 \cdot 80 = 126,4$  (gam)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{cases} \text{Mg} : x(\text{mol}) \\ \text{Fe} : y(\text{mol}) \\ \text{O} : z(\text{mol}) \end{cases} \xrightarrow{+\text{HNO}_3} \begin{cases} \text{Mg}(\text{NO}_3)_2 : x(\text{mol}) \\ \text{Fe}(\text{NO}_3)_3 : y(\text{mol}) \\ \text{NH}_4\text{NO}_3 : 0,0375(\text{mol}) \end{cases} \longrightarrow 148x + 242y = 126,4 \quad (1)$ |
| $\begin{cases} \text{Mg} : x(\text{mol}) \\ \text{Fe} : y(\text{mol}) \\ \text{O} : z(\text{mol}) \end{cases} \xrightarrow{+\text{H}_2\text{SO}_4} \begin{cases} \text{MgSO}_4 : x(\text{mol}) \\ \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 : 0,5y(\text{mol}) \end{cases} \longrightarrow 120x + 200y = 104 \quad (2)$                                               |
| $\xrightarrow{\text{BT e}} 2x + 3y - 2z = 1,4 \quad (3)$                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Từ (1); (2) và (3) ta có: <math>x = 0,2; y = 0,4; z = 0,1 \longrightarrow m = 28,8 \text{ (gam)}</math></p>                                                                                                                                                                                                                                         |

**Câu 2:** Hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M (hóa trị n không đổi). Hòa tan hoàn toàn m gam X trong dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  đặc, nóng, dư được dung dịch A và V lít khí  $\text{SO}_2$  (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Hấp thụ hết lượng  $\text{SO}_2$  trên bằng 500 ml dung dịch NaOH 0,2M thu được dung dịch chứa 5,725 gam chất tan.

- Thêm vào m gam X một lượng kim loại M gấp đôi lượng kim loại M có trong X, thu được hỗn hợp Y. Cho Y tan hết trong dung dịch HCl dư thu được 1,736 lít khí  $\text{H}_2$  (đktc).

- Thêm vào m gam X một lượng Fe bằng lượng Fe có trong X, thu được hỗn hợp Z. Cho Z tác dụng với dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  loãng, dư thu được dung dịch B chứa 5,605 gam muối.


1. Tính V.

2. Xác định kim loại M và tính thành phần phần trăm khối lượng của hỗn hợp X.

**Hướng dẫn giải:**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Ta có <math>n_{\text{NaOH}} = 0,5.0,2 = 0,1 \text{ mol}</math><br/>         Khí <math>\text{SO}_2</math> sinh ra tác dụng với dung dịch NaOH có thể xảy ra phản ứng:</p> $\text{SO}_2 + \text{NaOH} \longrightarrow \text{NaHSO}_3$ $\text{SO}_2 + 2\text{NaOH} \longrightarrow \text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ <p>- Nếu chỉ tạo muối <math>\text{NaHSO}_3 \rightarrow n_{\text{NaHSO}_3} = 0,1(\text{mol}) \rightarrow m_{\text{chất rắn}} = 10,4 \text{ (gam)}</math><br/>         - Nếu chỉ tạo muối <math>\text{Na}_2\text{SO}_3 \rightarrow n_{\text{Na}_2\text{SO}_3} = 0,05(\text{mol}) \rightarrow m_{\text{chất rắn}} = 6,3 \text{ (gam)}</math></p> |
|   | <p>Ta có: <math>m_{\text{chất rắn}} &lt; m_{\text{muối min}}</math></p> $\longrightarrow \text{Chất rắn gồm} \begin{cases} \text{NaOH} : x(\text{mol}) \\ \text{Na}_2\text{SO}_3 : y(\text{mol}) \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x + 2y = 0,1 \\ 40x + 126y = 5,725 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x = 0,025 \\ y = 0,0375 \end{cases}$ $\xrightarrow{\text{BTNT(S)}} n_{\text{SO}_2} = n_{\text{Na}_2\text{SO}_3} = 0,0375 \longrightarrow V_{\text{SO}_2} = 0,84(\text{lít})$                                                                                                                                                                          |
| 2 | <p>Đặt số mol Fe và M trong m gam X <math>\begin{cases} \text{Fe} : x(\text{mol}) \\ \text{M} : y(\text{mol}) \end{cases} \xrightarrow{\text{BT(e)}} 3x + ny = 0,075 \quad (1)</math></p> <p>Số mol các chất trong hỗn hợp Y <math>\begin{cases} \text{Fe} : x(\text{mol}) \\ \text{M} : 3y(\text{mol}) \end{cases} \xrightarrow{\text{BT(e)}} 2x + 3ny = 0,155 \quad (2)</math></p> <p>Từ (1) và (2) <math>\longrightarrow x = 0,01; ny = 0,045</math></p>                                                                                                                                                                                                                   |
|   | <p>Số mol các chất trong hỗn hợp Z</p> $\begin{cases} \text{Fe} : 2x(\text{mol}) \\ \text{M} : y(\text{mol}) \end{cases} \xrightarrow{\text{BTNT(Fe; M)}} \begin{cases} n_{\text{FeSO}_4} : 2x(\text{mol}) \\ \text{M}_2(\text{SO}_4)_n : 0,5y(\text{mol}) \end{cases}$ <p><math>m_{\text{muối}} = 5,605 \text{ (gam)} \longrightarrow 152.2x + (2M + 96n).0,5y = 5,605 \quad (*)</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |







Thay  $x = 0,01$  và  $ny = 0,045$  vào (\*) ta được:  $M = 9n \rightarrow M$  là Nhôm (Al);  $y = 0,015$  (mol)

**Câu 3:**

Quặng pyrite trong thực tế được coi là hỗn hợp  $\text{FeS}_2$  và  $\text{FeS}$ . Khi xử lý một mẫu quặng pyrite bằng  $\text{Br}_2$  trong  $\text{KOH}$  dư, đun nóng, người ta thu được kết tủa đỏ nâu X và dung dịch Y. Nung X đến khối lượng không đổi được 1,2 gam chất rắn. Thêm dung dịch  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  dư vào dung dịch Y thì thu được 6,6405 gam kết tủa trắng không tan trong  $\text{HCl}$  (biết các phản ứng đều hoàn toàn).

a. Viết các phương trình phản ứng.

b. Tính % khối lượng của  $\text{FeS}$  trong loại quặng pyrite trên.

**Hướng dẫn giải:**

Gọi số mol  $\text{FeS}_2$  là a, số mol  $\text{FeS}$  là b ta có hệ

$$\begin{cases} a + b = 0,015 \\ 2a + b = 0,0285 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0,0135 \\ b = 0,0015 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \%m_{\text{FeS}} = 7,534\%$$

**Câu 4:** Chia 29,6 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu thành hai phần bằng nhau. Phần 1 cho phản ứng với lượng dư dung dịch  $\text{HCl}$ , sinh ra 3,7185 lít  $\text{H}_2$  (đkc). Cho phần 2 tác dụng với dung dịch  $\text{HNO}_3$  đặc, nóng (dư) thu được V lít khí  $\text{NO}_2$  (đkc) và dung dịch Y.

a) Tính giá trị của V


b) Cho Y phản ứng với lượng dư dung dịch  $\text{NH}_3$ . Tính khối lượng kết tủa thu được sau khi các phản ứng kết thúc.

**Hướng dẫn giải:**

a) Gọi x, y lần lượt là số mol Fe và Cu chứa trong 14,8 gam hỗn hợp X.

$$\text{Ta có: } 56x + 64y = 14,8 \quad (*)$$






• Phần 1: Cu không phản ứng



$$\Rightarrow n_{\text{H}_2} = x = 0,15 \text{ mol}$$


$$(*) \Rightarrow y = 0,1 \text{ mol}$$

• Phần 2:




$$\Rightarrow a = 0,45 + 0,2 = 0,65 \text{ mol} \Rightarrow V = 0,65 \cdot 22,4 = 14,56 \text{ lít}$$


b) Dung dịch Y chứa  $\text{Fe}^{3+}, \text{Cu}^{2+}, \text{H}^+, \text{NO}_3^-$



$$0,15 \rightarrow 0,15$$



$$0,1 \rightarrow 0,1$$



$$0,1 \rightarrow 0,1$$

$$\Rightarrow m_{\text{kết tủa}} = m_{\text{Fe}(\text{OH})_3} = 107 \cdot 0,1 = 10,7 \text{ gam}$$

**Câu 5:** Trong quá trình bảo quản, một mẫu muối  $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  (có khối lượng  $m$  gam) bị oxi hóa bởi oxygen không khí tạo thành hỗn hợp X chứa các hợp chất của Fe(II) và Fe(III). Hòa tan toàn bộ X trong dung dịch loãng chứa 0,05 mol  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , thu được 100 ml dung dịch Y. Tiến hành hai thí nghiệm với Y:


*Thí nghiệm 1:* Cho lượng dư dung dịch  $\text{BaCl}_2$  vào 25 ml dung dịch Y, thu được 4,66 gam kết tủa.

*Thí nghiệm 2:* Thêm dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (loãng, dư) vào 25 ml dung dịch Y, thu được dung dịch Z. Nhỏ từ từ dung dịch  $\text{KMnO}_4$  0,1M vào Z đến khi phản ứng vừa đủ thì hết 13,5 ml. Tính giá trị của  $m$  và phần trăm số mol Fe(II) đã bị oxi hóa trong không khí?

**Hướng dẫn giải:**

$$\text{TN}_1: \sum n_{\text{SO}_4^{2-}} = n_{\text{SO}_4^{2-}}(\text{FeSO}_4) + n_{\text{SO}_4^{2-}}(\text{H}_2\text{SO}_4) \Leftrightarrow \frac{4,66}{233} = n_{\text{SO}_4^{2-}}(\text{FeSO}_4) + \frac{25}{100} \cdot 0,05$$

$$\Rightarrow n_{\text{SO}_4^{2-}}(\text{FeSO}_4) = 0,0075 \text{ mol};$$



$$m_{\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}} = 0,075 \cdot (56 + 96 + 18 \cdot 7) \cdot \frac{100}{25} = 8,34 \text{ gam}.$$

$$\% \text{Fe}^{2+}(\text{bị OXH}) = \frac{0,0075 - 0,00675}{0,0075} \cdot 10\% = 10\%$$

**Câu 6:** Trong quá trình bảo quản, một mẫu muối  $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  (có khối lượng  $m$  gam) bị oxi hóa bởi oxygen không khí tạo thành hỗn hợp X chứa các hợp chất của Fe(II) và Fe(III). Hòa tan toàn bộ X trong dung dịch loãng chứa 0,035 mol  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , thu được 100 ml dung dịch Y. Tiến hành hai thí nghiệm với Y:

*Thí nghiệm 1:* Cho lượng dư dung dịch  $\text{BaCl}_2$  vào 20 ml dung dịch Y, thu được 2,33 gam kết tủa.

*Thí nghiệm 2:* Thêm dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (loãng, dư) vào 20 ml dung dịch Y, thu được dung dịch Z.

Nhỏ từ từ dung dịch  $\text{KMnO}_4$  0,03M vào Z đến khi phản ứng vừa đủ thì hết 18 ml. Tính giá trị của  $m$  và phần trăm số mol Fe(II) đã bị oxi hóa trong không khí?

**Hướng dẫn giải:**

$$+n_{\text{SO}_4^{2-}}^Y = 0,015 = 0,05 \rightarrow n_{\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}} = 0,015 \rightarrow m = 4,17 \text{ gam}$$

$$+n_{\text{Fe}^{2+}}^Y = 0,018 \cdot 0,035 \cdot 5 = 0,0135 \rightarrow \% \text{Fe}_{\text{II} \rightarrow \text{III}} = \frac{0,015 - 0,0135}{0,015} = 10\%$$


**Câu 7:** Trong quá trình bảo quản, một mẫu muối  $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  (có khối lượng  $m$  gam) bị oxi hóa bởi oxi không khí tạo thành hỗn hợp X chứa các hợp chất của Fe(II) và Fe(III). Hòa tan toàn bộ X trong dung dịch loãng chứa 0,025 mol  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , thu được 100 ml dung dịch Y. Tiến hành hai thí nghiệm với Y:

*Thí nghiệm 1:* Cho lượng dư dung dịch  $\text{BaCl}_2$  vào 20 ml dung dịch Y, thu được 2,33 gam kết tủa.

*Thí nghiệm 2:* Thêm dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (loãng, dư) vào 20 ml dung dịch Y, thu được dung dịch Z. Nhỏ từ từ dung dịch  $\text{KMnO}_4$  0,1M vào Z đến khi phản ứng vừa đủ thì hết 8,6ml.

Tính giá trị của  $m$  và phần trăm số mol Fe(II) đã bị oxi hóa trong không khí?

**Hướng dẫn giải:**



**TN1:** 20ml Y + BaCl<sub>2</sub> dư  $\longrightarrow$  2,33 g BaSO<sub>4</sub> : 0,01 mol

$$\Rightarrow x + 0,025 = 0,01 \cdot \frac{100}{20} \Rightarrow x = 0,025 \Rightarrow m = 0,025 \cdot 278 = \mathbf{6,95g}$$

**TN2:** 20ml Y + 8,6ml KMnO<sub>4</sub> 0,1M (chỉ có Fe<sup>2+</sup> tác dụng)

$$\text{BT e : } n_{\text{Fe}^{2+}} = 5n_{\text{KMnO}_4} = 5 \cdot 8,6 \cdot 10^{-3} \cdot 0,1 \cdot \frac{100}{20} = 0,0215 \text{ mol}$$

$$\text{Số mol Fe}^{2+} \text{ bị oxi hóa} = \text{số mol Fe}^{3+} = 0,025 - 0,0215 = 3,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\%n_{\text{Fe}^{2+} \text{ bị oxi hóa}} = \frac{n_{\text{Fe}^{2+} \text{ bị oxi hóa}}}{n_{\text{Fe}^{2+} \text{ ban đầu}}} \cdot 100\% = \frac{3,5 \cdot 10^{-3}}{0,025} \cdot 100\% = \mathbf{14\%}$$

**Câu 8:** Trong quá trình bảo quản, một mẫu muối FeSO<sub>4</sub>·7H<sub>2</sub>O (có khối lượng m gam) bị oxi hóa bởi oxi không khí tạo thành hỗn hợp X chứa các hợp chất của Fe(II) và Fe(III). Hòa tan toàn bộ X trong dung dịch loãng chứa 0,02 mol H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, thu được 100 ml dung dịch Y. Tiến hành hai thí nghiệm với Y:

*Thí nghiệm 1:* Cho lượng dư dung dịch BaCl<sub>2</sub> vào 25ml dung dịch Y, thu được 2,33 gam kết tủa.

*Thí nghiệm 2:* Thêm dung dịch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (loãng, dư) vào 25ml dung dịch Y, thu được dung dịch Z.

Nhỏ từ từ dung dịch KMnO<sub>4</sub> 0,04M vào Z đến khi phản ứng vừa đủ thì hết 22ml. Tính giá trị của m và phần trăm số mol Fe(II) đã bị oxi hóa trong không khí?

**Hướng dẫn giải:**

(Chú ý: Các thí nghiệm chỉ dùng 1/4 dung dịch Y nên ta gấp 4 lần số liệu lên).

$$\text{TN}_1: \text{Bảo toàn S: } n_{\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}} + n_{\text{H}_2\text{SO}_4} = n_{\text{BaSO}_4} = 0,04$$

$$\rightarrow n_{\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}} = 0,02$$

$$\rightarrow m_{\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}} = 5,56 \text{ gam}$$

$$\text{TN2: Bảo toàn electron: } n_{\text{Fe}^{2+}} = 5n_{\text{KMnO}_4} = 0,0176$$

$$\rightarrow n_{\text{Fe}^{2+} \text{ bị O}_2 \text{ oxi hóa}} = 0,02 - 0,0176 = 0,0024$$

$$\rightarrow \%n_{\text{Fe}^{2+} \text{ bị O}_2 \text{ oxi hóa}} = 0,0024/0,02 = 12\%$$

**Câu 9:** Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> và Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> vào dung dịch HCl dư, thu được a mol H<sub>2</sub> và dung dịch chứa 31,19 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X trong dung dịch chứa 0,55 mol H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (đặc) đun nóng, thu được dung dịch Y và 0,14 mol SO<sub>2</sub> (sản phẩm khử duy nhất của S<sup>+6</sup>). Cho 400 ml dung dịch NaOH 1M vào Y, sau khi phản ứng kết thúc thu được 10,7 gam một chất kết tủa. Giá trị của a là

A. 0,05.

B. 0,06.

C. 0,04.

D. 0,03.


**Hướng dẫn giải:**

**Cách 1:**

- X + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (đặc, nóng)

$$n_{\text{OH}^-} (\downarrow) = 3 \cdot n_{\text{Fe(OH)}_3} = 0,3 \rightarrow \text{H}^+ \text{ dư} : 0,4 - 0,3 = 0,1$$


$$\rightarrow n_{\text{H}_2\text{SO}_4} (\text{phản ứng}) = 0,55 - 0,1/2 = 0,5 \text{ mol}$$



$$n_{\text{H}_2\text{SO}_4} (\text{phản ứng}) = n_{\text{O}} + 2n_{\text{SO}_2} \Leftrightarrow 0,5 = n_{\text{O}} + 2 \cdot 0,14 \Rightarrow n_{\text{O}} = 0,22$$

$$\xrightarrow{\text{BT.e}} 3 \cdot n_{\text{Fe}} = 2n_{\text{O}} + 2n_{\text{SO}_2} \Rightarrow n_{\text{Fe}} = 0,24$$

- X + HCl:



**Cách 2:** Quy đổi hỗn hợp về Fe, FeO, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.


$$n_{\text{OH}^-} (\downarrow) = 3 \cdot n_{\text{Fe(OH)}_3} = 0,3 \rightarrow \text{H}^+ \text{ d} : 0,4 - 0,3 = 0,1$$

$$\rightarrow n_{\text{H}_2\text{SO}_4} (\text{phản ứng}) = 0,55 - 0,1/2 = 0,5 \text{ mol}$$

$$\begin{cases} \text{Fe}: x \\ \text{FeO}: y \\ \text{Fe}_2\text{O}_3: z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 127(x+y) + 162,5 \cdot 2z = 31,19 \\ 3x + y = 0,142 \\ (y+3z) + 0,142 \Rightarrow 0,5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,03 \\ y = 0,19 \Rightarrow a = x = 0,03 \\ z = 0,01 \end{cases}$$

**Câu 10:** Oxi hóa hoàn toàn 41,6 gam hỗn hợp X gồm Al, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Fe, FeCO<sub>3</sub>, FeS trong dung dịch chứa 2,5 mol HNO<sub>3</sub>, đun nóng, thu được 19,4 gam hỗn hợp 2 khí (trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí) và dung dịch Z chỉ chứa 159 gam hỗn hợp muối trung hòa. Dung dịch Z phản ứng tối đa 1,275 mol Ba(OH)<sub>2</sub>, thu được 55,4 gam kết tủa E chứa 2 chất. Nung nóng E, thu được 47,3 gam chất rắn F. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính phần trăm khối lượng Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> trong X?

**Hướng dẫn giải:**



$$\begin{cases} m_E = 233x + 107y = 55,4 \\ m_F = 233x + 80y = 47,3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,1 \text{ mol} \\ y = 0,3 \text{ mol} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{\text{FeS}} = n_{\text{SO}_4^{2-}} = x = 0,1 \text{ mol} \\ n_{\text{Fe}^{3+}} = y = 0,3 \text{ mol} \end{cases}$$

$$\begin{cases} m_{\text{muối}} = 27a + 18b + 62c + 56 \cdot 0,3 + 0,1 \cdot 96 = 159 \\ \text{BT § T}: 3a + 3 \cdot 0,3 + b = 2 \cdot 0,1 + c \\ n_{\text{OH}^- \text{ max}} = 4a + 3 \cdot 0,3 + b = 2 \cdot 1,275 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0,4 \text{ mol} \\ b = 0,05 \text{ mol} \\ c = 1,95 \text{ mol} \end{cases}$$


$$\xrightarrow{\text{BT (N)}} n_{\text{NO}} = 0,5 \text{ mol} \xrightarrow{m_{\text{khí}}} n_{\text{CO}_2} = 0,1 \text{ mol} = n_{\text{FeCO}_3} \xrightarrow{\text{BTNT (Fe)}} n_{\text{Fe}} = 0,1 \text{ mol}$$

$$\begin{cases} \text{Al}: d \\ \text{Al}_2\text{O}_3: e \end{cases} \begin{cases} \xrightarrow{\text{BTNT (Al)}} d + 2e = 0,4 \\ m_X = 27d + 102e + 56 \cdot 0,1 + 116 \cdot 0,1 + 87 \cdot 0,1 = 41,6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} d = 0,2 \text{ mol} \\ e = 0,1 \text{ mol} \end{cases} \Rightarrow \%m_{\text{Al}_2\text{O}_3} = 24,52\%$$

**Câu 11:** Trong vụ cháy tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông – Hà Nội năm 2019, một lượng thủy ngân (mercury) đã bị phát tán vào môi trường. Nhằm giảm thiểu sự ô nhiễm; phương pháp xử lý là phun bột lưu huỳnh (sulfur) và dung dịch soda Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> vào vùng bị ô nhiễm; Sau đó thu gom thủy ngân dưới dạng HgS và HgO.

Để hiểu rõ hơn về quá trình xử lý, thu gom thủy ngân ta xét các quá trình sau:


a. Thủy ngân ngoài dạng Hg còn tồn tại ở dạng Hg<sub>2</sub><sup>2+</sup> và Hg<sup>2+</sup>. Giữa 3 dạng này tồn tại cân bằng (1):



Cho biết  $E_1^0(\text{Hg}_2^{2+}/\text{Hg}) = 0,85\text{V}$ ;  $E_2^0(\text{Hg}_2^{2+}/\text{Hg}) = 0,79\text{V}$

Hãy xác định  $E_3^0(\text{Hg}_2^{2+}/\text{Hg}_2^{2+})$ . Từ đó tính hằng số cân bằng  $K_1$  của phản ứng 1 và cho biết  $\text{Hg}_2^{2+}$  có bền trong dung dịch hay không.

b. Để chuyển cân bằng (1) sang phải và thu được  $\text{Hg}^{2+}$  dưới dạng  $\text{HgO}$ , ta thêm kiềm vào dung dịch, khi đó sẽ xảy ra phản ứng (2):




Biết với phản ứng:  $\text{HgO} \downarrow + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Hg}^{2+} + 2\text{OH}^- \quad T_{\text{HgO}} = 10^{-25,8}$

Xác định hằng số cân bằng  $K_2$  của phản ứng (2) và thiết lập biểu thức tính nồng độ  $\text{Hg}_2^{2+}$  theo  $\text{OH}^-$ .

c. Nếu dùng dung dịch  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  0,01M ( $\text{pK}_{b1} = 3,67$ ;  $\text{pK}_{b2} = 7,65$ ). Thì nồng độ của  $\text{Hg}_2^{2+}$  là bao nhiêu? Từ đó giải thích trò của  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  và bột sulfur trong quá trình trên.

**Hướng dẫn giải:**

|    | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Điểm |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| a. | <p>Xét quá trình</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Ta có: <math>\Delta G_1^0 = \Delta G_2^0 + \Delta G_3^0</math><br/> Hay <math>-2E_1^0 \cdot F = -E_2^0 \cdot F - E_3^0 \cdot F</math><br/> Hay <math>2E_1^0 = E_2^0 + E_3^0</math><br/> <math>E_3^0 = 2E_1^0 - E_2^0 = 2 \cdot 0,85 - 0,79 = 0,91\text{V}</math></p> </div> </div>                                                                                                                                                                                         | 0,5  |
|    | <p>Đối với cân bằng: <math>\text{Hg}_2^{2+} \rightleftharpoons \text{Hg}^{2+} + \text{Hg} \quad (1)</math></p> <p><math>\Delta E^0 = E_{\text{ox}}^0 - E_{\text{kh}}^0 = E_2^0 - E_3^0 = 0,79 - 0,91 = -0,15\text{V} \Rightarrow K_1 = 10^{\frac{n\Delta E^0}{0,059}} = 9,25 \cdot 10^{-3}</math></p> <p>Mặt khác: <math>K_1 = \frac{[\text{Hg}^{2+}]}{[\text{Hg}_2^{2+}]} = 9,25 \cdot 10^{-3} \Rightarrow [\text{Hg}_2^{2+}] = 1,1 \cdot 10^4 [\text{Hg}^{2+}]</math>,</p> <p>Hàm lượng <math>[\text{Hg}_2^{2+}] \gg [\text{Hg}^{2+}]</math> hay <math>[\text{Hg}_2^{2+}]</math> bền trong dung dịch.</p>                                                             | 0,5  |
| b. | <p>Xét cân bằng</p> $\text{Hg}_2^{2+} \rightleftharpoons \text{Hg}^{2+} + \text{Hg} \quad (1) \quad K_1$ $\text{Hg}^{2+} + 2\text{OH}^- \rightleftharpoons \text{HgO} \downarrow + \text{H}_2\text{O} \quad (3) \quad T_{\text{HgO}}^{-1} = 10^{25,8}$ $\text{Hg}_2^{2+} + 2\text{OH}^- \rightleftharpoons \text{HgO} \downarrow + \text{Hg} + \text{H}_2\text{O} \quad (2) \quad K_2$ $K_2 = K_1 \cdot T_{\text{HgO}}^{-1} = 10^{23,77} = \frac{1}{[\text{Hg}_2^{2+}] \cdot [\text{OH}^-]^2} \Rightarrow [\text{Hg}_2^{2+}] = \frac{1}{10^{23,77} \cdot [\text{OH}^-]^2} \quad (4)$                                                                                    | 0,5  |
| c. | <p>Quá trình thủy phân: <math>\text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{OH}^- \quad K_{b1} = 10^{-3,67}</math></p> <p><math>\text{HCO}_3^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CO}_3^{2-} + \text{OH}^- \quad K_{b2} = 10^{-7,65}</math></p> <p>Vì <math>K_{b1} \gg K_{b2}</math>; bỏ qua cân bằng phân li thứ 2. <math>[\text{OH}^-] = x \Rightarrow</math></p> $\frac{x^2}{0,01 - x} = 10^{-3,67} \Rightarrow x = 1,36 \cdot 10^{-3} = 10^{-2,87}$ <p>Thay giá trị nồng độ <math>[\text{OH}^-]</math> vào (4) ta được</p> $[\text{Hg}_2^{2+}] = \frac{1}{10^{23,77} \cdot [10^{-2,87}]^2} = 10^{-18} \text{ rất bé.}$ | 0,25 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  | Vai trò $\text{Na}_2\text{CO}_3$ tạo môi trường kiềm để chuyển $\text{Hg}_2^{2+}$ và $\text{Hg}^{2+}$ về dạng $\text{HgO}$ không tan được thu gom cùng $\text{HgS}$ . Tránh sự phân tán các hạt $\text{Hg}_2^{2+}$ và $\text{Hg}^{2+}$ ra môi trường bên ngoài. | 0,25 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

**Câu 12:** Trong công nghiệp  $\text{H}_2\text{O}_2$  có thể điều chế bằng cách cho acid A hoặc acid B tác dụng với nước, sản phẩm của 2 phản ứng này đều là  $\text{H}_2\text{SO}_4$  và  $\text{H}_2\text{O}_2$ . Biết 1 phân tử A có 8 nguyên tử, trong A nguyên tố oxygen chiếm 70,18% khối lượng, phân tử B chứa nhiều hơn phân tử A 1 nguyên tử S và 3 nguyên tử O.

a. Xác định A, B và viết các phương trình hóa học xảy ra.

b. Hãy viết công thức cấu tạo, cho biết trạng thái lai hóa của các nguyên tử trong A và B (với các nguyên tử có lai hóa), xác định số oxi hóa của các nguyên tử trong A và B.

c. Vì sao A và B đều có tính oxi hóa mạnh và tính acid mạnh. Một trong 2 acid là acid 1 nấc, đó là acid nào, hãy giải thích.

d. Hãy viết phương trình phản ứng của KI lần lượt với A và B, cho biết phản ứng nào giải phóng  $\text{I}_2$  nhanh hơn, giải thích.

**Hướng dẫn giải:**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |      |   |      |   |   |   |       |      |     |      |   |      |   |  |  |  |  |   |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|---|------|---|---|---|-------|------|-----|------|---|------|---|--|--|--|--|---|--|
| a. | <div><math display="block">\text{A} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}_2</math><math display="block">\text{B} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}_2</math><p><math>\Rightarrow</math> A, B đều chứa H, O và S. Gọi công thức của A là <math>\text{H}_a\text{S}_b\text{O}_c</math> ta có</p><math display="block">a+b+c=8 \quad (1) \Rightarrow a=8-b-c</math><math display="block">\frac{16c}{a+32b+16c} = 0,7018</math><math display="block">\Rightarrow \frac{16c}{8-b-c+32b+16c} = 0,7018</math><math display="block">\Rightarrow \frac{16c}{8+31b+15c} = 0,7018</math><p>Vì <math>a+b+c=8 \Rightarrow c \leq 6</math><br/>Lập bảng giá trị a, b, c:</p><table><tr><td>c</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>b</td><td>- ...</td><td>0,25</td><td>0,5</td><td>0,75</td><td>1</td><td>1,25</td></tr><tr><td>a</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td></td></tr></table><p>Vậy A là <math>\text{H}_2\text{SO}_5</math><br/>B là <math>\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8</math><br/>Phương trình phản ứng:</p><math display="block">\text{H}_2\text{SO}_5 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{O}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4</math><math display="block">\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4</math></div> | c    | 1   | 2    | 3 | 4    | 5 | 6 | b | - ... | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | a |  |  |  |  | 2 |  |
| c  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2    | 3   | 4    | 5 | 6    |   |   |   |       |      |     |      |   |      |   |  |  |  |  |   |  |
| b  | - ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 |   |   |   |       |      |     |      |   |      |   |  |  |  |  |   |  |
| a  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |      | 2 |      |   |   |   |       |      |     |      |   |      |   |  |  |  |  |   |  |
| b. | <div><div><div>A</div><div></div></div><div><div>B</div><div></div></div></div> <p>Trong các chất trên O có liên kết đơn đều lai hóa <math>\text{sp}^3</math>, S lai hóa <math>\text{sp}^3</math><br/>Số oxi hóa của S là +6; O có số oxi hóa -1 hoặc -2<br/>(chú ý nếu xác định số oxi hóa trung bình không cho điểm)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |      |   |      |   |   |   |       |      |     |      |   |      |   |  |  |  |  |   |  |
| c. | <p>Trong A và B đều chứa nhiều O liên kết với S tạo ra nhóm có hiệu ứng liên hợp hút electron làm cho liên kết O-H trong phân tử phân cực mạnh làm A và B có tính acid mạnh.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |      |   |      |   |   |   |       |      |     |      |   |      |   |  |  |  |  |   |  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>Trong A và B nguyên tử oxi có số oxi hóa -1 và phân tử kém bền nên A và B đều có tính oxi hóa mạnh.</p> <p>A là axit một nấc vì có 1 nhóm HO không tạo hiệu ứng liên hợp với gốc acid còn lại làm liên kết HO trong đó kém phân cực.</p>                                                                                                            |
| <b>d.</b> | <p>Phương trình phản ứng</p> $2KI + H_2SO_5 \rightarrow I_2 + K_2SO_4 + H_2O \quad (1)$ $2KI + H_2S_2O_8 \rightarrow I_2 + K_2SO_4 + H_2SO_4 \quad (2)$ <p>(1) giải phóng <math>I_2</math> nhanh hơn (2) vì <math>H_2SO_5</math> có tính oxi hóa mạnh hơn <math>H_2S_2O_8</math> do phân tử A kém đối xứng hơn B nên A có tính oxi hóa mạnh hơn B.</p> |

**Câu 13:**

Cho 1 mL dung dịch KI  $2 \cdot 10^{-2}$  M vào 1mL dung dịch hỗn hợp  $FeCl_3$  0,2M và HCl 0,2M, cho thêm vài giọt hồ tinh bột, thu được dung dịch (A).

(a) Nêu hiện tượng xảy ra, viết các phương trình phản ứng và giải thích bằng tính toán.

(b) Nhúng dây dẫn Pt vào dung dịch (A). Xác định thế điện cực ( $E_A$ ) của điện cực được tạo bởi dây dẫn Pt với dung dịch (A).


Cho biết:  $E^o_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} = 0,770V$ ;  $E^o_{I_2/2I^-} = 0,536V$ ;

**Hướng dẫn giải:**

(a) Khi thêm 1 mL dung dịch KI  $2 \cdot 10^{-2}$  M vào 1 mL dung dịch  $FeCl_3$  0,2M và HCl 0,2M.


$C(Fe^{3+}) = 0,1M$ ;  $C(I^-) = 10^{-2}M$ ;  $C(H^+) = 0,1M$

Trong hệ có phản ứng:



$$\Delta E_{(1)} = 0,77 - 0,536 = 0,234 V$$

$K_1$  lớn nên có thể coi phản ứng (1) xảy ra hoàn toàn:



Trước phản ứng (M) 0,1 10<sup>-2</sup>

Sau phản ứng (M) 9.10<sup>-2</sup> 0 10<sup>-2</sup> 5.10<sup>-3</sup>

Dung dịch (A) có :  $Fe^{2+}$ ;  $Fe^{3+}$ ;  $I_2$ .

Vậy: Dung dịch (A) có màu xanh (hoặc xanh đen) do tạo hỗn hợp  $I_2$  với hồ tinh bột.

(b) Dung dịch (A) có thành phần giới hạn:

$Fe^{2+} : 9 \cdot 10^{-2}M$ ;  $Fe^{3+} : 10^{-2}M$ ;  $I_2 : 5 \cdot 10^{-3}M$ .


$$\begin{aligned} \Rightarrow E_A = E(Fe^{3+}/Fe^{2+}) &= E^o_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} + \frac{0,0592}{1} \cdot \lg([Fe^{3+}]/[Fe^{2+}]) \\ &= 0,77 + \frac{0,0592}{1} \cdot \lg(9 \cdot 10^{-2}/10^{-2}) = 0,8265 (V) \end{aligned}$$

**Phần IV: BÀI TẬP CÓ THÔNG TIN ỨNG DỤNG THỰC TẾ****Dạng 1: Lý thuyết**

**Câu 1.** Nước cường toan (còn gọi là Vương thủy) tên tiếng La tinh là aqua regia, tức "nước hoàng gia") là chất ăn mòn mạnh, ở dạng lỏng, màu vàng, dễ bay hơi. Nó được tạo thành bằng cách trộn lẫn dung dịch nitric acid đậm đặc và dung dịch hydrochloric acid đậm đặc, tối ưu là ở tỉ lệ mol 1:3. Nó là một trong số ít thuốc thử có khả năng hòa tan gold (Au) và platin (Pt).

Phương trình hòa tan Au như sau:






- a. Xác định chất oxy hóa, chất khử và viết bán phản ứng của các quá trình oxy hóa, quá trình khử.  
b. Cân bằng phương trình trên bằng phương pháp electron.

**Hướng dẫn giải:**


**Bước 1. Xác định số oxy hóa**



**Bước 2. Xác định chất khử, chất oxy hóa và bán phản ứng**




**Sự oxy hóa :** chất khử



**Sự khử :** chất oxy hóa


**Bước 3. Chọn hệ số**



**Bước 4. Đưa hệ số vào và kiểm tra**



**Câu 2.** Đa số các loại xe ô tô hiện tại đều chạy bằng nhiên liệu xăng. Ngoại trừ động cơ chạy bằng diesel thì các động cơ đốt cháy xăng bằng bugi. Để bugi hoạt động thì cần dòng điện một chiều tạo ra từ accquy trong oto. Accquy trong xe là “dạng ướt” vì nó chứa dung dịch sulfuric acid ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) (như một chất điện phân dạng lỏng). Điện được tạo ra bằng phản ứng hóa học sau đây:



Accquy trong oto có thể được dùng trong nhiều năm vì chúng có thể được sạc lại. Khi accquy hoạt động thì nó đóng vai trò là một pin điện hóa, còn khi sạc thì nó đóng vai trò là một thiết bị điện phân.

- a. Hãy xác định chất oxy hóa, chất khử và viết sự khử, sự oxy hóa trong phương trình trên.  
b. Trình bày cách cân bằng phương trình trên bằng phương pháp electron.




**Hướng dẫn giải:**


**Bước 1. Xác định số oxy hóa**



**Bước 2. Xác định chất khử, chất oxy hóa và bán phản ứng**




**Sự oxy hóa :** chất khử





**Sự khử :** chất oxy hóa

**Bước 3. Chọn hệ số**

**Bước 4. Đưa hệ số vào và kiểm tra**


**Câu 3.** Sodium peroxide ( $\text{Na}_2\text{O}_2$ ), potassium superoxide ( $\text{KO}_2$ ) là những chất oxy hóa mạnh, dễ dàng hấp thụ khí carbon dioxide và giải phóng khí oxygen. Do đó, chúng được sử dụng trong bình lặn hoặc tàu ngầm để hấp thụ khí carbon dioxide và cung cấp khí oxygen cho con người trong hô hấp theo các phản ứng sau:




- a. Cân bằng các phản ứng biết rằng nguyên tử oxygen trong  $\text{Na}_2\text{O}_2$ ,  $\text{KO}_2$  là nguyên tố tự oxy hóa-khử.  
 b. Theo nghiên cứu, khi hô hấp, thể tích khí carbon dioxide một người thải ra xấp xỉ thể tích khí oxygen hít vào. Cần trộn  $\text{Na}_2\text{O}_2$  và  $\text{KO}_2$  theo tỷ lệ mol như thế nào để thể tích khí carbon dioxide hấp thụ bằng thể tích khí oxygen sinh ra?

**Hướng dẫn giải:**


**Xét phương trình:**  $\text{Na}_2\text{O}_2 + \text{CO}_2 \longrightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{O}_2.$

**Bước 1. Xác định số oxy hóa****Bước 2. Xác định chất khử, chất oxy hóa và bán phản ứng**


**Sự oxy hóa :**




**Sự khử :**

**Bước 3. Chọn hệ số****Bước 4. Đưa hệ số vào và kiểm tra**

**Xét phương trình:**  $\text{KO}_2 + \text{CO}_2 \longrightarrow \text{K}_2\text{CO}_3 + \text{O}_2.$


**Bước 1. Xác định số oxy hóa****Bước 2. Xác định chất khử, chất oxy hóa và bán phản ứng**

**Sự oxy hóa :**




**Sự khử :**

**Bước 3. Chọn hệ số**



**Bước 4. Đưa hệ số vào và kiểm tra**



**b. Từ hai phương trình ta có**




$$\Rightarrow a + \frac{b}{2} = \frac{a}{2} + \frac{3}{4}b \Rightarrow 2a = b \Rightarrow$$

**Theo đề thì lượng  $\text{CO}_2 = \text{O}_2$  nên**

**phải trộn  $\text{Na}_2\text{O}_2$  và  $\text{KO}_2$  theo tỷ lệ 1 : 2.**

**Câu 4:** Tiêu chuẩn quốc gia GB 14880 – 1994 quy định hàm lượng iodine có trong muối iodine là từ 20 – 60 mg/kg. Để kiểm tra hàm lượng potassium iodide trong muối ăn có đạt tiêu chuẩn hay không có thể sử dụng phản ứng sau:



a, Xác định chất oxi hóa, chất khử trong phản ứng trên.


b, Cân bằng phản ứng trên bằng phương pháp thăng bằng electron.

c, Nếu cần tạo ra 0,3 mol iodine thì khối lượng muối  $\text{KIO}_3$  cần dùng là bao nhiêu gam?






**Hình 4.9.**  
**Muối iodine**

**Hướng dẫn giải:**



c. oxi hóa c. khử

b.




$$m_{\text{KIO}_3} = 0,1 \cdot (39 + 127 + 16 \cdot 3) = 21,4 \text{ gam}$$

**Dạng 2: Bài tập**

**Câu 1.** Thuốc súng là một trong 4 phát minh vĩ đại của nước Trung Hoa cổ. Thuốc súng chữ Hán có nghĩa là "hoả dược". Thuốc súng đen gồm ba thành phần cơ bản: sulfur, diêm tiêu (potassium nitrate) và than củi (carbon). Hỗn



hợp ba loại này cháy rất mạnh. Chính vì vậy người ta mới gọi hỗn hợp trên là "hoả dược" (thuốc bốc lửa). Quá trình cháy của thuốc súng đen được mô tả bằng phương trình hóa học sau:




a. Cân bằng phương trình trên bằng phương pháp electron.

b. Nếu cho 10 gam thuốc nổ đen (tỷ lệ phần trăm theo khối lượng lần lượt là 75% KNO<sub>3</sub>, 15%C, 10%S) thực hiện phản ứng cháy, hãy tính thể tích khí thu được ở đkc (25°C, 1 bar).

**Hướng dẫn giải:**

**a. Cân bằng phản ứng**



**b.**

**Bước 1. Xử lý số liệu**

$$\begin{cases} m_{\text{KNO}_3} = 75\% \cdot 10 = 7,5 \text{ gam} \Rightarrow n_{\text{KNO}_3} = \frac{7,5}{101} = 0,0743 \\ m_{\text{C}} = 15\% \cdot 10 = 1,5 \text{ gam} \Rightarrow n_{\text{C}} = \frac{1,5}{12} = 0,125 \\ m_{\text{S}} = 10\% \cdot 10 = 1 \text{ gam} \Rightarrow n_{\text{S}} = \frac{1}{32} = 0,3125 \end{cases}$$

Theo đề, ta có khối lượng các chất là




Ta có: 0,0743    0,125    0,3125

**Bước 2. Giải quyết bài toán**

$$\begin{aligned} \text{Lập tỷ lệ: } \frac{0,0743}{2} &< \frac{0,125}{3} < \frac{0,3125}{1} \Rightarrow \text{tính theo KNO}_3 \\ \Rightarrow V_{\text{khí}} &= (0,11145 + 0,03715) \cdot 24,79 = 3,68 \text{ (L)} \end{aligned}$$


**Câu 2.** Sliver (Ag) là một kim loại quý, có thể dùng làm đồ trang sức hoặc làm một số đồ dùng nhà bếp như muỗng bạc, đĩa bạc... Tuy nhiên, sau một thời gian thì các đồ dùng bằng bạc thường bị sẫm đen đó là do trong không khí có chứa một lượng hydrogen sulfide (H<sub>2</sub>S) nên xảy ra phản ứng như sau:



Chính sliver sulfide màu đen làm các đồ dùng bằng bạc bị sẫm.


a. Cân bằng phương trình trên bằng phương pháp electron.

b. Người ta có thể loại bỏ vết sẫm đen bằng cách dùng hydrogen peoxide (oxy già: H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) theo phương trình sau:



Nếu cho lượng Ag<sub>2</sub>S là 2,48 mg thì hãy tính thể tích dung dịch H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 3% (cho D = 1,45 g/cm<sup>3</sup>) đã sử dụng.



**Hướng dẫn giải:****a. Cân bằng phản ứng**

**b. Ta có:**  $n_{\text{Ag}_2\text{S}} = \frac{2,48 \cdot 10^{-3}}{248} = 10^{-5} \text{ mol}$



$$10^{-5} \rightarrow 10^{-5}$$

$$m_{\text{H}_2\text{O}_2} = 10^{-5} \cdot 34 = 3,4 \cdot 10^{-4} \Rightarrow m_{\text{ddH}_2\text{O}_2} = \frac{3,4 \cdot 10^{-4} \cdot 100}{3} = \frac{17}{1500} \Rightarrow V_{\text{ddH}_2\text{O}_2} = \frac{17}{1,45} = 7,82 \cdot 10^{-3} \text{ mL}$$

**Câu 3.** Alfred Bernhard Nobel là một nhà hóa học, một nhà kỹ nghệ, nhà sản xuất vũ khí, người phát minh ra thuốc nổ và một triệu phú người Thụy Điển. Ông dùng toàn bộ tài sản của mình nhằm sáng lập ra Giải thưởng Nobel. Nguyên tố hóa học Nobelium được đặt theo tên của ông.





Trong các phát minh của ông thì thuốc nổ Dynamite nổi bật nhất. Dynamite là một hỗn hợp của chất thấm hút và nitroglycerin ( $\text{C}_3\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_9$ ) được nén vào một ống hình trụ được gói lại bằng giấy, dynamite là một thuốc nổ mạnh, khi nổ nó phân hủy nhanh hơn phản ứng cháy. Phương trình phân hủy của nitroglycerin là:



Cho biết N trong nitroglycerin có số oxy hóa là +5.

a. Hãy cân bằng phản ứng trên.

b. Phân hủy 34,05 gam nitroglycerin thu được sản phẩm. Cho toàn bộ sản phẩm lội qua dung dịch nước vôi trong dư thì thu được m gam kết tủa trắng. Hãy xác định giá trị m.

**Hướng dẫn giải:****a. Cân bằng phản ứng**


$$n_{C_{11}H_{15}N_3O_9} = \frac{34,05}{227} = 0,15 \text{ mol} \Rightarrow \begin{cases} 4C_{11}H_{15}N_3O_9 \longrightarrow 12CO_2 + 10H_2O + 6N_2 + O_2 \\ 0,15 \text{ mol} \longrightarrow 0,45 \text{ mol} \end{cases}$$

**b. Ta có:**

**Theo đề dẫn qua nước vôi trong nên**  $n_{CaCO_3} = n_{CO_2} = 0,45 \text{ mol} \Rightarrow m_{CaCO_3} = 0,45 \cdot 100 = 45 \text{ gam}$

**Câu 4.** Copper nitrate ( $Cu(NO_3)_2$ ) được sử dụng làm phụ gia trong gốm sứ, trên bề mặt kim loại, trong một số pháo hoa và cả trong ngành dệt như một chất gắn màu.

Copper nitrate là muối dễ bị phân hủy theo phương trình như sau:



Nếu nung 15,04 gam  $Cu(NO_3)_2$  thì sau một thời gian phản ứng sẽ thu được 8,56 gam chất rắn.

a. Lập phương trình hóa học theo phương pháp electron.

b. Tính phần trăm khối lượng  $Cu(NO_3)_2$  bị phân hủy


c. Tính thể tích hỗn hợp khí thu được (đkc)




**Hướng dẫn giải:**

**a.**


**Bước 1. Xác định số oxy hóa**



**Bước 2. Xác định chất khử, chất oxy hóa và bán phản ứng**




**Sự oxy hóa :**




**Sự khử :**

**Bước 3. Chọn hệ số**



**Bước 4. Đưa hệ số vào và kiểm tra**




**b.**

**Bước 1. Tính số mol các chất (có thể tính ra) theo đề cho**

$$n_{Cu(NO_3)_2 \text{ bd}} = \frac{\overbrace{m}^{15,04}}{\underbrace{M}_{188}} \Rightarrow n_{Cu(NO_3)_2 \text{ bd}} = 0,08 \text{ mol}$$

**Bài toán yêu cầu tính**  $Cu(NO_3)_2$  **bị phân hủy**  $\Rightarrow Cu(NO_3)_2$  **sẽ còn dư**  $\Rightarrow$  **không đưa số mol của**  $Cu(NO_3)_2$  **vào phương trình**

**Đặt số mol  $O_2$  là x mol (có thể đặt  $NO_2$ ,  $Cu(NO_3)_2$  tham gia)**



$$15,04 = 8,56 + \underbrace{m_{NO_2}}_{46 \cdot 4x} + \underbrace{m_{O_2}}_{32x} \Rightarrow 216x + 8,56 = 15,04 \Rightarrow x = 0,03 \text{ mol}$$

**BTKL:**


$$n_{Cu(NO_3)_2 \text{ tham gia}} = 2 \cdot \underbrace{x}_{0,03} = 0,06 \text{ mol} \Rightarrow m_{Cu(NO_3)_2 \text{ tham gia}} = 0,06 \cdot 188 = 11,28 \text{ gam}$$

**Ta có:**

**c. Hỗn hợp khí thu được gồm**

$$\begin{cases} \text{NO}_2 & 4x = 4,0,03 = 0,12 \text{ mol} \\ \text{O}_2 & 0,03 \text{ mol} \end{cases} \Rightarrow V_{\text{hh}} = (0,12 + 0,03) \cdot 24,79 = 3,7185 (\text{L})$$

**Câu 5.** Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt nồng độ cồn có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. Theo luật định, hàm lượng ethanol trong máu người lái xe không vượt quá 0,02% theo khối lượng. Để xác định hàm lượng ethanol trong hơi thở bằng máy đo hơi thở (có chứa hỗn hợp  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  và  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) theo phương trình như sau:



a. Hãy cân bằng phản ứng trên.

b. Người ta có thể xác định hàm lượng ethanol bằng xét nghiệm máu. Nếu khi chuẩn độ 25 gam huyết tương máu của một lái xe cần dùng 20 mL dung dịch  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  0,01M. Người lái xe đó có vi phạm luật hay không? Tại sao?

**Hướng dẫn giải:**

**a. Cân bằng phản ứng:**  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + 4\text{H}_2\text{SO}_4 + 3\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \longrightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{CH}_3\text{COOH} + 7\text{H}_2\text{O}$

**b. Theo đề:**  $n_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} = 0,01 \cdot 0,02 = 2 \cdot 10^{-4}$  **thay vào phương trình**




$2 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \rightarrow 6 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$

$$m_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}} = 6 \cdot 10^{-4} \cdot 46 = 0,0276 \text{ gam} \Rightarrow C\% = \frac{0,0276}{25} \cdot 100 = 0,11\%$$

**Ta có:**

**Như vậy thì nồng độ của ethanol của người lái xe lớn hơn quy định (0,02%) nên người lái xe đó vi phạm nghị định 100**

**Câu 6.** Ion  $\text{Ca}^{2+}$  cần thiết cho máu của người hoạt động bình thường. Nồng độ ion calcium không bình thường là dấu hiệu của bệnh. Để xác định nồng độ ion calcium, người ta lấy mẫu máu, sau đó kết tủa ion calcium dưới dạng calcium oxalate ( $\text{CaC}_2\text{O}_4$ ) rồi cho calcium oxalate tác dụng với dung dịch potassium permanganate trong môi trường acid theo phản ứng sau:



a. Cân bằng phản ứng trên.

b. Giả sử calcium oxalate kết tủa từ 1 mL máu một người tác dụng vừa hết với 2,05 mL dung dịch  $\text{KMnO}_4$   $4,88 \cdot 10^{-4}$  M. Xác định nồng độ ion calcium trong máu người đó bằng đơn vị mg  $\text{Ca}^{2+}/100$  mL máu.

**Hướng dẫn giải:**

**a. Cân bằng phản ứng:**

$$2\text{KMnO}_4 + 5\text{CaC}_2\text{O}_4 + 8\text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + 5\text{CaSO}_4 + 2\text{MnSO}_4 + 10\text{CO}_2 + 8\text{H}_2\text{O}$$

**b. Theo đề:**  $n_{\text{KMnO}_4} = 4,88 \cdot 10^{-4} \cdot 2,05 = 10^{-6} \text{ mol}$




$10^{-6} \text{ mol} \rightarrow 2,5 \cdot 10^{-6} \text{ mol}$

**Số mol ion  $\text{Ca}^{2+}$  trong  $\text{CaC}_2\text{O}_4$  là :  $2,5 \cdot 10^{-6} \text{ mol}$**

**$\Rightarrow$  trong 100 mL máu thì nồng độ ion  $\text{Ca}^{2+}$  :  $2,5 \cdot 10^{-6} \cdot 40 \cdot 10^3 \cdot 100 = 10 \text{ mg / mL}$**

**Câu 7:** Quặng pyrite có thành phần chính là  $\text{FeS}_2$  là nguyên liệu được sử dụng để sản xuất sulfuric acid. Xét phản ứng cháy:





a. Lập phương trình hóa học của phản ứng theo phương pháp thăng bằng electron.




b, Tính thể tích không khí (biết oxygen chiếm 21% về thể tích ở điều kiện chuẩn) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 3,6 tấn FeS<sub>2</sub> trong quặng pyrite.

Hình 4.11 Quặng pyrite

**Hướng dẫn giải:**



$$b, \quad n_{\text{FeS}_2} = \frac{3,6 \cdot 10^6}{120} = 3 \cdot 10^4 \text{ mol}$$




$$3 \cdot 10^4 \rightarrow 82500 \text{ mol}$$

$$V_{\text{O}_2} = 24,79 \cdot 82500 = 2045175 \text{ L}$$

$$V_{\text{KK}} = 2045175 \cdot \frac{100}{21} = 9738928 \text{ L}$$

**Câu 8.** Tình trạng ô nhiễm nước thải chứa nitrogen vào các nguồn nước đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Các học sinh thuộc đội bảo vệ môi trường của một trường học cho rằng có thể dùng aluminium để khử ion NO<sub>3</sub><sup>-</sup> trong nước. Trong quá trình này, ion NO<sub>3</sub><sup>-</sup> được khử thành N<sub>2</sub> theo phương trình:





**. Ô nhiễm nước thải do chứa nhiều ion nitrate tạo ra từ quá trình sử dụng lượng dư phân đạm khi bón phân bón hoá học**

a, Cân bằng phương trình ion thu gọn xảy ra trong quy trình trên bằng phương pháp thăng bằng electron.

b, Xác định chất nhường electron trong phản ứng trên?

c, Để loại bỏ lượng ion NO<sub>3</sub><sup>-</sup> trong 100 m<sup>3</sup> nước thải thì khối lượng Aluminium (gam) tối thiểu cần sử dụng là bao nhiêu? (Giả sử rằng tất cả nitrogen trong nước đều ở dạng NO<sub>3</sub><sup>-</sup>; 1m<sup>3</sup> nước thải có chứa 0,3 mol NO<sub>3</sub><sup>-</sup>).

**Hướng dẫn giải:**



Chất nhường electron: Al.



$$0,5 \text{ mol} \leftarrow 0,3 \text{ mol}$$

$$m_{Al} = 0,5.27 = 13,5 \text{ gam.}$$

Cứ  $1m^3$  nước thải thì cần 13,5 gam Al.

$100 m^3$  nước thải cần 1350 gam Al.

**Câu 9.** Một số loại máy đo nồng độ cồn trong hơi thở dựa trên phản ứng của ethanol (cồn) ( $C_2H_5OH$ ) có trong hơi thở với hợp chất potassium dichromate trong môi trường sulfuric acid loãng. Phản ứng (chưa được cân bằng) như sau:



Dung dịch chứa ion  $Cr_2O_7^{2-}$  ban đầu có màu da cam, khi xảy ra phản ứng (1) dưới tác dụng của chất xúc tác ion  $Ag^+$  tạo thành sản phẩm là dung dịch chứa ion  $Cr^{3+}$  có màu xanh lá cây trong khoảng chưa đến 1,0 phút. Dựa vào sự thay đổi màu sắc này có thể xác định người tham gia giao thông có sử dụng thức uống có cồn hay không. Bảng sau (trích từ nghị định 46/2016/NĐ-CP) đưa ra mức độ phạt người tham gia giao thông có sử dụng hàm lượng cồn.



**Hình 4.14. Thổi nồng độ cồn.**

| Mức độ vi phạm | $\leq 0,25$ mg cồn / 1 lít khí thở | $0,25 - 0,4$ mg cồn / 1 lít khí thở | $> 0,4$ mg cồn / 1 lít khí thở   |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Xe máy         | 2.000.000 - 3.000.000 triệu đồng   | 4.000.000 - 5.000.000 triệu đồng    | 6.000.000 - 8.000.000 triệu đồng |

a, Cho Cr (Z= 24), O (Z=8). Tính tổng số electron có trong ion  $Cr_2O_7^{2-}$ ?

b, Cân bằng phản ứng (1) theo phương pháp thăng bằng electron, xác định chất oxi hóa, chất khử.


c, Một mẫu hơi thở của người bị nghi vấn có sử dụng cồn khi tham gia giao thông có thể tích 52,5 ml được thổi vào thiết bị Breathalyzer chứa 2,0 ml dung dịch  $K_2Cr_2O_7$  nồng độ 0,056 mg/ml trong môi trường acid  $H_2SO_4$  50% và nồng độ ion  $Ag^+$  ổn định 0,25 mg/ml. Biết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn và toàn bộ dung dịch màu da cam chuyển hoàn toàn thành màu xanh lá cây. Hãy tính toán xem người này có vi phạm pháp luật không? Nếu có, thì mức đóng phạt là bao nhiêu?

### Hướng dẫn giải:

a. Tổng số electron trong ion  $Cr_2O_7^{2-}$  :  $2.24 + 7.8 + 2 = 106$



b. Chất oxi hóa:  $K_2Cr_2O_7$  ; Chất khử:  $C_2H_5OH$




$$c. n_{K_2Cr_2O_7} = 2.(0,056.10^{-3}/294) = 3,81.10^{-7} \text{ mol.}$$

$$n_{C_2H_6O} = 3/2 n_{K_2Cr_2O_7} = 5,71.10^{-7} \text{ mol.}$$

$$m_{C_2H_6O} = 2,63.10^{-5} \text{ gam / 52,5 ml hơi thở.}$$

$$A. \text{ Trong } 1000 \text{ ml hơi thở có: } (1000.2,63.10^{-3}/52,5) = 5,007.10^{-4} \text{ gam } C_2H_5OH$$





**Hướng dẫn giải:**

c. khử      c. oxi hóa

**Câu 6:** Khi cho  $\text{Cu}_2\text{S}$  tác dụng với  $\text{HNO}_3$  thu được hỗn hợp sản phẩm gồm:  $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{NO}$  và  $\text{H}_2\text{O}$ . Số electron mà 1 mol  $\text{Cu}_2\text{S}$  đã nhường là



- A. 2.                                      B. 6.                                      C. 9.                                      **D. 10.**

**Hướng dẫn giải:**

**Câu 7:** Cho sơ đồ phản ứng:  $\text{KCl} + \text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Cl}_2 + \text{MnSO}_4 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$


Hệ số cân bằng của các chất tham gia phản ứng lần lượt là

- A. 10, 2, 8.**                                      B. 3, 7, 5.                                      C. 10, 2, 6.                                      D. 2, 5, 8.

**Hướng dẫn giải:**

**Câu 8:** Trong phương trình phản ứng:  $\text{KMnO}_4 + \text{K}_2\text{SO}_3 + \text{KHSO}_4 \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{MnSO}_4 + \text{K}_2\text{SO}_4$ . Tổng hệ số tối giản các chất tham gia phản ứng là



- A. 15.                                      B. 18.                                      C. 10.                                      **D. 13.**

**Hướng dẫn giải:**

Tổng hệ số tối giản các chất tham gia phản ứng =  $2 + 5 + 6 = 13$ .

**Câu 9:** Cho sơ đồ phản ứng:  $\text{FeS}_2 + \text{HNO}_3 \xrightarrow{t^0} \text{Fe}(\text{NO}_3)_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$ . Sau khi cân bằng, tổng hệ số cân bằng (tối giản) của phản ứng là


- A. 21.                                      **B. 19.**                                      C. 23.                                      D. 25.

**Hướng dẫn giải:**

Tổng hệ số tối giản =  $1 + 8 + 2 + 2 + 5 + 1 = 19$ .

**Câu 10:** Cho sơ đồ phản ứng:  $\text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Fe}(\text{NO}_3)_3 + \text{N}_x\text{O}_y + \text{H}_2\text{O}$ . Sau khi cân bằng, hệ số của phân tử  $\text{HNO}_3$  là


- A.  $23x-9y$ .                                      B.  $23x-8y$ .                                      **C.  $46x-18y$ .**                                      D.  $13x-9y$ .

**Hướng dẫn giải:**



**Câu 11:** Hệ số cân bằng của  $\text{Cu}_2\text{S}$  và  $\text{HNO}_3$  trong phản ứng:




- A. 3 và 22.**                                      B. 3 và 18.                                      C. 3 và 10.                                      D. 3 và 12.

**Hướng dẫn giải:**


**Câu 12:** Cho các bán phản ứng



Sơ đồ nào sau đây biểu diễn đúng tỉ lệ nguyên tử giản các sản phẩm của phản ứng (bỏ qua ion  $H^+$  và  $H_2O$ )?




### Hướng dẫn giải



$\Rightarrow$  Tỉ lệ giữa  $Cl_2$  và  $Mn^{2+} = 5 : 2 \Rightarrow$  Đáp án B.

**Câu 13:** Nitrogen dioxide ( $NO_2$ ) là nguyên liệu điều chế nhiều chất vô cơ. Hình 4.28. Biểu diễn quá trình điều chế một số chất vô cơ từ Nitrogen dioxide.



Hình 4.28. Quá trình điều chế một số chất vô cơ từ Nitrogen dioxide

Cho các phát biểu sau:


- (a) Trong phản ứng (1),  $H_2$  là chất khử.
- (b) Trong phản ứng (2),  $NO_2$  bị oxi hóa.
- (c) Trong quá trình trên, hợp chất chứa nguyên tử N có số oxi hóa cao nhất là  $HNO_3$ .
- (d) Trong phản ứng (3),  $H_2O$  là chất oxi hóa.

Số phát biểu đúng với sơ đồ trên là

- A. 1.                      B. 2.                      C. 3.                      D. 4.


### Hướng dẫn giải

Phản ứng xảy ra:




Oxi hóa khử

$\Rightarrow$  Phát biểu (a) đúng



N không thay đổi số oxi hóa  $\Rightarrow$  phát biểu (=b) sai.



$\Rightarrow$  Phát biểu (c) đúng, phát biểu (d) sai ( $NO_2$  vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa)

**Câu 14:** Phản ứng oxi hóa khử giữa hợp chất của kim loại M và oxalic acid ( $H_2C_2O_4$ ) trong môi trường acid xảy ra như sau:



(a-d là các số nguyên tối giản nhất)




Biết rằng, khi 1 mol  $MO_4^-$  phản ứng thì số mol  $H_2O$  sinh ra là 2n mol. Tổng (a + b) có giá trị là

A. 11.

B. 12.

C. 13.

D. 14.

**Hướng dẫn giải**

Theo bài ra: 1 mol  $\text{MnO}_4^- \rightarrow 2n$  mol  $\text{H}_2\text{O}$

Theo pt (\*) 2 mol  $\text{MnO}_4^- \rightarrow 8$  mol  $\text{H}_2\text{O}$

$$\Rightarrow 2.2n = 8 \Leftrightarrow n = 2$$

Vậy tổng a + b = (7-n) + (2+2n) = (7-2) + (2+2.2) = 11  $\Rightarrow$  **Đáp án A.**

**Câu 15:** Sodium percarbonate ( $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}_2$ ) có tính oxi hóa nên được dùng làm chất tẩy trắng đa năng, thân thiện với môi trường như bột giặt đồ. Sodium percarbonate có tính chất kép của  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  và  $\text{H}_2\text{O}_2$ . Trong phản ứng với chất nào dưới đây, sodium percarbonate chỉ bị khử?

A. Dung dịch  $\text{Na}_2\text{SO}_3$ .B. Dung dịch  $\text{KMnO}_4$ .


C. Clohydric acid loãng.

D.  $\text{MnO}_2$ .**Hướng dẫn giải**

-  $\text{KMnO}_4$  và  $\text{MnO}_2$  đều là chất oxi hóa  $\Rightarrow$  oxi hóa Sodium percarbonate

-  $\text{HCl}$  là axit, phản ứng với muối carbonate giải phóng khí  $\text{CO}_2$ , đây là phản ứng trao đổi.

$\Rightarrow$  Chỉ có đáp án A phù hợp



Khử                  oxi hóa

**Câu 16:** Cho phương trình hoá học:  $\text{Al} + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Al}(\text{NO}_3)_3 + \text{NO} + \text{N}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$



(Biết tỉ lệ thể tích  $\text{NO} : \text{N}_2\text{O} = 3 : 1$ ). Sau khi cân bằng phương trình hoá học trên với hệ số các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của  $\text{HNO}_3$  là bao nhiêu ?

A. 64.

B. 66.

C. 60.

D. 62.

**Hướng dẫn giải**

**Câu 17:** Cho phản ứng sau:  $\text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Fe}(\text{NO}_3)_3 + \text{NO} + \text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O}$



Nếu tỉ lệ số mol giữa  $\text{NO}$  và  $\text{NO}_2$  là 1 : 2 thì hệ số cân bằng của  $\text{HNO}_3$  trong phương trình hoá học trên là bao nhiêu ?

A. 30

B. 48

C. 38

D. 66

**Hướng dẫn giải**

**Câu 18:** Cho phương trình phản ứng:  $\text{Mg} + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Mg}(\text{NO}_3)_2 + \text{NO} + \text{N}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$  Nếu tỉ khối của hỗn hợp  $\text{NO}$  và  $\text{N}_2\text{O}$  đối với  $\text{H}_2$  là 19,2. Tỉ lệ số phân tử bị khử và bị oxi hóa là

A. 8: 15

B. 11: 28

C. 38: 15



D. 6: 11

**Hướng dẫn giải**

$$\overline{M} = 19,2 \cdot 2 = 38,4$$



$$\Rightarrow \frac{\text{NO}}{\text{N}_2\text{O}} = \frac{5,6}{8,4} = \frac{2}{3}$$



$$\Rightarrow \frac{\text{HNO}_3}{\text{Mg}} = \frac{38}{15}$$

**Câu 19:** Cho phương trình hóa học:  $\text{Mg} + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Mg}(\text{NO}_3)_2 + \text{NO} + \text{N}_2\text{O} + \text{N}_2 + \text{H}_2\text{O}$  (biết tỉ lệ thể tích của NO: N<sub>2</sub>O: N<sub>2</sub> = 27: 2: 11). Sau khi cân bằng hóa học trên với các hệ số là nguyên tố tối giản thì hệ số của H<sub>2</sub>O là


A. 207

B. 520

C. 260

D. 53


**Hướng dẫn giải**



**Câu 20:** Xét phản ứng:  $\text{Fe}_x\text{O}_y + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ . Hệ số cân bằng của H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> là

A.  $3x - y$ .B.  $3x - 2y$ .C.  $6x - y$ .D.  $6x - 2y$ .

**Hướng dẫn giải**






**Câu 21:** Cho phương trình hoá học:  $\text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Fe}(\text{NO}_3)_3 + \text{N}_x\text{O}_y + \text{H}_2\text{O}$

Sau khi cân bằng phương trình hoá học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO<sub>3</sub> là

A.  $46x - 18y$ B.  $13x - 9y$ .C.  $45x - 18y$ .D.  $23x - 9y$ .

**Hướng dẫn giải**



## Dạng 2: Bài tập

**Câu 1.** Hòa tan hoàn toàn 43,74 gam kim loại M trong dung dịch HNO<sub>3</sub> loãng, nóng thu được 3,34665 lít khí NO (đkc). Cho biết:  $\text{M} + \text{HNO}_3 \longrightarrow \text{M}(\text{NO}_3)_n + \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$ . Kim loại M là

A. Mg


B. Al

C. Zn.

D. Ag.

**Hướng dẫn giải**

$$n_{\text{NO}} = \frac{3,34665}{24,79} = 0,135 \text{ mol}$$

**Theo đề:**

**Ta có:**  $x \rightarrow nx \text{ mol} \quad 0,405 \leftarrow 0,135 \text{ mol}$

$$n.x = 0,405 \Rightarrow x = \frac{0,405}{n} \text{ mol} \Rightarrow M_M = \frac{43,74}{\frac{0,405}{n}} = 108n \Rightarrow \begin{cases} n = 1 \\ M_M = 108 \end{cases} \Rightarrow$$



**BT electron:****M là Ag**

**Câu 2.** Hoà tan hoàn toàn 19,2 gam một kim loại M trong dung dịch  $\text{HNO}_3$  ta thu được 4,958 lít NO (đkc).

Kim loại M là (cho biết phương trình phản ứng:  $\text{M} + \text{HNO}_3 \longrightarrow \text{M}(\text{NO}_3)_n + \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$ )

**A. Zn = 65.****B. Fe = 56.****C. Mg = 24.****D. Cu = 64.****Hướng dẫn giải**

$$n_{\text{NO}} = \frac{4,958}{24,79} = 0,2 \text{ mol}$$



**Theo đề:**

**Ta có:**  $x \rightarrow nx \text{ mol} \quad 0,6 \leftarrow 0,2 \text{ mol}$

$$n.x = 0,6 \Rightarrow x = \frac{0,6}{n} \text{ mol} \Rightarrow M_M = \frac{19,2}{\frac{0,6}{n}} = 32n \Rightarrow \begin{cases} n = 2 \\ M_M = 64 \end{cases} \Rightarrow$$

**BT electron:****M là Cu**



**Câu 3.** Hòa tan hoàn toàn 1,35 gam một kim loại R bằng dung dịch  $\text{HNO}_3$  loãng dư thu được 2,479 lít hỗn hợp khí gồm NO và  $\text{NO}_2$  (đktc) có tỉ khối so với  $\text{H}_2$  bằng 21. Kim loại R là (cho biết phương trình phản ứng:

**A. Al****B. Cu****C. Fe****D. Cr****Hướng dẫn giải**

$$\begin{cases} n_{\text{khí}} = \frac{2,479}{24,79} = 0,1 \text{ mol} \\ d_{\text{khí H}_2} = 21 \Leftrightarrow \frac{\overline{M}_{\text{khí}}}{M_{\text{H}_2}} = 21 \Rightarrow \overline{M}_{\text{khí}} = 42 \end{cases}$$

**Theo đề:**

$$\begin{cases} \text{NO} & x \text{ mol} \\ \text{NO}_2 & y \text{ mol} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + y = 0,1 \\ (30 - 42)x + (46 - 42)y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,025 \\ y = 0,075 \end{cases}$$

**Ta có:**

$x \rightarrow nx \text{ mol}$

$0,075 \leftarrow 0,025 \text{ mol}$



$0,075 \leftarrow 0,075 \text{ mol}$

**Ta có:**

$$n.x = 0,075 + 0,075 \Rightarrow x = \frac{0,15}{n} \text{ mol} \Rightarrow M_M = \frac{1,35}{\frac{0,15}{n}} = 9n \Rightarrow \begin{cases} n = 3 \\ M_M = 27 \end{cases} \Rightarrow$$

**BT electron:****M là Al**





**Câu 4.** Nung x gam Fe trong không khí, thu được 104,8 gam hh rắn A gồm: Fe, FeO,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ . Hoà tan A trong dd  $\text{HNO}_3$  dư thu được dd B và 12,096 lít hh hợp khí NO và  $\text{NO}_2$  (đktc) có tỉ khối đối với He là 10,167. Khối lượng x là:

A. 56 gam



B. 68,2 gam

C. 84 gam

D. 78,4 gam

**Hướng dẫn giải:**

**Câu 5.** Theo nghiên cứu, khi hô hấp, thể tích khí carbonic một người thải ra xấp xỉ thể tích khí oxygen hít vào. Vậy cần trộn  $\text{Na}_2\text{O}_2$  và  $\text{KO}_2$  theo tỉ lệ số mol như thế nào để thể tích khí carbonic hấp thụ bằng thể tích khí oxygen sinh ra? Biết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra như sau:





A. 2 : 1.

B. 1 : 2.

C. 1 : 3.

D. 3 : 1.

**Hướng dẫn giải:**

Để thể tích khí carbonic hấp thụ bằng thể tích khí oxygen sinh ra ta có

$$0,5x + 0,75y = x + 0,5y$$

$$\Rightarrow x : y = 1 : 2$$

**Câu 6.** Để xác định hàm lượng iron (II) sulfate người ta sử dụng phản ứng oxi hóa khử như sau:  $\text{FeSO}_4 + \text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{MnSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ . Thể tích (mL) dung dịch  $\text{KMnO}_4$  0,03M để phản ứng vừa đủ với 20 mL dung dịch  $\text{FeSO}_4$  0,150M có giá trị thỏa mãn là

A. 20.


B. 10.

C. 40.

D. 60.

**Hướng dẫn giải:**

$$n_{\text{FeSO}_4} = 3 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$



$$3.10^{-3} \text{ mol} \quad 6.10^{-4} \text{ mol}$$

$$V_{\text{KMnO}_4} = 0,02 \text{ L} = 20 \text{ mL}$$

**Câu 7.** Một người khỏe mạnh nặng 50 kg có chứa 2 gam iron (sắt), tồn tại ở dạng  $\text{Fe}^{2+}$  và  $\text{Fe}^{3+}$ . Ion  $\text{Fe}^{2+}$  dễ hấp thu nên khi bổ sung iron cho bệnh nhân thiếu máu cần bổ sung các loại muối iron (II) như iron (II) sulfate, iron (II) fumarate, ... Uống vitamin C có thể chuyển hóa  $\text{Fe}^{3+}$  trong thực phẩm thành  $\text{Fe}^{2+}$ , có lợi cho quá trình hấp thu iron của cơ thể.

a, Trong quá trình chuyển hóa  $\text{Fe}^{3+}$  thành  $\text{Fe}^{2+}$ , ion  $\text{Fe}^{3+}$  đóng vai trò là chất \_\_\_\_\_(1)

b, "*Uống vitamin C có thể chuyển hóa  $\text{Fe}^{3+}$  trong thực phẩm thành  $\text{Fe}^{2+}$* " - điều này có nghĩa vitamin C hoạt động như một chất \_\_\_\_\_ (2) trong phản ứng với  $\text{Fe}^{3+}$ .

c, Một loại bột yến mạch bán trên thị trường có chứa lượng nhỏ nano iron, và những bột sắt này bị hòa tan dưới tác dụng của acid trong dịch vị dạ dày. Phương trình hóa học của phản ứng là \_\_\_\_\_(3).

d, Công thức cho một bữa ăn tối mà nhà ăn dành cho học sinh là: bánh mì, sữa, trứng, cơm, ớt, đậu đen ngâm giấm. Trong số thực phẩm đó thực phẩm giàu vitamin C là \_\_\_\_\_(4), và chất bảo quản thông thường sử dụng trong giấm là \_\_\_\_\_(5). Để chứng minh trong sữa không có nước cơm được thêm vào, học sinh A đã lấy một lượng nhỏ sữa và thêm dung dịch \_\_\_\_\_(6) vào, nếu thấy hiện tượng \_\_\_\_\_(7) xuất hiện chứng tỏ sữa có thêm nước cơm.

e, Học sinh A, đã ăn 2 gam muối iodine ( $\text{KIO}_3$ ) trong bữa tối, tính khối lượng iodine (mg) mà học sinh A đã bổ sung trong bữa ăn tối. Giả sử trong 1 kg muối iodine chứa 40 mg  $\text{KIO}_3$ .

#### Hướng dẫn giải

a, (1) oxi hóa

b, (2) khử

c, (3)  $\text{Fe} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2$

d, (4) ớt; (5) benzoic acid; (6) iodine; (7) màu xanh tím

e, Khối lượng  $\text{KIO}_3$  trong 2 gam muối =  $2 \times \frac{40}{1000} = 0,08 \text{ mg}$

Khối lượng iodine trong 2 gam muối =  $\frac{0,08}{214} \times 127 = 0,047 \text{ mg}$

$m_1 = \frac{2}{184} \times 127 = 1,38 \text{ gam}$

**Câu 8.** Một nhà máy nước sử dụng 5 mg  $\text{Cl}_2$  để khử trùng 1 lít nước sinh hoạt. Khối lượng  $\text{Cl}_2$  (kg) nhà máy cần dùng để khử trùng 40 000 m<sup>3</sup> nước sinh hoạt là

**A. 200kg.**

**B. 300kg.**

**C. 400kg.**

**D. 500kg.**

#### Hướng dẫn giải:

Đổi 40 000 m<sup>3</sup> = 4.10<sup>7</sup> dm<sup>3</sup> = 4.10<sup>7</sup> L

5 mg  $\text{Cl}_2$  để khử trùng 1 L nước


x mg  $\text{Cl}_2$  để khử trùng 4.10<sup>7</sup> L nước

=> x = 5 x 4.10<sup>7</sup> = 2.10<sup>8</sup> (mg) = 200 kg


Vậy cần 200 kg  $\text{Cl}_2$  để khử trùng 40 000 m<sup>3</sup> nước sinh hoạt.

**Câu 9.** Việt Nam là nước xuất khẩu thủy sản thứ 3 trên thế giới, sau Na Uy và Trung Quốc ( Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, tháng 12/2022) xuất khẩu tới hơn 170 nước trên thế giới, trong có thị trường lớn như Mỹ và Châu Âu, được xem là thị trường khó tính, nên tiêu chuẩn chất lượng được kiểm soát chặt chẽ trước khi nhập nguyên liệu và sau khi thành phẩm, đóng gói. Trong danh mục tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm có chỉ tiêu về dư lượng chlorile không vượt quá 1mg/l ( chlorile sử dụng trong quá trình sơ chế nguyên liệu để diệt vi sinh vật).

Phương pháp chuẩn độ iodine – thiosulfate được dùng để xác định dư lượng chlorile trong thực phẩm theo phương trình:





$\text{I}_2$  được nhận biết bằng hồ tinh bột.  $\text{I}_2$  bị khử bởi dung dịch chuẩn sodiumthiosulfate theo phương trình



Dựa vào thể tích dung dịch  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  phản ứng, tính được dư lượng chlorile trong dung dịch mẫu. Tiến hành chuẩn độ 100 ml dung dịch dung dịch mẫu bằng dung dịch  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  0,01M, thể tích  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  dùng hết 0,28 ml (dung cụ chứa dung dịch chuẩn  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  là loại microburet 1ml, vạch chia 0,01ml). Mẫu sản phẩm trên đủ tiêu chuẩn về dư lượng chlorile cho phép để xuất khẩu không? Giải thích.

### Hướng dẫn giải

Phương trình hoá học của phản ứng:



Tính theo đơn vị ml và mg.

Số mol  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  phản ứng:  $n = 0,01 \times 0,28 = 2,8 \times 10^{-3} (\text{mol})$

Theo tỉ lệ các chất trong phương trình, số mol  $\text{Cl}_2$  bằng  $\frac{1}{2}$  số mol  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ :

$$n = 1,4 \times 10^{-3} (\text{mol})$$


Khối lượng  $\text{Cl}_2$  có trong 100 ml dung dịch mẫu cần kiểm tra:

$$m = 1,4 \times 10^{-3} \times 71 = 0,0994 (\text{mg})$$

Trong 1 lít dung dịch mẫu, khối lượng  $\text{Cl}_2$  là:  $0,0994 \times 10 = 0,944 (\text{mg})$ .

So sánh với tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm về dư lượng chlorine không vượt qua 1mg/L, mẫu sản phẩm trên đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.




**Câu 10.** Ion  $\text{Ca}^{2+}$  cần thiết cho máu của người hoạt động bình thường. Nồng độ ion calcium không bình thường là dấu hiệu của bệnh. Để xác định nồng độ ion calcium, người ta lấy mẫu máu, sau đó kết tủa ion calcium dưới dạng calcium oxalate ( $\text{CaC}_2\text{O}_4$ ) rồi cho calcium oxalate tác dụng với dung dịch potassium permanganate trong môi trường axit theo phản ứng sau:



- Cân bằng phương trình phản ứng.
- Giả sử calcium oxalate kết tủa từ 1 mL máu một người tác dụng vừa hết với 2,05 mL dung dịch potassium permanganate ( $\text{KMnO}_4$ )  $4,88 \cdot 10^{-4} \text{ M}$ . Xác định nồng độ ion calcium trong máu người đó bằng đơn vị  $\text{Ca}^{2+}/100\text{mL}$  máu.

### Hướng dẫn giải

- Cân bằng PTPU



- Số mol  $\text{KMnO}_4$  cần dùng để phản ứng hết với calcium oxalate kết tủa từ 1 mL máu là  $10^{-6} \text{ mol}$ .

Từ PTPU ta có  $n_{\text{CaSO}_4} = 2,5 \times 10^{-6} \text{ mol}$

$\Rightarrow$  Khối lượng ion calcium (mg) trong 100 mL máu là:

- $2,5 \times 10^{-6} \times 40 \times 10^3 \times 100 = 10 \text{ mg}/100\text{mL}$ .