

Câu 1 (1,5 điểm)

$$A = 1 + \sqrt{4}$$

a) Tính giá trị biểu thức .

$$B = \left(\frac{1}{\sqrt{x}+1} + \frac{1}{\sqrt{x}-1} \right) \cdot \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}} \quad x > 0; x \neq 1$$

b) Rút gọn biểu thức

với

 a

$$y = ax^2 \quad (a \neq 0)$$

$$M(1;1)$$

c) Tìm để đồ thị hàm số

đi qua điểm .

Câu 2 (1,5 điểm)

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$$

a) Giải hệ phương trình

$$x^2 + 2x + m - 2 = 0$$

 m

b) Cho phương trình

, với

là tham số. Tìm

 m

biết phương trình đã cho có nghiệm

$$x = 0$$


$$2x + 3 > 5$$

c) Giải bất phương trình .

Câu 3 (1,0 điểm).

Bạn Lan đi xe đạp từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc không đổi. Biết quãng đường AB dài 20 km. Khi đi từ B trở về A , bạn Lan tăng vận tốc thêm 2 km/h , vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. Tính vận tốc của Lan khi đi xe đạp từ A đến B .

Câu 4 (1,0 điểm). Một cầu trượt trong công viên có chiều dài $BC = 4 \text{ m}$ và độ dốc là $\angle ACB = 30^\circ$ (như hình vẽ, $\angle BAC = 90^\circ$). Tính độ cao BA của cầu trượt.



Câu 5 (1,5 điểm). Cho nửa đường tròn tâm O , đường kính AB . Trên nửa đường tròn lấy điểm C sao cho $CA < CB$, kẻ CD vuông góc với AB , D thuộc AB . Gọi F là một điểm trên đoạn CD (F khác C và D), tia AF cắt nửa đường tròn (O) tại E .


a) Chứng minh tứ giác DFEB là tứ giác nội tiếp.

b) Gọi M, N lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ O xuống AE và BF ; H là giao điểm của DF và BE ; I là trung điểm của HF . Chứng minh OI đi qua trung điểm của MN .

Câu 6 (1,0 điểm). Cho một chiếc cốc hình trụ có bán kính đáy $r = 5 \text{ cm}$ và chiều cao $h = 10 \text{ cm}$. $\pi = 3,14$

a) Tính diện tích xung quanh của chiếc cốc (lấy $\pi = 3,14$).

b) Ban đầu chiếc cốc chứa nước, chiều cao mực nước là $h_1 = 6 \text{ cm}$. Người ta thả một viên bi bằng sắt, đặc ruột, hình cầu có bán kính $R = 3 \text{ cm}$ vào chiếc cốc. Khi đó chiều cao của mực nước trong cốc là h_2 . Tính h_2 .



Câu 7 (1,5 điểm)

a) Kết quả kiểm tra cuối học kì II môn Toán của 38 học sinh lớp 9A của một trường trung học cơ sở được cho bởi bảng sau:

Điểm	$[0; 2)$	$[2; 4)$	$[4; 6)$	$[6; 8)$	$[8; 10)$
Số học sinh	2	5	11	12	8

Có bao nhiêu học sinh đạt điểm từ 4 đến dưới 6?

b) Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên từ 1 đến 8. Mô tả không gian mẫu và tính xác suất của


biến cố A : "Số được chọn là số chẵn".

Câu 8 (1,0 điểm). Cho các số dương x, y thỏa mãn $x + y + xy = 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x^2 + y^2$.


HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI VÀO 10 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN TOÁN - TỈNH HÀ GIANG

Câu	Ý	
Câu 1: (1,5 điểm)	a)	a) Tính giá trị biểu thức $A = 1 + \sqrt{4}$. Cách giải: $A = 1 + \sqrt{4} = 1 + 2 = 3$
	b)	b) Rút gọn biểu thức $B = \left(\frac{1}{\sqrt{x}+1} + \frac{1}{\sqrt{x}-1} \right) \cdot \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}$ với $x > 0; x \neq 1$. Cách giải: Với $x > 0; x \neq 1$, ta có: $B = \left(\frac{1}{\sqrt{x}+1} + \frac{1}{\sqrt{x}-1} \right) \cdot \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}$ $B = \left(\frac{\sqrt{x}-1}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)} + \frac{\sqrt{x}+1}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)} \right) \cdot \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}} = \frac{2\sqrt{x}}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)} \cdot \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}$ $B = \frac{2}{\sqrt{x}+1}$ Vậy $B = \frac{2}{\sqrt{x}+1}$ với $x > 0; x \neq 1$.
	c)	c) Tìm a để đồ thị hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$) đi qua điểm $M(1;1)$. Cách giải: Đồ thị hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$) đi qua điểm $M(1;1)$ khi và chỉ khi $1 = a \cdot 1^2$ hay $a = 1$ Vậy $a = 1$ là giá trị cần tìm.
Câu 2: (1,5 điểm)	a)	a) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 1 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$. Cách giải: $\begin{cases} x + y = 1 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$

		$\begin{cases} 3x = 3 \\ x + y = 1 \end{cases}$ $\begin{cases} x = 1 \\ x + y = 1 \end{cases}$ $\begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \end{cases}$ <p>Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là $(x; y) = (1; 0)$.</p>
	b)	<p>b) Cho phương trình $x^2 + 2x + m - 2 = 0$, với m là tham số. Tìm m biết phương trình đã cho có nghiệm $x = 0$.</p> <p>Cách giải:</p> <p>Thay $x = 0$ vào phương trình ta được:</p> $m - 2 = 0 \text{ hay } m = 2$ <p>Vậy $m = 2$ là giá trị cần tìm.</p>
	c)	<p>c) Giải bất phương trình $2x + 3 > 5$.</p> $2x + 3 > 5$ $2x > 2$ $x > 1$ <p>Cách giải:</p> <p>Vậy nghiệm của bất phương trình là $x > 1$.</p>
Câu 3: (1,0 điểm)		<p>Bạn Lan đi xe đạp từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc không đổi. Biết quãng đường AB dài 20 km. Khi đi từ B trở về A, bạn Lan tăng vận tốc thêm 2 km/h, vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. Tính vận tốc của Lan khi đi xe đạp từ A đến B.</p> <p>Cách giải:</p> <p>Gọi vận tốc của Lan khi đi xe đạp từ A đến B là x (km/h, $x > 0$)</p> <p>Vận tốc của Lan lúc về là $x + 2$ (km/h)</p> <p>Thời gian đi từ A đến B là $\frac{20}{x}$ (giờ)</p> <p>Thời gian đi từ B về A là $\frac{20}{x + 2}$ (giờ)</p> <p>Vì thời gian về ít hơn thời gian đi 20 phút hay $\frac{1}{3}$ giờ nên ta có phương trình:</p> $\frac{20}{x} - \frac{20}{x + 2} = \frac{1}{3}$

		$\frac{60(x+2)}{3x(x+2)} - \frac{60x}{3x(x+2)} = \frac{x(x+2)}{3x(x+2)}$ $60(x+2) - 60x = x(x+2)$ $60x + 120 - 60x = x^2 + 2x$ $x^2 + 2x - 120 = 0$ $x^2 + 12x - 10x - 120 = 0$ $x(x+12) - 10(x+12) = 0$ $(x-10)(x+12) = 0$ <p> $x - 10 = 0$ hoặc $x + 12 = 0$ $x = 10$ (tm) hoặc $x = -12$ (ktm) </p> <p>Vậy vận tốc của Lan khi đi xe đạp từ A đến B là 10 km/h.</p>
Câu 4: (1,0 điểm)		<p>Một cầu trượt trong công viên có chiều dài $BC = 4$ m và độ dốc là $\angle ACB = 30^\circ$ (như hình vẽ, $\angle BAC = 90^\circ$). Tính độ cao BA của cầu trượt.</p>  <p>Cách giải: Áp dụng công thức liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông ta được: $BA = BC \cdot \sin C = 4 \cdot \sin 30^\circ = 2 \text{ (m)}$ Vậy độ cao BA của cầu trượt là 2 m.</p>

Câu 5 (1,5 điểm)		Cho nửa đường tròn tâm O , đường kính AB . Trên nửa đường tròn (O) lấy điểm C sao cho $CA < CB$, kẻ CD vuông góc với AB , D thuộc AB . Gọi F là một điểm trên đoạn CD (F khác C và D), tia AF cắt nửa đường tròn (O) tại E .
	a)	a) Chứng minh tứ giác $DFEB$ là tứ giác nội tiếp. Cách giải:



	b)	<p>a) Ta có $DF \perp AB$ nên $\square DFB$ vuông tại D Suy ra D, F, B cùng thuộc đường tròn đường kính FB Ta có $\angle AEB = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) nên $\square FBE$ vuông tại E Suy ra D, E, B cùng thuộc đường tròn đường kính FB Vậy D, F, B, E cùng thuộc đường tròn đường kính FB hay $DFEB$ là tứ giác nội tiếp.</p> <p>Gọi K là giao điểm của HA và (O) Khi đó AE, HD, BK là các đường cao của tam giác HAB Do đó AE, HD, BK đồng quy tại F hay B, F, K thẳng hàng Vì $\square HKF$ vuông tại K $\square HEF$ vuông tại E nên H, K, F, E cùng thuộc đường tròn đường kính HF Suy ra $KI = IE$ Do đó I thuộc đường trung trực của EK Mà O thuộc đường trung trực của EK (do $OE = OK$)</p>
--	----	--

		<p>Nên OI là trung trực của EK Gọi L là giao điểm của OI và EK. Khi đó L là trung điểm của EK Mà M là trung điểm của AE nên ML là đường trung bình của $\triangle AKE$ $ML \parallel AK, ML = \frac{1}{2} AK$ (1) Do đó $ON \parallel AK, ON = \frac{1}{2} AK$ (2) Tương tự Từ (1) và (2) suy ra $MLNO$ là hình bình hành Do đó OL đi qua trung điểm của MN (đpcm).</p>
Câu 6 (1,0 điểm)		Cho một chiếc cốc hình trụ có bán kính đáy $r = 5$ cm và chiều cao $h = 10$ cm
	a)	<p>a) Tính diện tích xung quanh của chiếc cốc (lấy $\pi = 3,14$) Cách giải: Diện tích xung quanh của chiếc cốc là $S_{xq} = 2\pi rh = 2\pi \cdot 5 \cdot 10 = 314$ (cm²) Vậy diện tích xung quanh của chiếc cốc là 314 (cm²)</p>
	b)	<p>b) Ban đầu chiếc cốc chứa nước, chiều cao mực nước là $h_1 = 6$ cm. Người ta thả một viên bi bằng sắt, đặc ruột, hình cầu có bán kính $R = 3$ cm vào chiếc cốc. Khi đó chiều cao của mực nước trong cốc là h_2. Tính h_2 Cách giải: b) Thể tích của viên bi sắt là $V_1 = \frac{4}{3} \pi R^3 = \frac{4}{3} \pi \cdot 3^3 = 36\pi$ (cm³) Thể tích nước trong cốc ban đầu là $V = \pi r^2 h = \pi \cdot 5^2 \cdot 6 = 150\pi$ (cm³) Tổng thể tích của viên bi sắt và nước ban đầu là $V_2 = V + V_1 = 150\pi + 36\pi = 186\pi$ (cm³) Chiều cao của mực nước sau khi thả viên bi là $h_2 = \frac{V_2}{\pi r^2} = \frac{186\pi}{\pi \cdot 5^2} = 7,44$ (cm) Vậy $h_2 = 7,44$ (cm)</p>

	a)	a) Kết quả kiểm tra cuối học kì II môn Toán của 38 học sinh lớp 9A của một trường THCS được cho bởi bảng sau:
--	----	---

<p>Câu 7: (1,5 điểm)</p>	<p>b) Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên từ 1 đến 8 . Mô tả không gian mẫu và tính xác suất của biến cố A : "Số được chọn là số chẵn"</p> <p>Cách giải:</p> <p>Không gian mẫu $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8\}$</p> <p>Như vậy $n(\Omega) = 8$</p> <p>Các số chẵn trong các số từ 1 đến 8 là 2; 4; 6; 8</p> <p>Do đó $n(A) = 4$</p> <p>Xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$</p> <p>Vậy $P(A) = \frac{1}{2}$.</p>
<p>Câu 8: (1,0 điểm)</p>	<p>Cho các số dương x, y thỏa mãn $x + y + xy = 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x^2 + y^2$</p> <p>Cách giải:</p> <p>Ta có $(x - y)^2 \geq 0, \forall x, y \in \mathbb{R}$</p> <p>Do đó $x^2 - 2xy + y^2 \geq 0$ hay $x^2 + 2xy + y^2 \geq 4xy$</p> <p>Suy ra $xy \leq \frac{(x + y)^2}{4}, \forall x, y > 0$</p> <p>Vì $3 = x + y + xy \leq x + y + \frac{(x + y)^2}{4}$ nên $(x + y + 6)(x + y - 2) \geq 0$</p> <p>Suy ra $x + y \geq 2$ (do $x + y + 6 > 0, \forall x, y > 0$)</p> <p>Vì $x^2 - 2xy + y^2 \geq 0, \forall x, y \in \mathbb{R}$ nên $x^2 + y^2 \geq 2xy$ hay $2(x^2 + y^2) \geq (x + y)^2, \forall x, y \in \mathbb{R}$</p> <p>Suy ra $2P \geq 4$ hay $P \geq 2$</p> <p>Dấu "$=$" xảy ra khi và chỉ khi $x = y = 1$.</p>