

Câu 1 (4,0 điểm). Thực hiện các phép tính sau:

- 1) $A = 2011 - [39 - (2^3 \cdot 3 - 21)^2] : (-3) + 2021^0$
- 2) $B = \frac{1}{4.9} + \frac{1}{9.14} + \frac{1}{14.19} + \dots + \frac{1}{64.69}$
- 3) $C = 1 - 2 - 3 + 4 + 5 - 6 - 7 + 8 + \dots + 993 - 994 - 995 + 996 + 997$

Câu 2 (5,0 điểm).


- 1) So sánh: 71^{50} và 37^{75}
- 2) Tìm hai số tự nhiên a và b biết $a > b$; $a + b = 96$ và $UCLN(a; b) = 6$.
- 3) Làm thế nào để lấy được 6 lít nước từ một bể nếu trong tay chỉ có một thùng dung tích 4 lít và một thùng dung tích 9 lít và không thùng nào có vạch chia dung tích?

Câu 3 (4,0 điểm).

- 1) Tìm các số nguyên $x; y$ biết: $xy + x + y = 40$
- 2) Cho phân số $A = \frac{4n+1}{6n+1}$. Chứng minh A là phân số tối giản với mọi số tự nhiên n .

Câu 4 (6,0 điểm).

- 1) Trên đường thẳng xy lấy điểm O . Trên tia Ox lấy điểm A ; trên tia Oy lấy điểm B, C sao cho $OA = 2\text{cm}$; $OB = 7\text{cm}$, C là trung điểm của đoạn thẳng OB .
 - a) Tính độ dài đoạn thẳng AC .
 - b) Điểm O có phải là trung điểm của đoạn thẳng AC không? Vì sao?
- 2) Vẽ n tia chung gốc, chúng tạo ra 66 góc. Tìm giá trị của n ?
- 3) Người ta mở rộng một cái ao hình vuông về 4 phía như hình vẽ. Sau khi mở rộng, diện tích ao tăng thêm 192m^2 . Tính diện tích ao trước khi mở rộng?



Câu 5 (1,0 điểm). Chứng minh rằng:

$$\frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{6^2} + \frac{1}{7^2} + \dots + \frac{1}{100^2} < \frac{1}{3}$$

-----Hết-----


Họ và tên thí sinh:..... Số báo danh:.....


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 6
MÔN : TOÁN
NĂM HỌC 2021 – 2022
(Hướng dẫn chấm gồm 05 trang)

Câu	Nội dung	Điểm
Câu 1 (4,0 điểm)	Thực hiện phép tính: 1) $A = 2011 - [39 - (2^3 \cdot 3 - 21)^2] : (-3) + 2021^0$ 2) $B = \frac{1}{4.9} + \frac{1}{9.14} + \frac{1}{14.19} + \dots + \frac{1}{64.69}$ 3) $C = 1 - 2 - 3 + 4 + 5 - 6 - 7 + 8 + \dots + 993 - 994 - 995 + 996 + 997$	
	1) $A = 2011 - [39 - (2^3 \cdot 3 - 21)^2] : (-3) + 2021^0$ $A = 2011 - [39 - (8 \cdot 3 - 21)^2] : (-3) + 1$	0,5
	$A = 2011 + 1 - [39 - (24 - 21)^2] : (-3)$	0,25
	$A = 2012 - [39 - 3^2] : (-3)$	0,25
	$A = 2012 - [39 - 9] : (-3)$ $A = 2012 - 30 : (-3)$	0,25
	$A = 2012 + 10 = 2022$ Vậy $A = 2022$.	0,25
	2) $B = \frac{1}{4.9} + \frac{1}{9.14} + \frac{1}{14.19} + \dots + \frac{1}{64.69}$ $B = \frac{1}{5} \left(\frac{5}{4.9} + \frac{5}{9.14} + \frac{5}{14.19} + \dots + \frac{5}{64.69} \right)$	0,5
	$B = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} + \frac{1}{9} - \frac{1}{14} + \frac{1}{14} - \frac{1}{19} + \dots + \frac{1}{64} - \frac{1}{69} \right)$	0,5
	$B = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{69} \right)$	0,25
	$B = \frac{13}{276}$	0,25
	3) $C = 1 - 2 - 3 + 4 + 5 - 6 - 7 + 8 + \dots + 993 - 994 - 995 + 996 + 997$	
	$C = (1 - 2 - 3 + 4) + (5 - 6 - 7 + 8) + \dots + (993 - 994 - 995 + 996) + 997$	0,5
	$C = 0 + 0 + \dots + 0 + 997 = 997$.	0,5
Câu 2 (5,0 điểm)	1) (1,5 điểm) So sánh: 71^{50} và 37^{75}	
	Ta có: $71^{50} = (71^2)^{25} = 5041^{25}$ (1)	0,5
	$37^{75} = (37^3)^{25} = 50653^{25}$ (2)	0,5

	Từ (1) và (2) suy ra $37^{75} > 71^{50}$	0,5																									
	2) (2,0 điểm) Tìm hai số tự nhiên a và b biết $a > b$; $a + b = 96$ và $\text{ƯCLN}(a; b) = 6$.																										
	$\text{ƯCLN}(a; b) = 6$ nên $a = 6m$ ($m \in \mathbb{N}^*$) và $b = 6n$ ($n \in \mathbb{N}^*$) ($m > n$ và m, n là hai số nguyên tố cùng nhau)	0,5																									
	Vì $a + b = 96$ Nên $6m + 6n = 96$. Suy ra $m + n = 16$	0,5																									
	Ta có bảng <table><tr><td>m</td><td>15</td><td>13</td><td>11</td><td>9</td></tr><tr><td>n</td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td></tr><tr><td>a</td><td>90</td><td>78</td><td>66</td><td>54</td></tr><tr><td>b</td><td>6</td><td>18</td><td>30</td><td>42</td></tr></table> .Vậy $(a; b) \in \{(90; 6); (78; 18); (66; 30); (54; 42)\}$	m	15	13	11	9	n	1	3	5	7	a	90	78	66	54	b	6	18	30	42	1,0 (Mỗi cặp số a, b tính đúng được 0,25)					
m	15	13	11	9																							
n	1	3	5	7																							
a	90	78	66	54																							
b	6	18	30	42																							
	3) (1,5 điểm) Làm thế nào để lấy được 6 lít nước từ một bể nếu trong tay chỉ có một thùng dung tích 4 lít và một thùng dung tích 9 lít và không thùng nào có vạch chia dung tích?																										
	Kí hiệu (a, b) là trạng thái thùng 4 lít có a lít, và thùng 9 lít có b lít. $(0 \leq a \leq 4; 0 \leq b \leq 9)$.	0,5																									
	Khi đó việc lấy 6 lít nước được diễn tả qua các trạng thái sau: $(0; 0) \rightarrow (0; 9) \rightarrow (4; 5) \rightarrow (0; 5) \rightarrow (4; 1) \rightarrow (0; 1) \rightarrow (1; 9) \rightarrow (4; 6)$ Cuối cùng thùng có dung tích 9 lít chứa 6 lít nước.	1,0																									
Câu 3 (4,0 điểm)	1) (2,0 điểm) Tìm các số nguyên $x; y$ biết : $xy + x + y = 40$																										
	a) $xy + x + y = 40$ $x(y + 1) + y + 1 = 40 + 1$ $x(y + 1) + (y + 1) = 41$	0,5																									
	$(x+1)(y+1) = 41 = 1.41 = 41.1 = -1.(-41) = -41.(-1)$.	0,25																									
	Ta có bảng giá trị sau: <table><tr><td>$x+1$</td><td>1</td><td>41</td><td>-1</td><td>-41</td></tr><tr><td>$y+1$</td><td>41</td><td>1</td><td>-41</td><td>-1</td></tr><tr><td>x</td><td>0</td><td>40</td><td>-2</td><td>-42</td></tr><tr><td>y</td><td>40</td><td>0</td><td>-42</td><td>-2</td></tr><tr><td></td><td>t/m</td><td>t/m</td><td>t/m</td><td>t/m</td></tr></table>	$x+1$	1	41	-1	-41	$y+1$	41	1	-41	-1	x	0	40	-2	-42	y	40	0	-42	-2		t/m	t/m	t/m	t/m	1,0 (Mỗi cặp số x, y tính đúng được 0,25)
$x+1$	1	41	-1	-41																							
$y+1$	41	1	-41	-1																							
x	0	40	-2	-42																							
y	40	0	-42	-2																							
	t/m	t/m	t/m	t/m																							
	Vậy có các cặp $(x; y)$ là $\{(0; 40), (40; 0), (-2; -42), (-42; -2)\}$.																										
	0,25																										

	2) (2,0 điểm) Cho phân số $A = \frac{4n+1}{6n+1}$. Chứng minh A là phân số tối giản với mọi số tự nhiên n.	
	Gọi $d = \text{UCLN}(4n+1; 6n+1) \Rightarrow \begin{cases} 4n+1 : d \\ 6n+1 : d \end{cases}$	0,5
	$\Rightarrow \begin{cases} 3 \cdot (4n+1) : d \\ 2 \cdot (6n+1) : d \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 12n+3 : d \\ 12n+2 : d \end{cases}$	0,5
	$\Rightarrow (12n+3) - (12n+2) : d$ $\Rightarrow 1 : d$	0,5
	$\Rightarrow d=1$	0,5
	Vậy phân số $A = \frac{4n+1}{6n+1}$ là phân số tối giản với mọi số tự nhiên n	
Câu 4 (6,0 điểm)	1) (3,0 điểm) Trên đường thẳng xy lấy điểm O. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B, C sao cho OA = 2cm, OB = 7cm, C là trung điểm của đoạn thẳng OB. a) Tính độ dài đoạn thẳng AC. b) Điểm O có phải là trung điểm của đoạn thẳng AC không? Vì sao?	
	a) (2,0 điểm) Tính độ dài đoạn thẳng AC.	
		0,5
	Vì C là trung điểm của đoạn thẳng OB nên $OC = \frac{OB}{2} = 7 : 2 = 3,5 \text{ cm}$	0,25
	Điểm O nằm trên đường thẳng xy nên hai tia Ox, Oy đối nhau Mà điểm A thuộc tia Ox, điểm C thuộc tia Oy $\Rightarrow$ Điểm O nằm giữa 2 điểm A và C.	0,25
	Do đó $AO + OC = AC$	0,5
	$\Rightarrow AC = 2 + 3,5 = 5,5 \text{ cm}$	0,5
	Vậy $AC = 5,5 \text{ cm}$.	
	b) (1,0 điểm) Điểm O có phải là trung điểm của đoạn thẳng AC không? Vì sao?	
	Ta có $OA = 2 \text{ cm}$; $OC = 3,5 \text{ cm}$, ta thấy $OC > OA$	0,5
	nên điểm O không là trung điểm của đoạn thẳng AC.	0,5
	2) (1,5 điểm) Vẽ n tia chung gốc, chúng tạo ra 66 góc. Tìm giá trị của n?	
	Một tia bất kì trong số n tia chung gốc tạo thành với n-1 tia còn lại n-1 góc	0,25
	Với n tia chung gốc tạo thành n.(n-1) góc	0,25

	<p>Theo cách trên mỗi góc được vẽ 2 lần nên thực tế số góc tạo thành là $\frac{n \cdot (n-1)}{2}$</p>	0,25
	<p>Vì số góc tạo thành là 66 góc nên ta có: $\frac{n \cdot (n-1)}{2} = 66$</p>	0,25
	<p>$n \cdot (n-1) = 132$</p>	0,25
	<p>$n \cdot (n-1) = 12 \cdot 11$</p>	0,25
	<p>Vậy vẽ 12 tia chung gốc sẽ tạo thành 66 góc</p>	
	<p>3) (1,5 điểm) Người ta mở rộng một cái ao hình vuông về bốn phía như hình vẽ. Sau khi mở rộng, diện tích ao tăng thêm 192 m^2. Tìm diện tích ao trước khi mở rộng.</p>	
		0,25
	<p>Chia phần mở rộng thành 4 hình chữ nhật có diện tích bằng nhau và có chiều rộng là 4 m.</p>	0,25
	<p>Vì diện tích tăng thêm 192 m^2 nên diện tích mỗi hình chữ nhật là: $192 : 4 = 48 \text{ (m}^2\text{)}$.</p>	0,25
	<p>Chiều dài của mỗi hình chữ nhật là $: 48 : 4 = 12 \text{ (m)}$.</p>	0,25
	<p>Cạnh ao hình vuông là $: 12 - 4 = 8 \text{ (m)}$.</p>	0,25
	<p>Diện tích cái ao cũ là $: 8 \cdot 8 = 64 \text{ (m}^2\text{)}$.</p>	0,25
	<p>Vậy diện tích ao cũ là 64 m^2</p>	
Câu 5 (1,0 điểm)	<p>Chứng minh rằng:</p> $\frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{6^2} + \frac{1}{7^2} + \dots + \frac{1}{100^2} < \frac{1}{3}$	
	$\frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{6^2} + \frac{1}{7^2} + \dots + \frac{1}{100^2} < \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 6} + \frac{1}{6 \cdot 7} \dots + \frac{1}{99 \cdot 100}$	0,25
	$\frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{6^2} + \frac{1}{7^2} + \dots + \frac{1}{100^2} < \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{6} - \frac{1}{7} + \dots + \frac{1}{99} - \frac{1}{100}$	0,25
	$\frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{6^2} + \frac{1}{7^2} + \dots + \frac{1}{100^2} < \frac{1}{3} - \frac{1}{100} < \frac{1}{3}$	0,25

	Vậy $\frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{6^2} + \frac{1}{7^2} + \dots + \frac{1}{100^2} < \frac{1}{3}$	0,25
--	---	------