

Câu 1. Gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều có giá trị

- A. không đổi theo thời gian. B. tăng đều theo thời gian.
C. giảm đều theo thời gian. D. luôn bằng không.

Câu 2. Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều có vận tốc ban đầu v_0 , gia tốc có độ lớn a không đổi, phương trình vận tốc có dạng: $v = v_0 + at$. Vật này có

- A. tích $v \cdot a > 0$. B. a luôn dương,
C. v tăng theo thời gian. D. a luôn ngược dấu với v .

Câu 3. Một vật có khối lượng M , được ném ngang với vận tốc ban đầu v_0 ở độ cao h . Bỏ qua sức cản của không khí. Thời gian rơi

- A. chỉ phụ thuộc vào M . B. chỉ phụ thuộc vào h .
C. phụ thuộc vào v_0 và h . D. phụ thuộc vào M , v_0 và h .

Câu 4. Chuyển động biến đổi là chuyển động

- A. có độ lớn vận tốc không thay đổi theo thời gian.
B. có độ dịch chuyển không thời đổi theo thời gian.
C. có tốc độ không thay đổi theo thời gian.
D. có vận tốc thay đổi theo thời gian.

Câu 5. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều. Tại thời điểm t_0 vận tốc của vật là v_0 , tại thời điểm t vật có vận tốc là v . Công thức tính gia tốc của vật là

- A. $\frac{v - v_0}{t - t_0}$. B. $\frac{v + v_0}{t - t_0}$. C. $\frac{v - v_0}{t + t_0}$. D. $\frac{v + v_0}{t + t_0}$.

Câu 6. Khi nói về sự rơi tự do, phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Mọi vật trên trái đất đều rơi tự do với cùng một gia tốc.
B. Trọng lực là nguyên nhân duy nhất gây ra sự rơi tự do.
C. Mọi chuyển động nhanh dần đều theo phương thẳng đứng là rơi tự do.
D. Gia tốc rơi tự do phụ thuộc kinh độ của địa điểm đang xét.

Câu 7. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 19,6m. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Vận tốc của vật khi chạm đất là

- A. 20m/s. B. 19,6m/s. C. 9,8m/s. D. 19,8m/s.

Câu 8. Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động

- A. có độ lớn vận tốc giảm đều theo thời gian.
B. có độ lớn vận tốc tăng đều theo thời gian.
C. có độ lớn vận tốc không đổi theo thời gian.
D. có độ lớn vận tốc lúc tăng, lúc giảm theo thời gian.

Câu 9. Một ô tô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s^2 . Vận tốc của xe sau 10 giây kể từ lúc bắt đầu chuyển động là

- A. 20m/s. B. 2 m/s. C. 40 m/s. D. 4m/s.

Câu 10. Khi một ô tô đột ngột phanh gấp thì người ngồi trong xe

- A. chúi về phía trước. B. ngã về phía sau.
C. ngã sang bên cạnh. D. không có hiện tượng gì.

Câu 11. Ở gần Trái Đất trọng lực **không** có đặc điểm nào sau đây?

- A. Phương thẳng đứng.
B. Chiều từ trên xuống.
C. Điểm đặt tại trọng tâm của vật
D. Tỷ lệ nghịch với khối lượng của vật.

Câu 12. Theo định luật III Niu-ơn thì lực và phản lực là cặp lực

- A. xuất hiện hoặc mất đi đồng thời. B. cân bằng.
C. có cùng điểm đặt. D. cùng độ lớn và cùng chiều.

Câu 13. Tổng hợp lực là thay thế

- A. một lực tác dụng vào vật bằng nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực ban đầu.
- B. một lực tác dụng vào vật bằng hai lực có tác dụng giống hệt như lực ban đầu.
- C. hai lực đồng thời tác dụng vào vật bằng nhiều lực có tác dụng giống hệt như các lực ấy.
- D. nhiều lực đồng thời tác dụng vào vật bằng một lực có tác dụng giống hệt như các lực ấy.

Câu 14. Cho 2 lực đồng quy, cùng chiều, có độ lớn bằng 4 N và 3 N. Độ lớn hợp lực của hai lực này bằng
 A. 5 N. B. 1 N. C. 7 N. D. 12 N.

Câu 15. Theo định luật II Newton, gia tốc của một vật có độ lớn

- A. tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.
- B. tỉ lệ thuận với khối lượng của vật.
- C. tỉ lệ nghịch với lực tác dụng lên vật.
- D. không phụ thuộc vào lực tác dụng lên vật.

Câu 16. Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là

- A. trọng lượng. B. khối lượng. C. vận tốc. D. lực.

Câu 17. Một vật đang chuyển động với vận tốc 5m/s. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên vật mất đi thì vật

- A. chuyển động chậm dần rồi mới dừng lại.
- B. tiếp tục chuyển động thẳng đều với vận tốc 5 m/s.
- C. dừng lại ngay.
- D. đổi hướng chuyển động.

Câu 18. Điều nào sau đây là **sai** khi nói về đặc điểm hai lực cân bằng?

- A. Hai lực có cùng giá.
- B. Hai lực có cùng độ lớn.
- C. Hai lực ngược chiều nhau.
- D. Hai lực có điểm đặt trên hai vật khác nhau.

Câu 19. Phân tích lực là thay thế

- A. các lực bằng một lực duy nhất có tác dụng giống hệt như các lực đó.
- B. nhiều lực tác dụng bằng một lực có tác dụng giống hệt như lực đó.
- C. một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực đó.
- D. một lực bằng vectơ gia tốc có tác dụng giống hệt như lực đó.

Câu 20. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, điều kiện nào dưới đây là đúng?

- A. $a > 0$; $v > v_0$. B. $a < 0$; $v < v_0$. C. $a > 0$; $v < v_0$. D. $a < 0$; $v > v_0$.

Câu 21. Công thức nào sau đây **không** liên quan đến chuyển động thẳng biến đổi đều?

- A. $v = v_0 + at$. B. $s = vt$. C. $d = v_0 t + at^2/2$. D. $v^2 - v_0^2 = 2ad$.

Câu 22. Đặc điểm nào sau đây **không** phải là của chuyển động rơi tự do?

- A. Chuyển động thẳng chậm dần đều.
- B. Chuyển động theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.
- C. Chuyển động nhanh dần đều.
- D. Tại một vị trí xác định và ở gần mặt đất, mọi vật rơi tự do như nhau.

Câu 23. Độ dịch chuyển là

- A. một đại lượng vô hướng ,cho biết độ dài của vật đi được
- B. một đại lượng vô hướng ,cho biết sự thay đổi vị trí của vật
- C. một đại lượng vectơ ,cho biết độ dài và hướng của sự thay đổi vị trí của vật .
- D. một đại lượng vectơ, cho biết hướng của sự thay đổi vị trí của vật

Câu 24. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được bằng nhau

- A. khi vật chuyển động thẳng, không đổi chiều
- B. khi vật chuyển động thẳng, đổi chiều
- C. Khi vật chuyển động thẳng
- D. Xảy ra ở mọi trường hợp .

Câu 25. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, hãy chọn phát biểu **không** đúng?

- A. Vec tơ gia tốc ngược chiều với vec tơ vận tốc.
- B. Vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc nhất theo thời gian.
- C. Quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc hai theo thời gian.
- D. Gia tốc là đại lượng không đổi.

Câu 26. Rơi tự do là một chuyển động

- A. thẳng đều.
- B. chậm dần đều.
- C. nhanh dần.
- D. nhanh dần đều.

Câu 27. Một vật được thả từ trên máy bay ở độ cao 80m. Cho rằng vật rơi tự do với $g = 10\text{m/s}^2$, thời gian rơi là

- A. $t = 4,04\text{s}$.
- B. $t = 8,00\text{s}$.
- C. $t = 4,00\text{s}$.
- D. $t = 2,86\text{s}$.

Câu 28. Một vật ném từ độ cao H với vận tốc ban đầu v_0 theo phương nằm ngang. Nếu bỏ qua ma sát của không khí thì tầm ném xa L

- A. tăng 4 lần khi v_0 tăng 2 lần.
- B. tăng 2 lần khi H tăng 2 lần.
- C. giảm 2 lần khi H giảm 4 lần.
- D. giảm 4 lần khi v_0 giảm 2 lần.

Câu 29. Cho hai lực đồng quy có độ lớn $F_1 = 40\text{N}$, $F_2 = 30\text{N}$. Hãy tìm độ lớn của hai lực khi chúng hợp nhau một góc 90° ?

- A. 70N.
- B. 50N.
- C. 60N
- D. 40N.

Câu 30. Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính?

- A. Vật chuyển động tròn đều.
- B. Vật chuyển trên quỹ đạo thẳng.
- C. Vật chuyển động thẳng đều.
- D. Vật chuyển động rơi tự do.

Câu 31. Một vật đang nằm yên trên mặt đất, lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng vào vật có độ lớn

- A. lớn hơn trọng lượng của vật.
- B. nhỏ hơn trọng lượng của vật.
- C. bằng trọng lượng của vật.
- D. bằng 0.

Câu 32. Định luật quán tính là tên gọi thay thế cho định luật nào?

- A. Định luật I Newton.
- B. Định luật II Newton.
- C. Định luật III Newton.
- D. Định luật bảo toàn năng lượng.

Câu 33. Hai vật ở cùng một độ cao, vật I được ném ngang với vận tốc đầu $\vec{v}_0$, cùng lúc đó vật II được thả rơi tự do không vận tốc đầu. Bỏ qua sức cản không khí. Kết luận nào đúng?

- A. Vật I chạm đất trước vật II.
- B. Vật I chạm đất sau vật II.
- C. Vật I chạm đất cùng một lúc với vật II.
- D. Thời gian rơi phụ thuộc vào khối lượng của mỗi vật.

Câu 34. Trong chuyển động của vật được ném xiên từ mặt đất thì đại lượng nào sau đây không đổi?

- A. Gia tốc của vật.
- B. Độ cao của vật.
- B. Khoảng cách theo phương nằm ngang từ điểm vật được ném tới vật.
- C. Vận tốc của vật.

Câu 35. Gọi F_1 , F_2 là độ lớn của hai lực thành phần, F là độ lớn hợp lực của chúng. Câu nào sau đây là đúng?

- A. F không bao giờ nhỏ hơn cả F_1 và F_2 .
- B. F không bao giờ bằng F_1 hoặc F_2 .
- C. F luôn luôn lớn hơn cả F_1 và F_2 .
- D. Trong mọi trường hợp: $|F_1 - F_2| \leq F \leq |F_1 + F_2|$.

Câu 36. Trọng lượng của một vật là

- A. Cường độ (độ lớn) của trọng lực tác dụng lên vật đó.
- B. Phương của trọng lực tác dụng lên vật đó.
- C. Chiều của trọng lực tác dụng lên vật đó.
- D. Đơn vị của trọng lực tác dụng lên vật đó.

Câu 37. Hệ thức nào sau đây là đúng theo định luật II Niuton.

A. $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$

B. $a = \frac{F}{m}$

C. $\vec{a} = \frac{F}{m}$

D. $\vec{F} = -m\vec{a}$

Câu 38. Cho hai lực đồng quy có độ lớn $F_1 = 40\text{N}$, $F_2 = 30\text{N}$. Hãy tìm độ lớn của hai lực khi chúng hợp nhau một góc 180° ?

A. 10N.

B. 20N.

C. 40N

D. 50N.

Câu 39. Treo vật có khối lượng 1kg vào đầu dưới sợi dây không dẫn. Lấy $g = 10\text{m/s}^2$. Khi vật đứng yên, lực căng dây tác dụng lên vật có độ lớn là:

A. 1N

B. 10N

C. 0,1N

D. 20N

Câu 40. Thả 1 hòn đá từ độ cao h xuống đất, hòn đá rơi trong 1s. Nếu thả hòn đá từ độ cao $4h$ xuống đất thì hòn đá rơi trong bao lâu

A. 4s

B. 2s

C. $\sqrt{2}s$

D. 8s

----- **HẾT** -----

ĐÁP ÁN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	D	B	D	A	B	D	B	A	A	D	A	D	C	A	B	B	D	C	A
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
B	A	C	A	A	D	C	C	B	C	C	A	C	A	D	A	A	A	B	B